

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשס"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קלופידוגרל

טבליות

הרכב:

קל טבליה מכילה:

קלופידוגרל (כביולפט) 75 מ"ג
(Clopidogrel as bisulfate 75 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ולארגונים בתרופה ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם גורמה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת למניעת אירועים של אירועים אסרתורמבוטיים בכלי הדם (התקפי לב, שבץ מוחי או מוות על רקע וסקולרי), בחולים עם טרשת עורקים (אטרוסקלרוזיס) שעברו אוטום שריר הלב, ואירוע מוחי איסכמי או סובלמים ממחלת עורקים פריפרית, ובחולים הסובלים מאנגינה פקטוריס בלתי יציבה, כולל חולים העוברים השתלת תומך עורקים (stent) בצננתו ושטמפוליס באספירין. התרופה משמשת למניעת אירועים אסרתורמבוטיים ותחומבאובוליים (התקפי לב, שבץ מוחי, תסחיסים או מוות על רקע וסקולרי) בשילוב עם אספירין. בחולים הסובלים מהפרעה בקצב הלב מסוג פפור פרודורזיס שאינם מתאימים לטיפול בתכשירים נוגדי קרישה מסוג נוגדי יונימין K נגון וארפרין (קשורים) אנטי-תחומבין או אנטי פקטור Xa.

קצוצה תרופתית: מעכבי הצטמת טסיות דם, מקבוצת התיאנופירידינים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גרש (אלרגי) לקלופידוגרל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אתה סובל ממצב רפואי הגורם כעת לדימומים כגון: כיב קיבה או תרסירון, דימום תוך מוחי.
- אתה סובל ממחלת כבד חמורה.
- אם משהו מאלה הנוגד לך, או אם יש לך ספק כלשהו, היוועץ ברופא לפני נטילת קלופידוגרל טבע.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- קיים אצלך סיכון לדימומים כגון:
- עברו רפואי שמעדיד אותך בסיכון לדימום פנימי (כגון כיב קיבה).
- בעיה במערכת הדם שפועלת אותך בסיכון לדימום פנימי (דימום פנימי במוח, דימום פנימי באיברים או במפרקים בגופך).
- עברת לאחרונה פגיעה חמורה.
- עברת לאחרונה ניתוח (כולל ניתוחים דנטליים), אתה צפוי לעבור ניתוח (כולל ניתוחים דנטליים) בשבעת הימים הקרובים.
- סבלת מקריש בעורק במוחך (איסכמי) בשבעת הימים האחרונים.
- אתה סובל ממחלת כליה או כבד.
- סבלת בעבר מאלרגיה או מהגובה לתרופה כלשהי שנעשה בה שימוש לטיפול במחלתך.

בזמן הטיפול בתרופה:

- עלך להודיע לרופא שלך אם מתוכנן לך ניתוח (כולל ניתוח דנטלי).
- עלך גם להודיע לרופא שלך מיד אם פיתחת מצב רפואי (הידוע גם בשם Thrombotic or Thrombocytopenic Purpura (TTP) הכולל חום וחבורות תת ערויות תרופות הלוהפי כנקודות אדמויות דמויות ראש סיכה עם או בלי עייפות יציבית בלתי מוסברת, לבול, הצהבת העור או העיניים (צהבת), ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
- אם נחנתך או נפצעת ייתכן שירשך זמן רב מהרגיל עד שהדימום יפסק. זה קשור לאופן בו פועלת התרופה שלך כיוון שהיא מונעת היווצרות קרישי דם. לגבי חתכים או פציעות אלו, כמו יתוך בזמן הילוח, חתך כולל אין בעיה. קולט, כמו אתה מטרד מהדימום, עלך לפנות לרופא שלך (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
- יתכן שהרופא יבקש לבצע בדיקות דם.

ילדים ומתבגרים:

התרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

הגבולות בין תרופות:

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

תרופות מסוימות אחרות עלולות להשפיע על השימוש בקלופידוגרל טבע או להפיק. במיוחד יש לידע את הרופא אם אתה לוקח:

- תרופות עלולות להגדיל את הסיכון שלך לדימום כגון:
- נוגדי קרישה הנלקחים דרך הפה, תרופות המשמשות להפחתת קרישת הדם.
- נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs), סטרואידים (SSRIs) (כולל אך לא מוגבל לפלואוקסטין או פלובוקסטין), תרופות המשמשות בדרך כלל לטיפול בכאב ו/או בדלקת של שרירים או מפרקים.
- הפרין או כל תרופה אחרת להזקקה המשמשת להפחתת קרישת הדם.
- טיקלופידין או תרופות אחרות נוגדות טסיות. מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין (SSRIs) (כולל אך לא מוגבל לפלואוקסטין או פלובוקסטין), תרופות המשמשות בדרך כלל לטיפול בדיאנון.
- רפאמפיצין (שימשו לטיפול בזיהומים חמורים).

- אומפראזול או אסומפראזול, תרופות לטיפול בכאבי בטן.
- פלוקונזול או וריקונזול, תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים.
- אפאירנז או תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות המשמשות לטיפול בזיהום HIV).
- קרמפזין, תרופה לטיפול בסוגים מסוימים של אפילפסיה.
- מוקלובמיד, תרופה לטיפול בדיאנון.
- רפאליניד, תרופה לטיפול בסוכרת.
- פאקלוקטל, תרופה לטיפול בסרטן.
- אופיאואידים: בזמן שאתה מטופל בקלופידוגרל, עלך לידע את הרופא שלך לפני קבלת מרשם לאופיאואיד כלשהו (משמשים לטיפול בכאבים עדיים).
- רוזובסטטין (משמשת להורדת רמת המולסטרוול שלך).

אם חווית כאב חזה חמור (תעוקת חזה בלתי יציבה את התקף לב), ייתכן שירשמו לך קלופידוגרל טבע בשילוב עם חומצה אצטילסליצילית, חומר הנמצא בשימוש רבות המשמשות להקלת כאב ולהורדת חום. שימוש מזדמן בחומצה אצטילסליצילית (לא יותר מ1,000 מ"ג בכל פרק זמן של 24 שעות) לא אמור על פי רוב לגרום לבעיה, אך יש לדון עם הרופא שלך לגבי שימוש ממושך במצבים אחרים.

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן לטול את התרופה עם או ללא מזון. **היריון, הנקה ופוריות:** עדיף לא לקחת את התרופה במהלך ההיריון. אם את בהיריון או חושדת שאת בהיריון, עליך לספר על כך לרופא או לרוקח שלך לפני נטילת קלופידוגרל טבע. אם נכנסת להיריון בזמן נטילת התרופה, היוועץ מיד ברופא כיוון שלא מומלץ לטול קלופידוגרל כאשר את בהיריון. אין להניק בזמן לקחת התרופה. אם את מניקה או מתכננת להניק, היוועץ ברופא לפני לקחת התרופה.

היוועץ עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילת התרופה לשהי.

נהיגה ושימוש במכונית:

לא צפוי שקלופידוגרל טבע תשפיע על היכולת שלך לנהוג או להפעיל מכונית. **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:** התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים (כגון לקטוז), צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת התרופה.

תרופה זו מכילה פחות מ23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. **המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המוקבל, כולל עבור מטופלים עם מצב הקראא "פרפור פרודורזיס" (קצב לב בלתי יציב) מ"ג 75** **טבליה אחת של קלופידוגרל טבע 75 מ"ג ליום, הנלקחת דרך הפה, עם או ללא מזון ובאותו זמן בכל יום.**

אם חווית כאב חזק בחזה (תעוקת חזה בלתי יציבה את התקף לב), ייתכן שהרופא שלך יורה לך לטול מינון של 300 מ"ג (טבליה של 75 מ"ג) באופן חד פעמי, בתחילת הטיפול. לאחר מכן, המינון המומלץ הוא טבליה אחת של קלופידוגרל טבע 75 מ"ג ביום הנלקחת כפי שמתואר למעלה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עלך לקחת קלופידוגרל טבע כל עוד הרופא רושם לך אותה.

כתישה/חצייה/לעיטה:

אין מידע לגבי כתישת או ריסוק הטבליה. אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מים. ניתן לטול את התרופה עם או ללא מזון. **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:** פנה מיד לרופא או לחדר המיון של בית החולים הקרוב ביותר בגלל הליהיה בסיכון לדימומים. **אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.**

אם שכחת לטול את התרופה:

אם שכחת לקחת את המנה של קלופידוגרל טבע, אבל זכרת בתוך 12 שעות ממועד הנטילה הרגיל, קח טבליה מיד ואת הטבליה הבאה קח בזמן הרגיל. אם שכחת ועברו יותר מ12 שעות, פשוט קח את המנה הבודדת הבאה בזמן הרגיל. אין לטול מנה כפולה כפיצוי על המנה ששכחתי.

יש להתימד בטיפול לכוני שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת קלופידוגרל טבע: אל תפסיק את נטילת התרופה אלא אם הרופא שלך הורה לך לעשות כך.

פנה לרופא או לרוקח שלך לפני הפסקת הטיפול.

אין לטול תרופות נוספות בדיקת התונית והמנה בכל פעם שהיך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח שלך.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקלופידוגרל טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. לתיבה למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבל מאף אחת מהן. **יש להתייעץ מיד עם הרופא אם מפיעים הסימנים הבאים:**

- חום, סימנים של זיהום או עייפות יציבית. אלו יכולים להיות תוצאה של ירידה נדירה בתאי דם מסוימים.
- סימנים של בעיה בכבד כמו הצהבת העור ו/או העיניים (צהבת), עם או בלי קשר לדימום שמופע תחת העור כנקודות אדומות דמויות ראש סיכה ו/או לבול (ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה" תחת תת סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

- נפוחות בפה או בעיות עוריות כמו פריחה, גירוד ושלפוחיות בעור. אלו יכולים להיות סימנים של תגובה אלרגית.

תופעת הלוואי השיחה ביותר המדווחת עם התרופה היא דימום. הדימום יכול להופיע כדימום בקיבה או במעינים, כחבורה, כהמטומה (דימום לא רגיל או חבורה תת עורית), כדימום באף, או כדם בשתן. במספר מעט של מקרים דווח גם על דימום בעין, בתוך הראש, בריאות או במפרקים.

אם אתה סובל מדימום ממושך במהלך הטיפול בקלופידוגרל טבע:

אם נחנתך או נפצעת, ייתכן שירשך זמן רב מהרגיל עד שהדימום יפסק. זה קשור לאופן בו פועלת התרופה שלך כיוון שהיא מונעת היווצרות קרישי דם. לגבי חתכים או פציעות קלות, כמו חתך בזמן הילוח, חתך כולל אין בעיה. אולם אם אתה מטרד מהדימום, עלך לפנות לרופא שלך (ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה" תחת תת סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

תופעות לוואי נוספות כוללות:

תופעות לוואי שכיחות (יכולות להשפיע על עד ששתמש אחד מתוך 10):

שלשול, כאב בטן, קשיי עיכול או צרבת.

תופעות לוואי שכיחות (יכולות להשפיע על עד ששתמש אחד מתוך 100):

כאב ראש, כיב קיבה, הקאה, בחילה, עצירות, גז ועודף קיבה או במעינים. פריחה, גירוד, סחרחורת, הגרשה של עקצוץ או נימול.

תופעות לוואי נדירות (יכולות להשפיע על עד ששתמש אחד מתוך 1,000):

ורטיגו, שדיים מוגדלים בכורים.

תופעות לוואי נדירות מאוד (יכולות להשפיע על עד ששתמש אחד מתוך 10,000):

צהבת, כאב חזק עם או בלי כאב גב, חום, קשיי נשימה הקשורים לפעמים בשלשול, תגובות אלרגיות כלליות (למשל, הרגשת חום באופן כללי עם אי נוחות כללית פתאומית עד כדי התעלפות), נפוחות בפה, שלפוחיות על העור, אלרגיה עורית, דלקת ברירות הפה, ירידה בלחץ הדם, לבול, הדיות, כאבי מפרקים, כאבי שרירים, שינוי בטעם או איבוד הטעם של המזון.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (שכיחותן אינה ניתנת להערכה מהנתונים הקיימים):

תגובות של רגישות יתר המלוות בכאבים בחזה או בטנון, תסמינים של רמת סוכר נמוכה בדם באופן מתמיד.

בנוסף, ייתכן שהרופא שלך יבחין בשינויים בבדיקות הדם או בשתן שלך.

אם אתה מתוועת ללוואי הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמורה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

דיחון על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיחון על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי שנמצא בדף הבית של המנה (www.health.gov.il) המנחה לטופס המיון לדיחון על תופעות לוואי, או על-ידי הכניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעהלה תרופה זו לרופא אחרת יש לשמור במקום מגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך מנמנע הרעהלה.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה, תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C.

אל השתמש בתרופה אם אתה מבחין בשינויים הנראים לעין בטבליה.

אריזת בקבוק: לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש בתרופה עד תאריך התפוגה. אל תשליך תרופות ומערכת הניקוז או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות שאינך משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, קלופידוגרל טבע מכילה גם:

Microcrystalline Cellulose, Lactose Monohydrate, Hydrogenated Vegetable Oil Type I, Sodium Lauryl Sulfate, Croscopolvidone, Hydroxypropyl Cellulose, Hypromellose 15 cP/HPMC 2910, Titanium Dioxide, PEG 4000/ Macrogol, Iron Oxide Red, Indigo Carmine Aluminium Lake/FD&C Blue No. 2, Iron Oxide Yellow.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

כל אריזה מכילה טבליות מופקות בצורת קפסולות, בצבע ורוח-ורוד בהיר. בצידה האחד של הטבליה מוטבע המספר "93", ובצידה האחר מוטבע המספר "7314".

כל אריזה יש 30 טבליות באריזת בקבוק או באריזת מגשית (בליסט).

ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התרופה. אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020, ישראל.
העלון נערך בפברואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות המחלתי במשרד הבריאות: 139-40-31295

לשם הפיטוטה ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

CLOPIDOGREL PIL MW0223

teva