

# ג'ארדיינס® 10 מ"ג טבליות מצופות ג'ארדיינס® 25 מ"ג טבליות מצופות



הבאנה בזמן הרגע. אין ליטול mana כפולה כדי לפצות על mana שנשכה. יש להמתיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא. גם אם אתה מפסיק את נטילת התרופה, רמותה הסוכר בدمך עלולות לעלות.

אין ליטול תרופה בחוושן בדוק התווית והמנה בכל פעם שהוא נוטל תרופה. הרוכב משקפיים אם הירך זוקק להם. אם יש לך שאלות נוספת נספנות בונגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

## 4. טיפולות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בג'ארדיינס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל מקרא רשותת תופעות לוואי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

מידע חשוב בונגע לג'ארדיינס:  
ג'ארדיינס יכול לאגרום לתופעות לוואי חמורות.  
יש לפנות לוופא בהקדם האפשרי אם הירך חווה את אחת מתופעות לוואי החומרה הבאות:

### • **חמצת קוטיטית (ketosis) - רמות מוגברות של קוטונים בדם או בשתן:**

חמצת קוטיטית הופעה באנשים עם סוכרת מסוג 2  
במהלך הטיפול בג'ארדיינס. חמצת קוטיטית גם הופעה באנשים עם סוכרת אשר הירך או שעברנו ניתוח במהלך הטיפול בג'ארדיינס. חמצת קוטיטית היא מצב רפואי אשר דרוש טיפול בבית החולים. חמצת קוטיטית עלולה להוביל למומות. חמצת קוטיטית עלולה להופיע בזמן הטיפול בג'ארדיינס גם אם רמות הסוכר בדם נמוכות – 250 מ"ג/ד".  
הפסיק לשמש בג'ארדיינס ונפה מייד לרופא שלך או פנה לחדר מין הקרוב אליו אם אתה חווה את אחד התסמינים הבאים: בחילות, הקאות, כאבי בטן (באזור הקיבה), עיפות וקושי בנשימה.  
אם אתה חווה אחד מהתסמינים הנ"ל במהלך הטיפול בג'ארדיינס, בדוק הימצאות קוטונים בשתן אם מתאפשר, גם אם רמות הסוכר שלך בדם נמוכות – 250 מ"ג/ד".

### • **התיבשות:**

ג'ארדיינס עלולה לגרום לכך מהמטופלים להתייבשות (אובדן נוזלי גוף ומלחים). התיבשות עלולה לגרום לך לסתחרורת, עילפון או חולשה, בייחוד בשינוי תנוחה מישבה / שכיבה לעומת עמידה. הירך דיווחים של החמרה פתואמית של תפקוד קל-ית באנשים הנוטלים ג'ארדיינס.

הסיכוי להתייבשות גדול יותר אם הירך:  
• נוטל תרופה להורדת לחץ הדם שלך, כולל תרופה משתנת  
• מפסיק על דיאטה דלת נתרון (מלח)  
• סובל בעבויות בכילה  
• בן 65 ומעלה

הירוך ברופא לגבי מה עליך לעשות על מנת להימנע מהתייבשות כולל כמה נזולים עליך לשחות על בסיס יומי.

יש לפנות לרופא מייד אם צמצמת את כמות האוכל שהירך אוכל או את כמות הנזולים שאתה שותה, לדוגמה אם הירך מקיין ואינך מסוגל לאכול, או שאתה מתחיל לאבד נזולים מגופך בגין בעקבות הקאות, שלשלולים או שהוא ממשתת בשמש.

### • **יש לפנות בהקדם האפשרי לרופא אם הירך מב奸 באחת מתופעות הלוואי הבאות:**

אודם, כאב, ריגשות או נפיחות באזור הגנטיל, עד פי הטבעת, בלילה או מעל 38° או הרגשה כללית רעה וחולשה. תופעות לוואי אלו יכולות להיעיד על התפתחות של *Fournier's gangrene*. מדובר בזיהוי חידקי נדריר אך מסכן חיים בركמות התנת עוויות באזור הגנטיל (עד פי הטבעת). קיימים מספר דיווחים אודות הירעתה תופעת לוואי זו בנשים ובגברים אשר נטלו תרופה לטיפול בסוכרת מושפעת התופעות אליה שייכת ג'ארדיינס. תופעת לוואי זו עלולה להוביל לאשפוז, צורק בניתוח ואך למות. תסמוני *Fournier's gangrene* עלולים להידדר במחירות, ולכך חשוב לפנות לעזרה רפואית האפשרות אם הירך חש באחד מתסמים אלו.

### • **דיזומות חמורות בדרכי השתן:**

דיזומות חמורות בדרכי השתן אשר עלולים להביא לאשפוז, קרן לאנשים שנוטלים ג'ארדיינס. ספר לרופא שלך אם יש לך סימנים או תסמינים של דיזום בדרכי השתן כגון צרבה במתן שתן, תכיפות וdochיפות במתן שתן, כאב באזור הירכים או דם בשתן. לעיתים אנטים עלולים לסבול גם מחום, כאב גב, בחילות או הקאות.

### • **רמת סוכר נמוכה בדם (hypoglycemia):**

תרופה נוספת שיכולה לגרום לרמות סוכר נמוכות להביא לאשפוז, כגון ג'ארדיינס. הספרון שרך לסבול מרמה נמוכה של סוכר בדם ג'ארדיינס יזכיר. יתכן שיראה צורך במינון נמוך יותר של אינסולין או סולפונילאורה. יתכן שיראה צורך במינון נמוך יותר של אינסולין או דם בשתן.

טיפול מומלץ: סימנים ותסמינים לרמת סוכר נמוכה בדם לרופא, רעב, כאב ישנוניות, סחרחוות, רעד, העזה, הבלבול, קצב לב מהיר, רעב, כאב ראש, חולשה.

הרופא ינחה אותך איך לטפל בرمות סוכר נמוכות בדם ואיך לפעול אם מופיע כל אחד מהסימנים לעיל. אם מופיעים תסמינים של רמת סוכר נמוכה בדם, יש לאכול טבליות ג'ולוקן, חטיף עתיק סוכר או לשותות מיץ פירות. מודוד את רמת הסוכר בדם אם אפשר וnoch.

טיפול מומלץ: בנטראktיבי בנטראktיק. התסמינים לכך הם ריח מהגרתיק, הפרשה וגינלית לבנה או צחובה (ההפרשה יכולה להיות גושית או דמוית גבינת קוֹטֶג), גירוד בנטראktיק.

טיפול מומלץ: פטריטי בפין (diatoms בערטת הפין בלבד או בערטת הפין והעורלה בקשר גברים לא נמלומים). נפיחות בפין בקשר מטפולים לא-נמלומים עלולה להתפתח, דבר המקשה על מתיחת העור האחורה משביב לקצת הפין. סימנים נוספים לזרימת פטריטי בפין כוללים אDEMומיות, גירוד או נפיחות בפין, פריחה על הפין, הפרשה מהפה בעלת ריח רע, כאבים בעור מסביב לפין.

שוחח עם הרופא המטפל מה עליך לעשות אם הירך סובל מתסמים של דיזום פטריטי בנטראktיק או בפין. יתכן שהרופא יציע על שימוש בתופעות אנטי-פטריטיות הניתנות ללא מרשם. אם שימוש בתופעות אלו לא עוזר והתסמים לא עוברים, פנה לרופא מייד.

כל טבלית ג'ארדיינס 10 מ"ג מכילה 10 מ"ג אמפליגליפוזין (empagliflozin 10 mg) וכל טבלית ג'ארדיינס 25 מ"ג מכילה 25 מ"ג אמפליגליפוזין (empagliflozin 25 mg).

חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיך – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".  
קרה בעין את העין עד סופו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נהנסה לטיפול במחלתו. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם גראה לך כי מחלתם דומה.

### 1. **למה מיועדת התרופה?**

ג'ארדיינס מיועד:  
• לשיפור השיליטה ברמת הסוכר בדם במבוגרים עם סוכרת מסוג 2 בנוסף לדיאטה ופעולות גופניות.

• להפחיתת הסיכון לתופעת נזולים מהגוף (משタン). שימוש משולב עם הסובלים מסוכרת מסוג 2 ומחלות לב וכלי דם קיימות.

• **ג'ארדיינס 10 מ"ג** מיועד לתופעת נזולים גוף מופיעים בסעיף 4 – "טיפולות לוואי".

• **תרופה המשמשת להפרשת נזולים מהגוף (משタン).** שימוש משולב עם ג'ארדיינס עלול להביא לעלייה בעקבות השתן ובתדרות ההתקונות, אשר עלולים להגביר את הסיכון להתייבשות. תסמים אפשריים לאי-בזבז רבד מידי של נזול גוף מופיעים בסעיף 4.

• **תרופות אחרות להורדת סוכר בדם (כמו אינסולין או סולפונילאורה).** שימוש משולב עם ג'ארדיינס עלול להגביר את הסיכון לרמות סוכר נמוכות בדם (hypoglycemia).

לפיך, בשימוש משולב עם ג'ארדיינס, יתכן שיראה צורך במינון נמוך יותר של תרופה להורדת סוכר בדם (כמו אינסולין או סולפונילאורה) כדי להפחית את הסיכון לרמות סוכר נמוכות בדם.

• **לייטוים.** שימוש משולב עם ג'ארדיינס עלול להרוויד את ריצ'ה הליתאים בדם. על כן, לאחר התחלת טיפול בג'ארדיינס ובשינוי מינון, יש לנטר את רמות הליתאים בדם בצורה יתרה.

יש להכיר ולהזדקק לשימוש של התרופה אשר הירך נוטל ולהציג אותה בפני הרופא המטפל והרוקח כאשר הירך מקבל תרופה חדשה.

נition ליטול את התרופה עם מזון או בלבד.

הירון והנקה  
יש להוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו אם הירך בהירון, החושבת שהירך בהירון, מתכונת הירון, מניקה או מתכונת להניק.

אין לשמש בג'ארדיינס אם הירך בהירון. ג'ארדיינס עלול לפחותה בעבורך רק אם הירך נסנת להירון בזמן הטיפול בג'ארדיינס, ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי. היועץ רפואי שלך לגבי הדרכו הטובה ביזור לאזן את רמות הסוכר בדם בצוותה יתרה.

אין לשמש בג'ארדיינס אם הירך בהירון או מתקבב בדרכי השתן או מבעיות במתן שתן. הירך שרך ולפוגע בתינוק. היועץ רפואי שלך ליטול ג'ארדיינס ונפה מיידית לרופא המטפל או לחדר המין הקרוב אליו.

אתה עבר טיפולי דיאלייזה. סופיתם, גרון או באזורי עור אחרים סופיתם מוגבהים, אודומים על עורך (סרפדות)

אם הירך חווה תסמין כלשהו מהרשימה, הפסיק ליטול ג'ארדיינס ונפה מיידית לרופא המטפל או לחדר המין הקרוב אליו.

הטיפול החדשן  
ירק אוכל פחות או שיש שני בבחונה שלם סוכרת מסוג 1. אין לשמש בג'ארדיינס כדי לטפל באנשים עם סוכרת מסוג 1.

ירק בהירון או מתקבב בדרכי השתן או מבעיות במתן שתן – ראי סעיף 2 "הירון והנקה".

ירק מניקה או מתקבב להניק – ראי סעיף 2 "הירון והנקה".

כמו כן, לפני הטיפול בג'ארדיינס או במהלך הטיפול בג'ארדיינס, לרופא אם:

ירק סובל מבעיות בנתיק אכדיים או מבעיות בכבד סבלת בעבר מבעיות בנתיק אכדיים בדרכי השתן או מבעיות במתן שתן – ראי סעיף 2.

ירק מוגבל מפרקת מינון נמוך – ראי סעיף 2.

ירק מוגבל מפרקת מינון נמוך – ראי סעיף 2.

מצביעים אלו עלולים להוות גורמי סיכון להתקפות של חמצת קוטיטית סוכרת. ראה סעיף "טיפולות לוואי".

ילדים ומתבגרים לא ידוע אם התרופה בטוחה ויעיל בילדים. תרופה זו אינה מיועדת לילדי 18.

בדיוקות ומתקבב  
דיאטה ופעולות גופניות יכולות לסייע לטיפול בדרכי השתן, מומלץ לעזובם על ידי הרופא בזמן הטיפול בג'ארדיינס. מומלץ לעזובם על ידי הרופא בזמן הטיפול בג'ארדיינס.

אחר התגובה לטיפול יגיד המטרה בטיפול מיליצ' על טיפול בתופעות נוספות. רוחני שהרופא שלך יבצע בבדיקה בטיפול במחלה.

תפקידו לפני הטיפול בג'ארדיינס ובמהלך הטיפול בג'ארדיינס. הכליות לפני הטיפול בג'ארדיינס ובמהלך הטיפול בג'ארדיינס.

• **תגובהות אלרגיות (رجישות יתר).** תגובהות אלרגיות חמורות התרחשו בקרב מטופלים הנוטלים ג'ארדיינס. תסמיינית תגובה אלרגית יכולות לכלול:

ס התנפחות של הפנים, השפתיים, הגרון או אזורים אחרים של העור  
שלר

ס קושי בבליעה או בנשימה

ס אזורים מוגבהים, אדומים על עורך (סרפדת)

אם הinker חווה תסמיין כלשהו מהרשימה, הפסיק ליטול ג'ארדיינס וננה  
מיד לרופא המטפל או לחדר המין הקרוב אליו.

תופעות הלואין השכיחות ביותר במטופלים שנטלו ג'ארדיינס כוללות:

• **ziehominis בדרכי השתן**

• **ziehominis פטריאטיביים אצל נשים**

**תופעות לוואי שכיחות נוספת:**

• רמת סוכר נמוכה בدم (היפוגליקמיה)

• ziehominis בדרכי הנשימה העליונות

• השתנה מרובה

• שינויים בפרופיל השומנים בדם

• כאבי מפרקים

• ziehominis פטריאטיבי בפי

• בחילה

• צמא

**תופעות לוואי לא שכיחות:**

• ירידת בונף הדם. הסימנים לירידה בונף הדם הם:

ס **ירידה בלחץ הדם**

ס **התיבשות**

ס **נפילה לחץ דם בזמן שינוי תנוחה מישיבה/שכיבה לעמידה**

ס **ה.CompilerServices**

תופעות לוואי שדווחו לאחר השיווק ולא ניתן להגיד את שכיחותן:

• **חמצת קוטוטית (ketosis)** (ראה תופעות לוואי חמורות לעיל)

• **דלקת كلיה ואגן הכליה (pyelonephritis)**

• **אלח דם כתוצאה מזיהום במערכת השתן (urosepsis)**

• **התנפחות של הפנים, השפתיים, הגרון (אנגיאודמה)**

• **תגובהות עוריות (למשל פריחה או סרפדת)**

• **פגעה כליתית חריפה**

• **דלקת נמקית של החיתולית (necrotizing fasciitis)**

• **עצירות**

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי הוזכרה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המוקן

לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. אין לאחסן את התרופה?

• יש לאחסן את התכשיר מתחת ל- $30^{\circ}\text{C}$ .

• מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון ואריזת המגש (בליסטר). תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חדש.

• אין להשתמש בתרופה זו אם האזיה פגומה.

• אין להשאיר תרופות דרך האשפה או הכיר. שאל את הרוקח איך לזרוק את התרופות בהן אין משתמש יותר. אמצעים אלו יעזרו להגן על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

• **נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, hydroxypropylcellulose, croscarmellose sodium, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.

ציפוי הטבילה מורכב מ:

Hypromellose 2910, titanium dioxide, talc, macrogol 400, iron oxide yellow.

• כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזיה:  
ג'ארדיינס 10 מ"ג הינו טבליות מצופות, עגולות, בצבע צהוב בהיר, קמורות בשני הצדדים עם שלולים משופעים. על צד אחד של הטבילה מוטבע "10 S" ובצד השני מופיע הלוגו של בורינגרא אינגליהים.

ג'ארדיינס 25 מ"ג הינו טבליות מצופות, אובליות, בצבע צהוב בהיר, קמורות בשני הצדדים. על צד אחד של הטבילה מוטבע "25 S" ובצד השני מופיע הלוגו של בורינגרא אינגליהים. הטבליות ארוזות בבליסטר. כל אזיה מכילה 7, 30, 60 או 90 טבליות מצופות. ניתן שלא כל גודלי האזיות משוקקים.

• בעל הרישום וכותבו: בורינגרא אינגליהים ישראל בע"מ, מדינת היהודים 89, ת.ד. 4124, הרצליה פיתוח 4676672.

• שם היצן וכותבו: בורינגרא אינגליהים פארמה, אינגליהים אם ריין, גרמניה.

• עלון זה נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
ג'ארדיינס 10 מ"ג 00-34202-154-22-34203-154-23-34203-154-25 מ"ג 00-34203-154-23-34203-154-25

שם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.