

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق هذا الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تيتوثيامد إينوفايد

أقراص مطالية

المواد الفعالة:

يحتوي كل قرص مطالي على:

إمترسيتابين (emtricitabine) 200 ملجم

تيتوثيامد ديسوپروكسيل (tenofovir disoproxil) 245 ملجم (ما يعادل 300 ملجم من تيتوثيامد ديسوپروكسيل فومارات [tenofovir disoproxil fumarate])

لائحة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية". بالإضافة إلى ذلك، أنظر "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء" في الفقرة 2 من هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تتحوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك إسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصفة هذا الدواء من أجلك لا تغطى للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء مخصوص للبالغين فوق عمر 18 سنة.

بالإضافة إلى النشرة، تتوفر للمستحضر تيتوثيامد إينوفايد كراسة معلومات حول الأمان للمعالج. تحتوي هذه الكراسة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ تيتوثيامد إينوفايد والتصرف وفقها. يجب قراءة كراسة المعلومات حول الأمان والنشرة للمستهلك بتعمّن قبل بدء إستعمال المستحضر.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

تيتوثيامد إينوفايد هو علاج للتلوث بفيروس الفشل المناعي البشري (HIV) لدى البالغين من عمر 18 سنة وما فوق، بمشاركة أدوية إضافية مضادة للفيروسات القهقرية.

الفحصية العلاجية: من مثبتات المتنفسة العكسية (ترانسكريبتاز العكسي) المضادة للفيروسات.

يحتوي تيتوثيامد إينوفايد على مادتين فعاليتين، إمترسيتابين وتينوفوثير ديسوپروكسيل. هاتان المادتان الفعاليتان هما عبارة عن مثبت متنفسة عكسية نوكليوزيدي وتيتوثيامد عبارة عن مثبت متنفسة عكسية نوكليوتيد. مع ذلك، فإن كل من الـ ـ دوائين يُعرفان عادة بأنهما من مثبتات المتنفسة العكسية التوكليوزيدية (NRTIs) وعملهما هو عرقلة النشاط الإعتيادي لإنزيم (المتنفسة العكسية) الذي يعتبر ضروريًا لعملية إستنساخ فيروس HIV.

• يستعمل تيتوثيامد إينوفايد لعلاج التلوث بفيروس الفشل المناعي البشري من النوع 1-1 (HIV)، لدى البالغين من عمر 18 سنة وما فوق.

- يجب إستعمال تيتوثيامد إينوفايد دائمًا بمشاركة أدوية أخرى لعلاج تلوث HIV.

- بإمكانك تناول تيتوثيامد إينوفايد بدلًا من تناول إمترسيتابين وتينوفوثير ديسوپروكسيل كل على حدة بنفس المقادير الدوائية.

أثناء تناول الدواء، فإن حامل الفيروس HIV لا يزال بإمكانه نقل الفيروس، بالرغم من إنخفاض الخطورة نتيجة علاج ناجح لمضاد للفيروسات القهقرية. يجب إشارة طبيبك بخصوص وسائل الحذر الالزمة من أجل منع إنتقال العدوى.

هذا الدواء لا يشفى من تلوث HIV. أثناء تناول تيتوثيامد إينوفايد، أنت لا تزال معرضًا لتطوير تلوثات أو أمراض أخرى مرتبطة بـ HIV. حتى عند تناول هذا الدواء فلا يزال بإمكانك نقل عدو HIV، بالرغم من أن علاجاً ناجحاً بدواء ضد المتنفسة العكسية يقلل من الخطورة. يستشرط الطبيب بخصوص وسائل الحذر الالزمة من أجل منع إنتقال العدوى لأشخاص آخرين.

• يستعمل تيتوثيامد إينوفايد أيضًا للتقليل من خطورة الإصابة بـ HIV لدى البالغين، عندما يتم تناول الدواء كعلاج يومي، بمشاركة سلوك جنسي آمن: أنظر الفقرة 2، قائمة وسائل الحذر التي يجب إتخاذها ضد الإصابة بـ HIV-1.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergicي) لإمترسيتابين، تينوفوثير ديسوپروكسيل، أو لك واحد من المرکبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (مدرجة في الفقرة 6 وفي الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء").

إذا كان أيًّا مما سبق ينطبق عليك، فيجب عليك إخبار الطبيب بذلك على الفور.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل إستعمال تيتوثيامد إينوفايد، من أجل تقليل خطورة الإصابة بعدوى HIV فقط في حال

• قبل بدء العلاج بـ تيتوثيامد إينوفايد، عليك ألا تكون حاملاً لفيروس HIV وذلك من أجل التقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV. يجب عليك الخضوع للفحص من أجل التأكد من أنك لست حاملاً لفيروس HIV بالفعل. لا تقم بتناول تيتوثيامد إينوفايد من أجل التقليل من الخطورة إلا إذا تأكدت من أنك لست حاملاً لفيروس HIV. يتوجب على حامل الفيروس HIV تناول تيتوثيامد إينوفايد بمشاركة أدوية أخرى.

• العديد من الفحوصات التي تجري لتشخيص حمل فيروس HIV قد لا تقوم بتشخيص عدو قد حدث مؤخرًا. في حال كنت مصاباً بمرض يشبه الإنفلونزا، فمن الجائز بأن تكون قد أصبت مؤخرًا بـ HIV.

العلامات التي يمكنها أن تدل على الإصابة بعدوى HIV هي:

• إرهاق.

• سخونة.

• آلام في العضلات أو في المفاصل.

• صداع.

• تقيؤات أو إسهال.

• طفح.

• تعرق ليالي.

• تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو في الأربية (أصل الفخذ) بلغ طبيبك عن كل مرض شبيه بالإنفلونزا - سواء كان خلال الشهر الذي سبق بدء العلاج بـ تيتوثيامد إينوفايد أو في أي وقت خلال فترة تناول تيتوثيامد إينوفايد.

تحذيرات وإحتياطات خلال فترة تناول تيتوثيامد إينوفايد من أجل التقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV:

• قم بتناول تيتوثيامد إينوفايد كل يوم من أجل التقليل من الخطورة، وليس فقط عندما تتعقد بأنك معرض لخطورة الإصابة بعدوى HIV. لا تفوت جرعة دوائية من تيتوثيامد إينوفايد، أو تتوقف عن تناول الدواء، إن تقويت جرعة دوائية قد يزيد من خطورة إصابة بـ HIV.

• قم بالخضوع لفحص HIV بشكل منتظم.

• بلغ طبيبك على الفور إذا كنت تشك بأنك قد أصبت بـ HIV، من الجائز أن يقوم الطبيب بإجراء فحوصات إضافية من أجل التأكد من أنك لست حاملاً لفيروس HIV.

• إن تناول تيتوثيامد إينوفايد لا يضمن عدم الإصابة بعدوى HIV. على إتخاذ الخطوات التالية:

○ إحراص على سلوك جنسي آمن. إستعمل الكوندوم (الواقي الذكري) من أجل تقليل التلامس مع السائل المنوي، السوائل المهبلية أو مع الدم.

○ لا تقم بمشاركة الأعراض الشخصية التي يمكن أن تحتوي على دم أو على سوائل الجسم، مثل فرش الأسنان وشفرات الحلاقة.

○ لا تقم بمشاركة أبواب أو باباً إستعمال الإبر أو أدوات الحقن أو المعدات الطبية.

○ قم بالخضوع لفحوصات الـ HIV-1 مل (نصف كأس) من الماء، عصير البرقان أو التسبب بإصابة آخرين بـ HIV.

• قم دائمًا بتناول تيتوثيامد إينوفايد لعلاج HIV أو للتقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV.

• تيتوثيامد إينوفايد قد يضر بالكلية. قبل تناول تيتوثيامد إينوفايد، يجب تناول تيتوثيامد إينوفايد إنفو ثيروبيكير (NSAIDs) لتسكن آلام العظام أو

العضلات.

إذا كنت تتناول دواء إضافياً مضاداً للفيروسات يسمى مثبط بروتيلاز لعلاج HIV، فمن الجائز أن يوجهك طبيبك لإجراء فحوصات الدم من أجل متابعة وظائف الكلية عن كثب.

من المهم أيضًا أن تخبر الطبيب إذا كنت تتناول ليديباسفير / سوفوسوبورافير، فيلپاتاسفير أو سوفوسوبورافير / فيلپاتاسفير / فيلپاتاسفير / فيلپاتاسفير.

• تناول تيتوثيامد إينوفايد مع أدوية أخرى غير موصى به بما في ذلك ديدانوزين (Didanosine) (العلاج تلوث HIV).

إن تناول تيتوثيامد إينوفايد مع أدوية أخرى قد يضر بـ HIV، وإن تناول تيتوثيامد إينوفايد مع ديدانوزين قد يرفع من مستويات ديدانوزين في الدم وقد يقلل من تعداد خلايا CD4. في أحياناً نادرة تم التليل عن حدوث إلتهاب البنكرياس والمحاضن الالكتريك (فأيضاً من مثبتات المتنفسة العكسية التوكليوزيدية (NRTIs))، مما يتسبب في تقوية جرعة دوائية قد يزيد من خطورة إصابة بـ HIV.

• إذا كنت بالفعل تتناول تيتوثيامد إينوفايد، يجب تناول تيتوثيامد إينوفايد بـ HIV أو للتقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV.

• قم بتناول تيتوثيامد إينوفايد على أقل من 1 ملليمول من الصوديوم (23 ملجم) في كل قرص، ولذلك فهو يعتبر خال من الصوديوم.

• **الأطفال والمراهقون**: تيتوثيامد إينوفايد غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

• **الاتصالات/التفاعلات بين الأدوية**: لا تتناول تيتوثيامد إينوفايد إنفو ثيروبيكير على بعض مرکبات الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergicي) لإمترسيتابين، تينوفوثير ديسوپروكسيل، أو لك واحد من المرکبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (مدرجة في الفقرة 6 وفي الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء").

إذا كان أيًّا مما سبق ينطبق عليك، فيجب عليك إخبار الطبيب بذلك على الفور.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل إستعمال تيتوثيامد إينوفايد:

• قبل إستعمال تيتوثيامد إينوفايد، من أجل تقليل خطورة الإصابة بعدوى HIV فقط في حال

• قبل بدء العلاج بـ تيتوثيامد إينوفايد، عليك ألا تكون حاملاً لفيروس HIV وذلك من أجل التقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV. يجب عليك الخضوع للفحص من أجل التأكد من أنك لست حاملاً لفيروس HIV بالفعل. لا تقم بتناول تيتوثيامد إينوفايد من أجل التقليل من الخطورة إلا إذا تأكدت من أنك لست حاملاً لفيروس HIV. يتوجب على حامل الفيروس HIV تناول تيتوثيامد إينوفايد بمشاركة أدوية أخرى.

• العديد من الفحوصات التي تجري لتشخيص حمل فيروس HIV قد لا تقوم بتشخيص عدو قد حدث مؤخرًا. في حال كنت مصاباً بمرض يشبه الإنفلونزا، فمن الجائز بأن تكون قد أصبت مؤخرًا بـ HIV.

العلامات التي يمكنها أن تدل على الإصابة بعدوى HIV هي:

• إرهاق.

• سخونة.

• آلام في العضلات أو في المفاصل.

• صداع.

• تقيؤات أو إسهال.

• طفح.

• تعرق ليالي.

• تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو في الأربية (أصل الفخذ) بلغ طبيبك عن كل مرض شبيه بالإنفلونزا - سواء كان خلال الشهر الذي سبق بدء العلاج بـ تيتوثيامد إينوفايد أو في أي وقت خلال فترة تناول تيتوثيامد إينوفايد.

تحذيرات وإحتياطات خلال فترة تناول تيتوثيامد إينوفايد من أجل التقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV:

• قم بتناول تيتوثيامد إينوفايد كل يوم من أجل التقليل من خطورة، وليس فقط عندما تتعقد بأنك معرض لخطورة الإصابة بعدوى HIV. لا تفوت جرعة دوائية من تيتوثيامد إينوفايد، أو توقف عن تناول الدواء، إن تقويت جرعة دوائية قد يزيد من خطورة إصابة بـ HIV.

• قم بالخضوع لفحص HIV بشكل منتظم.

• بلغ طبيبك على الفور إذا كنت تشك بأنك قد أصبت بـ HIV، من الجائز أن يقوم الطبيب بإجراء فحوصات إضافية من أجل التأكد من أنك لست حاملاً لفيروس HIV.

• إن تناول تيتوثيامد إينوفايد لا يضمن عدم الإصابة بعدوى HIV. على إتخاذ الخطوات التالية:

○ إحراص على سلوك جنسي آمن. إستعمل الكوندوم (الواقي الذكري) من أجل تقليل التلامس مع السائل المنوي، السوائل المهبلية أو مع الدم.

○ لا تقم بمشاركة الأعراض الشخصية التي يمكن أن تحتوي على دم أو على سوائل الجسم، مثل فرش الأسنان وشفرات الحلاقة.

○ لا تقم بمشاركة أبواب أو باباً إستعمال الإبر أو أدوات الحقن أو المعدات الطبية.

○ قم بالخضوع لفحوصات الـ HIV-1 مل (نصف كأس) من الماء، عصير البرقان أو التسبب بإصابة آخرين بـ HIV.

• قم دائمًا بتناول تيتوثيامد إينوفايد لعلاج HIV أو للتقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV.

• **الأدوية المضادة للإلتهابات غير السيروئيدية (NSAIDs)**: لتسكن آلام العظام أو

العضلات.

إذا كنت تتناول دواء إضافياً مضاداً للفيروسات يسمى مثبط بروتيلاز لعلاج HIV، فمن الجائز أن يوجهك طبيبك لإجراء فحوصات الدم من أجل متابعة وظائف الكلية عن كثب.

من المهم أيضًا أن تخبر الطبيب إذا كنت تتناول ليديباسفير / سوفوسوبورافير، فيلپاتاسفير أو سوفوسوبورافير.

• تناول تيتوثيامد إينوفايد مع أدوية أخرى غير موصى به بما في ذلك ديدانوزين (Didanosine).

إن تناول تيتوثيامد إينوفايد مع ديدانوزين على شكل آلام مستمرة أو متقطنة يضر بـ HIV، وإن تناول تيتوثيامد إينوفايد مع ديدانوزين قد يرفع من مستويات ديدانوزين في الدم وقد يقلل من تعداد خلايا CD4. في أحياناً نادرة

تم التليل عن حدوث إلتهاب البنكرياس والمحاضن الالكتريك (فأيضاً من مثبتات المتنفسة العكسية التوكليوزيدية (NRTIs))، مما يتسبب في تقوية جرعة دوائية قد يزيد من خطورة إصابة بـ HIV.

• إذا كنت بالفعل تتناول تيتوثيامد إينوفايد، يجب تناول تيتوثيامد إينوفايد بـ HIV أو للتقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV.

• قم بتناول تيتوثيامد إينوفايد على أقل من 1 ملليمول من الصوديوم (23 ملجم) في كل قرص، ولذلك فهو يعتبر خال من الصوديوم.

• **الأطفال والمراهقون**: تيتوثيامد إينوفايد غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

• **الاتصالات/التفاعلات بين الأدوية**: لا تتناول تيتوثيامد إينوفايد إنفو ثيروبيكير على بعض مرکبات الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergicي) لإمترسيتابين، تينوفوثير ديسوپروكسيل، أو لك واحد من المرکبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (مدرجة في الفقرة 6 وفي الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء").

إذا كان أيًّا مما سبق ينطبق عليك، فيجب عليك إخبار الطبيب بذلك على الفور.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل إستعمال تيتوثيامد إينوفايد:

• قبل أن تتناول تيتوثيامد إينوفايد، من أجل تقليل خطورة الإصابة بعدوى HIV فقط في حال

• قبل بدء العلاج بـ تيتوثيامد إينوفايد، عليك ألا تكون حاملاً لفيروس HIV وذلك من أجل التقليل من خطورة الإصابة بعدوى HIV. يجب عليك الخضوع للفحص من أجل التأكد من أنك لست حاملاً لفيروس HIV بالفعل. لا تقم بتناول تيتوثيامد إينوفايد من أجل التقليل من الخطورة إلا إذا تأكدت من أنك لست حاملاً لفيروس HIV. يتوجب على حامل الفيروس HIV تناول تيتوثيامد إينوفايد بمشاركة أدوية أخرى.

• العديد من الفحوصات التي تجري لتشخيص حمل فيروس HIV قد لا تقوم بتشخيص عدو قد حدث مؤخرًا. في حال كنت مصاباً بمرض يشبه الإنفلونزا، فمن الجائز بأن تكون قد أصبت مؤخرًا بـ HIV.

العلامات التي يمكنها أن تدل على الإصابة بعدوى HIV هي:

أخبر الطبيب على الفور عن أعراض جديدة أو شادة التي ظهرت بعد التوقف عن العلاج، خاصة الأعراض التي ترتبطها بتلوث من نوع التهاب الكبد B.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر لذلك، إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال تينوفايد إينوفايد قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين، على الرغم من أنها قد لا تظهر عند الجميع. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

أخبر الطبيب عن كل واحد من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية خطيرة محتملة: أخبر الطبيب على الفور

- حُمَاض لاكتيكي (فائض من حمض اللاكتيك في الدم) هو عبارة عن عرض جانبي نادر. مع ذلك، فهو قد يشكل خطرًا على الحياة. يظهر الحُمَاض اللاكتيكي في كثير من الأحيان لدى النساء، خاصة إذا كان يعاني من وزن زائد، ولدى الأشخاص الذين يعانون من مرض كبدى. علامات محتملة للحُمَاض اللاكتيكي:
 - تنفس عميق وسريع
 - شعور بسعال
 - غثيان، تقيؤات
 - آلام في البطن

إذا كنت تعتقد بأن لديك حُمَاض لاكتيكيًا، فتوجه على الفور لتلقي علاجاً طبياً.

- آية علامة لوجود إلتهاب أو تلوث. لدى بعض المتعالجين الذين يعانون من تلوث HIV (إيدز) متقدم وسابقة للتلوثات إنتهازية (تلوثات تظهر لدى أشخاص ذوي جهاز مناعي ضعيف)، فإن علامات وأعراض إلتهاب ناجم عن تلوثات سابقة قد تظهر بعد فترة قصيرة من بدء العلاج المضاد لـ HIV. من المرجح أن سبب هذه الأعراض هو رد الفعل المناعي للجسم، والذي يسمح للجسم بمحاربة التلوثات التي كانت موجودة سابقاً من دون أعراض واضحة.

- أمراض المناعة الذاتية هي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي أنسجة سليمة في الجسم، حيث من شأنها أن تظهر أيضاً بعد بدء تناول أدوية لعلاج تلوث HIV. قد تتطور أمراض المناعة الذاتية بعد أشهر عديدة من بدء العلاج. كمن تبها لأي أعراض تشير إلى حدوث تلوث أو أي أعراض أخرى، مثل:
 - ضعف في العضلات
 - ضعف ببدأ في راحتي اليدين وراحتي القدمين ويمتد نحو الأعلى بإتجاه الجسم
 - خربات قلب، إرتجاف أو فرط النشاط (hyperactivity)

إذا لاحظت حدوث هذه الأعراض أو أي علامة على وجود إلتهاب أو تلوث، توجه على الفور لتلقي العلاج الطبي.

أعراض جانبية محتملة:

- أعراض جانبية شائعة جداً (very common) – أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة
 - إسهال، غثيان، تقيؤات
 - دوار، صداع
 - طفح
 - شعور بالضعف

من الجائز أن يلاحظ أيضًا من خلال الفحوصات:

- إنخفاض في نسبة الفوسفور في الدم
- ارتفاع في نسبة الكرياتين كيناز

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 100

- آلام، آلام بطن
- أرق، أحلام شاذة

مشكلات في الهضم والتي تؤدي إلى عدم راحة بعد الوجبات، شعور بالإنتفاخ، غازات في البطن

- طفح بما في ذلك نقاط حمراء أو بقع حمراء كبيرة، تتفاقم أحياناً مع حويصلات وإنفاس الجلد، والذي قد يكون رد فعل تحسسي، حكة، تغيرات في لون الجلد بما في ذلك تشكيل بقع داكنة على الجلد

ردود فعل تحسسية أخرى، مثل الصفير، الإنفاس، الشعور بدوران خفيف من الجائز أن يلاحظ أيضًا من خلال الفحوصات:

- إنخفاض في نسب البوتاسيوم في الدم
- ارتفاع في نسب الكرياتينين في الدم
- تغيرات في البول

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر لدى 1-10% مستعملين من بين 10,000

- الحُمَاض لاكتيكي (أنظر "أعراض جانبية خطيرة محتملة")
- الكبد الدهني

إصفار الجلد أو العينين، حكة أو آلام في البطن الناجمة عن إلتهاب في الكبد، إلتهاب في الكلى، كثرة التبول والعطش، القصور الكلوي، تضرر خلايا نبيبات الكلى

- تلين العظام (متراافق مع آلام في العظام. أحياناً تؤدي هذه الحالة إلى حدوث كسور) • آلام في الظهر ناجمة عن مشاكل في الكلى

تضرر خلايا نبيبات الكلى الذي قد يكون مرتبطة بتفتك العضل، تلين العظام (متراافق مع آلام في العظام، أحياناً تؤدي هذه الحالة إلى حدوث كسور)، آلام في العضلات، ضعف في العضلات وإنخفاض في نسب البوتاسيوم أو الفوسفور في الدم.

إذا لاحظت ظهور أي عرض جانبي مذكور في هذه النشرة، أو إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

وتيرة شيوع الأعراض الجانبية التالية غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوها بعد):

- مشاكل في العظام. قد يتطور لدى بعض المتعالجين الذين يتناولون أدوية مرتبطة مضادة للفيروسات القهقرية، مثل تينوفايد، مرض في العظم يسمى التخر العظمي osteonecrosis، موت نسيج العظم نتيجة نقص في تزويد العظم بالدم). إن تناول أدوية من هذا النوع لفترة زمنية طويلة، تناول كورتيكosteroides، شرب الكحول، ضعف شديد في الجهاز المناعي وزيادة الوزن هي جزء من عوامل الخطورة العديدة لتطور هذا المرض. علامات التخر العظمي تشمل:
 - تصلب المفاصل
 - آلام وأوجاع في المفاصل (خاصة في مفاصل الفخذ، الركبة والكتف)
 - صعوبات في الحركة

إذا لاحظت ظهور إحدى هذه الأعراض، فأخبر الطبيب بذلك.

خلال فترة العلاج بأدوية HIV من الجائز حدوث زيادة في الوزن وفي نسب الدهون والجلوكوز في الدم. يرتبط هذا الأمر جزئياً بتحسين الصحة ونمط الحياة، وفي حالة الدهون في الدم فإن الأمر يرتبط أحياناً بأدوية HIV نفسها. سوف يقوم الطبيب بإجراء فحوصات من أجل كشف هذه التغيرات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك إستشارة الطبيب.

التبلغي عن أعراض جانبية

بالإمكان التبلغي عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغي عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغي عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بواسطة التبلغي عن أعراض جانبية، يمكنك أن تساعد في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أبدي و المجال رؤية الأطفال /أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسمم بدون تليميções صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال هذا الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين هذا الدواء بدرجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية. يجب تخزينه بالعلبة الأصلية من أجل حمايته من الرطوبة.

العبوة على شكل قنية: مدة الصلاحية بعد الفتح الأولى للقنية التي تحتوي على 30 قرصاً مطلياً بالإمكان الإستعمال خلال 90 يوماً، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنقضاء صلاحية المستحضر. حافظ على إبقاء القنية مغلقة بإحكام.

لا يجوز رمي الأدوية إلى المجرى أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعده في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على:

Cellulose microcrystalline, lactose anhydrous, croscarmellose sodium, opadry II blue 32K505040, magnesium stearate.

Opadry II blue 32K505040: hypromellose 2910 (E464), lactose monohydrate, titanium dioxide (E171), triacetin, FD&C blue #2 indigo carmine aluminum lake (E132).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

قرص مطلي، باللون الأزرق، على شكل كبسولة، محدب من كلا الجانبين، على جانب واحد منه مطبوع "LA49" والجانب الآخر أملس.

نوع العبوة: يتوفّر الدواء على شكل عبوتين كما هو مفصل:

- عبوة كرتونية تحتوي على لوحيات/بليسترات بالإجمال تحتوي كل علبة كرتونية على 30 أو 72 قرصاً مطلياً.

قنية بلاستيكية تحتوي على 30 قرصاً مطلياً وماص للرطوبة، تحتوي القنية على جل السيليكا الماخص للرطوبة والموضع في وعاء منفرد ولا يجوز بلعه. يجب إبقاء ماص الرطوبة في داخل القنية من أجل حماية الأقراص.

القنية مغلقة بقطاء يصعب فتحه من قبل الأطفال.

تعليمات الفتح: من أجل نزع الغطاء، يجب الضغط نحو الأسفل وفي ذات الوقت يجب التدوير نحو اليسار (بعكس إتجاه عقارب الساعة). تعليمات الإغلاق: يجب وضع الغطاء على طرف القنية المفتوح وتدويره نحو اليمين (بإتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق الكامل.

من الجائز أن تنسوق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز وعنوانه: إينوفايد م.ض، ص.ب. 62، إيفن يهودا 40500.

إسم المنتج: مختبرات لاوروس م.ض، حيدر آباد، تيلانجانا، الهند.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

171-61-36295

من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكل الجنسين.

تم إعدادها في كانون الثاني 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

TENO CTAB PL SH 201222