

טנובמד אינוביומד

טבלויר מזוכפתות

וחומרם פעילים:

כל טבלייר מצופה מכילה:

אמטריציטאבין (emtricitabine) 200 מ"ג

טנופורויר דיסופורוקסיל (tenofovir disoproxil) 245 מ"ג

(מקביל ל-300 מ"ג טנופורויר דיסופורוקסיל פומרטט [fumarate])

לרשימת החומרים הבלתי פיעלים והאלגניים של התפקיד

"מידע נסוך". כמו כן, ראה "מידע חשוב על חקל המרמיציבים של התפקיד"

בՍעיף 2 של עלון.

קרוא בעיון את העלון עד סופו ברוטם תשמש בתפקיד. לעון זה מכיל

מידע תכתי על הרופאה. אם יש לך שאלות נוספים, פנו לא הרופא או

אל הרוקח. הרופאה ווושמה עברך. אל תעבור אחריהם. היא עלולה

להזכיר לך אם איפוא לא ראה לך מכתב הרופאי דומה.

התרופה מיועדת למוגדים בלבד.

בונוס לעלון, לטנובמד מיועד בטיפול השוב, שעורי לדעת, לנו התחלה הטיפול

בטנובמד אינוביומד בטנובמד אינוביומד, בשילוב עם תרופות אנטרטורויראליות

ונסוכות.

1. מה מיועדת התפקיד?

טנובמד אינוביומד היא טיפול ביהום בנגיף הכתול הסיכון לאויש (HIV) במוגרים בני 18 שנים ומעליהם, בשילוב עם תרופות אנטרטורויראליות

ונסוכות.

קבוצה תרופיתית: מעכבי טנסקייפט אופכי וגדי גיפים.

טנובמד אינוביומד משמשו רפואיים, אטראציטאבין וגדי גיפים,

דיסופורוקסיל, טנופורויר דיסופורוקסיל, אטראציטאבין הא מכב טנסקייפט אופכי דריין

הופכי נוקלאוזידינו פורויר הא מכב טנסקייפט אופכי דריין (NRTIs) (פערלון הייא הפעלה לשיפול נגיף HIV).

טנובמד אינוביומד משמשת לטיפול בזיהום הכתול הנגיפי 1 (HIV),

לטנובדים בני 18 שנים ומעליהם.

יש להמשיך מידע בטנובמד אינוביומד בשילוב עם תרופות אחרות

לטיפול ביהום - HIV.

ו- יונט לטנובמד אינוביומד לטנובם לטיפול טיפול נגיף HIV, יש להוועץ ברופא

דיסופורוקסיל כאר דיבור באותם מונינים.

בעת ניילת הרופאה, נשא HIV דערין עלולים להעיר את הנגיף, למורת

שהסיכון מופחת בעקבות טיפול נגיף HIV. יונט להוועץ ברופא

של לגבי אנטישם ניגיר הורות מונין נגיף HIV.

התרופה הדורדים כדי לדען הדקה של אונשים אחרים.

טנובמד אינוביומד גם משמשת לפחתת הסיכון להדבקות - HIV.

במוגרים, כאשר גודל הסיכון את התפקיד בטיפול יומי, בשילוב עם התנהלות

מיונית בטוחה:

עדין ליל פחתת הרופאה זו אהה עדין עלול להוועץ HIV, למורת שיפול נגיף HIV. יונט להוועץ ברופא את הנגיף, למורת

ההזרה הדורדים כדי לדען הדקה של אונשים אחרים.

טנובמד אינוביומד, כאשר גודל הסיכון את התפקיד בטיפול יומי, בשילוב עם התנהגות

ב- HIV. גם רשות עצמי האזהירות שיש לנוקט נגד הדבקות

- HIV-1.

2. לפני השימוש בתפקיד

אין להשתמש בתפקיד אם:

• אתה אלרגי לאטראציטאבין, טנופורויר, טנופורויר דיסופורוקסיל, או

• כל מנת להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV. עלך להבדק על מנת

אם דרום דברך.

• לטנייה זיהילת הטיפול בטנובמד אינוביומד להזנת נגיף HIV עלולים להזנת נגיף HIV.

לודאי שאין כבר נושא של HIV. אל לטנובמד אינוביומד להפחית הסיכון אלין רדראת אלין עיל, יש להוועץ ברופא

טנובמד אינוביומד בשילוב עם תרופות אחרות.

• בירקון רבת נשאות HIV עלולים שלא לאבחן הדבקה של האזרה

לאזרונה - HIV.

הסיכון הניכלים להעדי על הדבקות - HIV הינם:

• עיפוי

• חום

• כאבי שרירים או מפרקים

• כאבי ראש

• הקאות או שלשולים

• פריחה

• יצעת לילה

• בלוטת ליפה מוגדלות בצוואר או במפשעה

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV רק

על מנת להפחית את הסיכון להדבקות - HIV. אל לטנובמד אינוביומד להפחית

להזנת נגיף HIV. לא לטנובמד אינוביומד לאילן שפאש של HIV. נשא HIV חייבם ליטול

הסיכון אלין רדראת אלין עיל, יש להוועץ ברופא את הנגיף HIV.

לודאי שטנובמד אינוביומד בשילוב עם תרופות אחרות.

• בירקון רבת נשאות HIV עלולים שלא לאבחן הדבקה של האזרה

לאזרונה - HIV.

הסיכון הניכלים להעדי על הדבקות - HIV הינם:

• עיפוי

• חום

• כאבי שרירים או מפרקים

• כאבי ראש

• הקאות או שלשולים

• פריחה

• יצעת לילה

• בלוטת ליפה מוגדלות בצוואר או במפשעה

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת

טנובמד אינוביומד.

אזורות ומצאי הרווחת ב- HIV:

זמן נטילת טנובמד אינוביומד מלבד הדבקות - HIV ו- להפחית הסיכון בהדבקות

- HIV:

טנובמד אינוביומד, על מנת להפחית את הסיכון בהדבקות

טנובמד אינוביומד יכול להפחית את הסיכון בהדבקות - HIV.

דוחות להוועץ שלר כל מחלות המועברות בטעינה – בין אם במהלך נטילת