

## ستافديبريم كريم

المادة الفعالة وتركيزها: حمض الفوسيديك 2% (fucidic acid 2%)

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: أنيتر الفصل 2 بند "معلومات مهمة عن جزء من مركيبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة يامعنى حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف من أجلك، لا تعطه للآخرين. قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا لك أن حاليهم الطبية متشابهة.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

ستافديبريم كريم هو مستحضر مضاد حيوي للعلاج الموضعي بحالات عدوى الجلد الجرثومية الحساسة للمستحضر.

**الفصيلة العلاجية:** مضاد حيوي للاستعمال الموضعي.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال المستحضر إذا:

- كنت حساساً (أرجو) لمادة الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- لا يجوز استعمال ستافديبريم كريم لوقت متواصل، لأن الاستعمال المتواصل قد يزيد الخطورة لحدوث مقاومة من الجراثيم للمضاد الحيوي، وبذلك الإضرار بنجاعة الدواء.
- امتنع عن ملامسة الكريم للعينين (مثلاً إذا انتقل بالخطأ من اليدين أو إذا كان الاستعمال قريباً للعينين) ما قد يؤدي إلى تبيّح (حرقة) في العينين.

ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول، أو تناولت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضااع

- إذا كنت حاملاً، تعتدين بأنك حامل، تخططين للدخول في الحمل أو مرحلة، استشيري الطبيب قبل استعمال الدواء.

• يمكن استعمال ستافديبريم كريم إذا كنت حاملاً أو تعتدين بأنك حامل.

- يمكن استعمال ستافديبريم كريم إذا كنت مريضة، لكن لا يجوز دهن الكريم في منطقة الثدي.

السيادة واستعمال الماكينات

- هذا الدواء لا يؤثر عادة على القدرة على السيادة أو تشغيل الماكينات. مع ذلك، إذا كنت تشعر بعرض جانبى الذي قد يضر القدرة على السيادة أو تشغيل الماكينات، استشر الطبيب.

## 4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال ستافيديرم كريم أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين لا تندهى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أن تتعارى من أي منها.

يجب التوجيه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية:  
 رد فعل تحسسي (عرض نادر يظهر لدى مستعمل واحد من بين 1,000 مصعوبة في التنفس، وخذ أو انفاس في الشفتين أو في الفم، انتفاخ الوجه أو الحنجرة، طفح شديد على الجلد).

### أعراض جانبية إضافية

إذا ظهرت أعراض جانبية إضافية أقل خطورة يجب التوجيه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

- طفح أو حكة
- إحصار الجلد

• التهاب الجلد التماسي أو إكزيما (طفح أحمر ومتشرد للحكة في الجلد المصحوب بشعور بسخونة وانتفاخ في المنطقة التي تم بها دهن الكريم)

• شعور بالألم، تبيج (وخز) أو حرقة في المنطقة التي تم بها دهن الكريم.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

- حكة أو تدمع العينين

• انفاس الوجه، الشفتين، الفم، الحنجرة أو اللسان الذي قد يؤدي إلى صعوبات في البلع أو التنفس

- شرقي أو حويصلات

هذه الأعراض قد تحدث أيضا لدى الأطفال الذين يستعملون الدواء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبلیغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط

"التلبلغ عن أعراض جانبية نتيجة للاعواني" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوالك إلى استماراة

عبر الانترنت للتلبلغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإمكان أيضا التلبلغ عبر البريد الإلكتروني: [safety@trima.co.il](mailto:safety@trima.co.il)

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و مجال رؤية الأطفال وأو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب القفرو بدون أمر صريح من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية(exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• بعد الفتح للمرة الأولى يمكن الاستعمال لمدة شهر واحد.

• شروط التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة تحت الد. 25°C.

4023000  
متخصص طبية إسرائيلية  
معبوت مرض.

PIL-1122-04 P00001291

