

סטאפידרם קרם

החומר הפעיל וריכוזו: חומצה פוסידית 2% (fusidic acid 2%)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סטאפידרם קרם הוא תכשיר אנטיביוטי לטיפול מקומי בזיהומי עור חידקיים הרגישים לתכשיר.

קבוצה תרופית: אנטיביוטיקה לשימוש מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בסטאפידרם קרם לזמן ממושך, מפני ששימוש ממושך עלול להעלות את הסיכון לעמידות החידקיים לאנטיביוטיקה, ובכך לפגוע ביעילות התרופה.
- הימנע ממגע של הקרם בעיניים (לדוגמה אם עבר בטעות מהידיים או אם השימוש היה קרוב לעיניים), שעלול לגרום לגירוי (צריבה) בעיניים.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה

אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון, מתכננת להיכנס להיריון או מניקה, היועצי ברופא לפני השימוש בתרופה.

• ניתן להשתמש בסטאפידרם קרם אם את בהיריון או חושבת שאת בהיריון.

• ניתן להשתמש בסטאפידרם קרם אם את מניקה, אך אין למרוח את הקרם באזור השד.

נהיגה ושימוש במכוונות

תרופה זו אינה משפיעה בדרך כלל על יכולת הנהיגה או הפעלת מכוונות. עם זאת, אם אתה חש בתופעת לוואי שעלולה לפגום בכושר

הנהיגה או הפעלת מכוונות, היוועץ ברופא.

מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה

סטאפידרם קרם מכיל:

צטוסטאריל אלכוהול (cetostearyl alcohol) שעלול לגרום לתגובות מקומיות בעור (כגון דלקת עור ממגע [contact dermatitis]).
כלורוקרוזול (chlorocresol) שעלול לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: מריחה של הקרם על האזור הנגוע 3-4 פעמים ביום. אם האזור הנגוע מכוסה בתחבושת, תדירות המריחה תהיה נמוכה יותר.

עליך להבחין בשיפור לאחר מספר ימי שימוש בסטאפידרם קרם. אם לא חל שיפור לאחר שבעה ימים, יש להפסיק השימוש בתכשיר ולפנות לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך השימוש בתכשיר הוא בדרך כלל עד שבועיים, יש להיוועץ ברופא בנוגע לשימוש לתקופה ממושכת יותר. שימוש ממושך עלול ליצור עמידות לתרופה.

אם שכחת למרוח תרופה זו בזמן המיועד, מרח מיד כשזכרת ולאחר מכן המשך את השימוש בזמן המיועד הרגיל.

אופן השימוש: אין בלעול! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש לשטוף ידיים לפני השימוש בסטאפידרם קרם. יש לעטות את הקרם על העור. אם הורה לך הרופא להשתמש בסטאפידרם קרם על הפנים, יש להימנע ממגע עם העיניים.

אם בטעות נגע התכשיר בעיניים, יש לשטוף אותן מיד עם מים קרים ולאחר מכן יש לשטוף עם תמיסה לשטיפת עיניים, אם ניתן. אתה עלול להרגיש תחושת עקצוץ בעין. יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש בסטאפידרם קרם (אלא אם כן אתה משתמש בתכשיר לטיפול הידיים).

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטאפידרם קרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה סובל מאחת מתופעות הלוואי הבאות: תגובה אלרגית (תופעה נדירה המופיעה במשתמש 1 מתוך 1,000), קושי בנשימה, עקצוץ או נפיחות בשפתיים או בפה, נפיחות בפנים או בגרון, פריחה חמורה על העור.

תופעות לוואי נוספות

אם מופיעות תופעות לוואי נוספות פחות חמורות יש לפנות לרופא בהקדם.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- פריחה או גירוד
- אדמומיות של העור
- דלקת עור ממגע או אקזמה (פריחה אדומה ומגדדת בעור המלווה בתחושת חום ונפיחות באזור מריחת הקרם)
- תחושת כאב, גירוי (עקצוץ) או צריבה באזור מריחת הקרם.

תופעות לוואי נדירות (תופעות המופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- עיניים מגרדות ודומעות
 - נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה, הגרון או הלשון אשר עלולה לגרום לקשיי בליעה או נשימה
 - חרלת או שלפוחיות
- תופעות אלו עלולות להתרחש גם בילדים המשתמשים בתרופה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להיוועץ ברופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

ניתן לדווח גם לדוא"ל: safety@trima.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך חודש אחד.

• **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

liquid paraffin, cetostearyl alcohol, white soft paraffin, macrogol cetostearyl ether, sodium dihydrogen - phosphate dihydrate, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

שפופרת אלומיניום המכילה קרם בצבע לבן עד לבן-שמנת.

גודלי אריזה: 15 גרם או 30 גרם.

ייתכן כי לא כל גודלי האריזה משווקים.

היצרן, בעל הרישום וכתובתו: תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.

עלון זה נערך בפברואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 148-97-33238-01

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.