

כרטיס מידע בטיחותי למטופל



ולירג 40 מ"ג טבליות מצופות
(בלזוטופן)

מידע בטיחותי חשוב

אנא שמור איתך כרטיס זה כל הזמן

- כרטיס מידע בטיחותי למטופל זה כולל מידע בטיחות חשוב שעליך להיות מודע אליו לפני, במהלך ולאחר טיפול בולירג (בלזוטופן).
- הצג כרטיס זה לכל איש צוות רפואי המעורב בטיפול שלך.
- צור קשר עם הרופא, הרוקח או האח שלך אם אתה מפתח תופעות לוואי כלשהי. זה כולל גם כל תופעות לוואי אפשריות שאינן מוזכרות בעלון לצרכן.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות בקישור הבא:

<https://sideeffects.health.gov.il>

כמו כן ניתן גם לדווח על תופעות לוואי ישירות לחברת MSD בטלפון: 09-9533333.

על-ידי דיווח תופעות לוואי, אתה יכול לעזור בהבאת מידע נוסף על בטיחות תרופה זו.

מידע בטיחותי חשוב למטופלים

ולירג עלולה לגרום לירידה ברמות החמצן בגופך שעלולה להיות חמורה, מה שיצריך הפסקת טיפול, קבלת טיפול בחמצן או אשפוז. מצב זה נקרא 'היפוקסיה'. הצוות המטפל שלך ינטר את רמות החמצן בגופך לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בולירג.

צור קשר מייד עם הרופא שלך אם אתה מפתח את אחד מהתסמינים הבאים:

- קושי בנשימה או קוצר נשימה
- עלייה בקצב הלב
- נשימה מהירה
- תחושת חרדה או חוסר מנוחה
- גוון כחלחל של העור וסביב הפה
- חוסר יכולת להשלים משפטים במנוחה כתוצאה מקוצר נשימה
- עייפות בלתי רגילה
- בלבול

אם הסימנים או התסמינים הללו נעשים חמורים או מחמירים במהירות, גש לחדר המיון הקרוב אליך או התקשר מיד למוקד 101 לקבלת יעוץ רפואי.

פרטי קשר חשובים

שם הרופא

טלפון של הרופא / מרפאה

שם המטופל

טלפון של הרופא לאחר שעות העבודה

טלפון של המטופל

שם איש קשר למקרים דחופים

מידע חשוב לצוות הרפואי

שים לב כי מטופל זה מקבל טיפול בולירג (בלזוטיפון).
ולירג עלול להעלות את הסיכון להיפוקסיה. אנא עיין בעלון לרופא של ולירג
להנחיות לגבי ניהול תופעת הלוואי של היפוקסיה.
למידע נוסף, ניתן לפנות לחברת MSD בטלפון: 09-9533333.
* הנוסח הינו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הכרטיס מיועד לנשים וגברים כאחד.

טלפון איש קשר למקרים דחופים

כרטיס מידע בטיחותי למטופל של ולירג מבוסס על הכרטיס שמופץ בבריטניה

אנא עיין בעלון לצרכן
שבתוך אריזת התכשיר טרם השימוש

