

ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ

أقرص مطلية

يحتوي كل قرص على:

ريفاروكسابان 2.5 ملغ (rivaroxaban 2.5 mg)

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو كان يبدو لك أن مرضهم مشابه.

بالإضافة إلى النشرة، يوجد للمستحضر ريفاروكسابان تارو بطاقة معلومات سلامة للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مهمة التي يجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وأثناء العلاج بريفاروكسابان تارو والعمل بموجبها. يجب قراءة بطاقة معلومات السلامة للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن، قبل بدء استعمال المستحضر. يجب الاحتفاظ بالبطاقة والنشرة لمراجعتها مرة أخرى عند الحاجة.

1. لم أعد هذا الدواء؟

- ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ، بتوليفة مع حمض أسيتيل الساليسيليك (المعروف باسم الأسبيرين) أو بتوليفة مع حمض أسيتيل الساليسيليك وكلوبيدوجريل، مخصص لمنع حوادث عصيدية خثارية (أحداث خثارية) لدى متعالجين بالغين بعد متلازمة الشريان التاجي الحادة (مجموعة من الحالات التي تشمل نوبة قلبية وذبحة صدرية غير مستقرة، وهي نوع شديد من الألم في الصدر) والتي لها ارتفاع بمؤشرات قلبية معينة في اختبارات الدم.
- ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ، بتوليفة مع حمض أسيتيل الساليسيليك (المعروف باسم الأسبيرين)، مخصص لمنع حوادث عصيدية خثارية (أحداث خثارية) لدى متعالجين بالغين يعانون من مرض الشريان التاجي أو مرض الشريان المحيطي العرضي المعرضين لخطر مرتفع لحوادث إقفارية.

المجموعة العلاجية: ريفاروكسابان ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مضادات التخثر ويعمل عن طريق تقليل الميل لتشكل خثرات دموية وهذا عن طريق حصر عامل مشارك في عملية التخثر (العامل Xa).

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجيًا) لريفاروكسابان أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات غير الفعالة، انظر البند 6 "معلومات إضافية".
- كنت تعاني من نزيف متزايد.
- كان لديك مرض أو حالة في عضو في الجسم يزيدان من الخطر لنزيف حادّ (مثل: قرحة المعدة، كدمة أو نزيف في الدماغ، جراحة في الدماغ أو في العينين التي حدثت مؤخرًا).
- كنت تتناول أدوية لمنع خثرات الدم (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبكسيبان أو هيبارين)، إلا في حالات الانتقال من علاج مضاد للتخثر إلى بديل آخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال قسطار وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا.
- كنت تعاني من متلازمة الشريان التاجي الحادة واختبرت في الماضي نزيفًا أو خثرة دموية في الدماغ (سكتة دماغية).

- كنت تعاني من مرض الشريان التاجي أو مرض الشرايين المحيطية وكان لديك في الماضي نزيف في الدماغ (سكتة دماغية) أو كان هناك انسداد للشرايين الصغيرة التي تزود الدم إلى أنسجة الدماغ العميقة (سكتة دماغية جويّة) أو إذا كان لديك خثرة دموية في الدماغ (سكتة دماغية إقفارية، ليست جويّة) في الشهر السابق.
- كنت تعاني من مرض كبد الذي يسبب زيادة خطر النزيف.
- كنت حاملاً أو مرضعة.

لا تتناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ وأخبر الطبيب إذا كان أيّ من الحالات المذكورة أعلاه ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء

تحدّث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ. يُمنع استعمال ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ مع أدوية معينة التي تقلّل من تخثر الدم مثل پراسوجرل أو تيكاچرلور، باستثناء حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبيرين) وكلوپيدوجريل.

استعمال ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ يتطلب حذرًا خاصًا. قبل العلاج بـ ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ، أخبر الطبيب إذا:

- كنت عرضة لخطر عالٍ للنزيف كما يمكن أن يكون في إحدى الحالات التالية:
 - مرض كلى وخيم، حيث يمكن أن يؤثر الأداء الوظيفي للكلى على كمية الدواء التي تعمل في جسمك.
 - كنت تتناول أدوية أخرى لمنع تخثر الدم (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبكسيبان أو هيبارين)، عندما تنتقل من مضاد معين للتخثر إلى آخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال قسطار وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا (انظر الفصل 2 البند "التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية").
 - كنت تعاني من أنزفة.
 - ضغط دم مرتفع جدًا غير متوازن بواسطة علاج دوائي.
 - مرض في المعدة أو في الأمعاء الذي قد يسبب نزيفًا مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب في المريء نتيجة، على سبيل المثال، مرض الجزر المعدي المريئي (وهو مرض يصعد فيه الحمض من المعدة إلى المريء) أو أورام موجودة في المعدة، أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
 - مشاكل في الأوعية الدموية لشبكية العين (اعتلال الشبكية).
 - مرض رئوي تكون به القصبات الهوائية موسعة وممتلئة بإفرازات متقيحة (bronchiectasis) أو نزيف سابق من الرئة.
 - عمرك أكثر من 75 سنة.
 - وزنك 60 كغم أو أقل.
 - إذا كان لديك مرض الشرايين التاجية مع فشل قلبي عرضي وخيم.
- لديك صمام قلب اصطناعي.
- معروف لك بأنك تعاني من مرض يسمى متلازمة أزداد الشحوم الفسفورية (اضطراب في الجهاز المناعي حيث يسبب زيادة خطر حدوث خثرات دموية)، أخبر الطبيب وهو سوف يقرر ما إذا كان ينبغي تغيير العلاج. إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، أخبر الطبيب قبل تناول الدواء. سوف يقرّر الطبيب ما إذا كان يجب تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ وما إذا كان هناك حاجة إلى إشراف طبي وثيق.

• إذا كان طبيبك يعتقد أنك في خطر متزايد لتطوّر قرحة المعدة أو الأمعاء، فمن المحتمل أن يعطيك أيضا علاجًا لمنعها.

إذا كان من المقرر أن تخضع لعملية جراحية أو إجراء اجتياحي

- من المهم جدًا أن تتناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ قبل وبعد الجراحة أو الإجراء الاجتياحي بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
- إذا كانت عملياتك الجراحية تقتضي قسطار أو حقن داخل العمود الفقري (على سبيل المثال للتخدير فوق الجافية أو النخاعي أو تسكين الألم):
 - من المهم جدًا أن تتناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ قبل وبعد الحقن أو إزالة القسطار بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
 - توجه فورًا إلى الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من أخدرار أو ضعف في الساقين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة بعد تلاشي التخدير، حيث أن هناك حاجة لتدخل طبي طارئ.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون سن 18 عامًا. لا توجد معلومات كافية عن الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة ضد حالات عدوى فطرية (مثل: فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوساكونازول)، باستثناء تلك المخصصة للدهن على الجلد فقط.
- أفراس تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج – حالة ينتج فيها الجسم فائضًا من الكورتيزول.
- أدوية معينة لعلاج حالات عدوى بكتيرية (مثل: كلاريثروميسين، إريثروميسين).
- أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج حالات عدوى فيروس الإيدز (HIV) (مثل: ريتونافير).
- أدوية أخرى مضادة للتخثر (مثل: إينوكساپرين، كلوبيدوجريل أو مناهضات فيتامين K مثل وارفارين وأسينوكومارول، پراسوجرل وتيكاچرلور [انظر في البند 2 " تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء"]).
- أدوية مضادة للالتهابات ومسكنات الألم (مثل: نابروكسين أو حمض أسيتيل ساليسيليك [الأسبرين]).
- درونيدرون، دواء لعلاج عدم انتظام ضربات القلب.
- أدوية معينة لعلاج الاكتئاب (مثبطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين [SSRIs]، أو مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورأدرنالين [SNRIs]).

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، أخبر الطبيب قبل تناول الدواء، لأن هذه الأدوية قد تسبب زيادة في فعالية ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ. سوف يقرر الطبيب ما إذا كان يجب عليك تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ وما إذا كان هناك حاجة إلى إشراف طبي وثيق.

كذلك، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة لعلاج الصرع (epilepsy) (مثل: فينينوين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).
 - المستحضر النباتي سانت جونز ورت، لعلاج الاكتئاب (هايبيريكوم).
 - ريفامبيسين (مضاد حيوي).
- إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، أخبر الطبيب قبل تناول الدواء، لأن هذه الأدوية قد تسبب في تقليل فعالية ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ. سوف يقرر الطبيب ما إذا كان يجب عليك تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ وما إذا كانت هناك حاجة إلى إشراف طبي وثيق.

استعمال الدواء والغذاء

يُمكن تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تتناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ إذا كنت حاملاً أو مرضعة. إذا كانت هناك فرصة للحمل يجب عليك استخدام وسائل منع الحمل الموثوقة أثناء تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول الدواء، توجهي إلى الطبيب على الفور الذي سوف يقرر بشأن استمرار العلاج.

السياقة واستعمال الماكينات

قد يسبب ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ الدوخة (عرض جانبي شائع) أو الإغماء (عرض جانبي غير شائع) (انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية"). تُمنع السياقة، ركوب الدراجة الهوائية، استعمال معدات أو تشغيل ماكينات أثناء استعمال ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ إذا كنت تتأثر من هذه العوارض.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لاكتوز و صوديوم. إذا قيل لك من قبل الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل أن تبدأ بتناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ. يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومول صوديوم (23 ملغ) في كل قرص، وبالتالي يعتبر في ماهيته "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب فقط. الجرعة المقبولة عادة هي:
قرص واحد من ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ مرتين في اليوم. يجب تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ في نفس الساعات من كل يوم تقريباً (على سبيل المثال، قرص واحد في الصباح وقرص واحد في المساء).

لن يتم إعطاء ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ لك كدواء فردي في حد ذاته. سوف يأمرك الطبيب أيضا بتناول أحد الأدوية التالية:

- حمض أسيتيل الساليسيليك (المعروف باسم الأسبيرين) أو
- حمض أسيتيل الساليسيليك سوية مع كلويدوجريل

سوف يرشدك الطبيب ما هي الجرعة التي يجب أن تتناولها من الأدوية الإضافية (الجرعة الموصى بها عادة ما تكون بين 75 ملغ و100 ملغ من حمض أسيتيل الساليسيليك مرة واحدة في اليوم أو جرعة يومية بمقدار 75 ملغ حتى 100 ملغ من حمض أسيتيل الساليسيليك سوية مع جرعة يومية من كلويدوجريل بمقدار 75 ملغ).

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب أن يبدأ العلاج بـ ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ بعد متلازمة الشريان التاجي الحادة في أقرب وقت ممكن بعد إحراز استقرار في متلازمة الشريان التاجي الحادة، بعد 24 ساعة من دخول المستشفى كحد أقصى وفي الوقت الذي يتم به عادة إيقاف العلاج مضاد التخثر الذي يعطى عن طريق الحقن. سوف يرشدك الطبيب متى تبدأ العلاج بـ ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ إذا تم تشخيصك بمرض الشريان التاجي أو بمرض الشريان المحيطي. سوف يقرّر الطبيب بشأن مواصلة العلاج.

طريقة تناول

سوف يساعدك تناول الدواء في نفس الوقت من كل يوم، على تذكر تناوله.
إذا وجدت صعوبة في ابتلاع القرص بالكامل، تحدث إلى طبيبك حول طرق أخرى لتناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ. يمكن سحق القرص وخلطه بالماء أو بهريس التفاح، مباشرة قبل تناوله.
إذا لزم الأمر، سيعطيك الطبيب ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ مسحوق من خلال أنبوب تغذية إلى المعدة.
لا توجد معلومات حول الشطر/المضغ.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى يجب عليك التوجه فوراً إلى الطبيب المعالج. إن تناول جرعة كبيرة جداً من ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ يزيد من خطر النزيف.
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج بموجب ما أوصى به الطبيب.
يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.
إذا توقفت عن تناول الدواء فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو بنوبة قلبية أخرى أو الموت بسبب مرض المرتبط بقلبك أو بالأوعية الدموية لديك.
يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها الدواء.
ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندهدش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

مثل أدوية مضادة للتخثر أخرى مماثلة، يمكن أن يسبب ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ نزيفًا الذي قد يشكل خطرًا على الحياة. قد يسبب النزيف القوي انخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات قد يكون النزيف خفيفًا.

يجب التوجه فورًا إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية:

علامات النزيف:

- نزيف دماغي أو داخل الجمجمة (يمكن أن تشمل الأعراض صداع، ضعف في جانب واحد، تقيؤ، اختلاج، انخفاض في مستوى الوعي وتصلب الرقبة). هذه حالة طبية طارئة خطيرة، يجب البحث عن علاج طبي فوري!
 - نزيف متواصل أو متزايد.
 - ضعف غير طبيعي، تعب، شحوب، دوخة، صداع، تورم غير مبرر، ضيق في التنفس، ألم في الصدر أو نبحة صدرية (angina pectoris).
- سيقرر الطبيب إذا كان هناك حاجة إلى إشراف وثيق أو تغيير في العلاج.

علامات لتفاعلات جلدية خطيرة:

- طفح مكثف ممتد على الجلد، بثور أو جروح في نسيج مخاطي، على سبيل المثال في الفم أو في العينين (Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis).
- رد فعل على دواء الذي يسبب طفحًا جلديًا، حمى، التهاب أعضاء داخلية، شنوذ في الدم ومرض جهازى (متلازمة DRESS).

تواتر هذه الأعراض الجانبية هي نادرة جدًا (حتى مستعمل 1 من بين 10,000 مستعمل)

علامات لردود فعل تحسسية خطيرة:

- تورم الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط مفاجئ في ضغط الدم
- تواتر ردود فعل التحسس الخطيرة هي نادرة جدًا (ردود فعل تأقية، بما في ذلك صدمة تأقية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10,000) وغير شائعة (وذمة وعائية ووذمة أرجحية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (Common) (الأعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10):

- انخفاض في خلايا الدم الحمراء التي قد تسبب الشحوب، تعب أو ضيق في التنفس
- نزيف في المعدة أو الأمعاء، نزيف في الأعضاء التناسلية والبول (بما في ذلك دم في البول وزيادة نزيف الطمث)، نزيف من الأنف، نزيف في اللثة
- نزيف داخل العين (بما في ذلك نزيف من بياض العين)
- نزيف داخل نسيج أو تجويف الجسم (نزيف دموي داخلي موضعي، كدمة)
- سعال دموي
- نزيف من الجلد أو تحت الجلد
- نزيف بعد الجراحة
- تسرب دم أو سائل من جرح جراحي
- تورم في الأطراف
- ألم في الأطراف
- خلل وظيفي في الكلى (يمكن أن ينجلي في الاختبارات التي يقوم بها الطبيب)
- حمى
- ألم في البطن، عسر الهضم، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال
- ضغط دم منخفض (الأعراض لهذا يمكن أن تكون دوخة أو إغماء عندما تقف)
- انخفاض عام في القوة والطاقة (ضعف، تعب)، صداع، دوخة
- طفح جلدي، حكة في الجلد
- يمكن أن تشير اختبارات الدم إلى زيادة في إنزيمات كبد معينة

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon) (الأعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100):

- نزيف داخل الدماغ أو داخل الجمجمة (انظر أعلاه، علامات النزيف)
- نزيف داخل المفصل الذي يسبب الألم والتورم
- قلة الصفيحات (thrombocytopenia) (عدد صفائح دم منخفض، وهي خلايا تساعد في تخثر الدم)
- تفاعلات أرجية، بما في ذلك تفاعلات أرجية في الجلد
- خلل وظيفي في الكبد (يمكن أن ينجلي في الاختبارات التي يجريها الطبيب)
- يمكن أن تشير اختبارات الدم إلى ارتفاع في البيليروبين، في إنزيمات معينة في البنكرياس أو في الكبد أو في عدد الصفائح الدموية
- إغماء
- شعور عام سيء
- نبض مُسرَّع
- جفاف في الفم
- شرى (Urticaria)

أعراض جانبية نادرة (Rare) (الأعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 1,000):

- نزيف داخل العضل
- ركود صفراوي (Cholestasis) (انخفاض تدفق الصفراء)، التهاب الكبد (Hepatitis) بما في ذلك تلف خلايا الكبد (كبد ملتهب بما في ذلك إصابة الكبد)
- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
- تورم موضعي
- نزيف دم داخلي موضعي (ورم دموي) في الأربية نتيجة مضاعفات لإجراء قلبي حيث يتم إدخال قسطار في شريان في الساق

أعراض جانبية شائعة غير معروف (لا يمكن تقييم شيوعتها من المعلومات المتوفرة):

- فشل كلوي بعد نزيف خطير
- زيادة الضغط في عضلات الساقين أو الذراعين بعد نزيف، مما يسبب الألم، التورم، تغيرات بالشعور، الخدر أو الشلل (متلازمة الحيز بعد النزيف)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب التخزين بدرجة حرارة ما دون الـ 25°C.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الدواء (أدوية التي لم تعد قيد الاستعمال). سوف يساعد هذا في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضا على:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, hydroxypropyl cellulose,
hypromellose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate,

yellow film coating (contains: hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide, macrogol, iron oxide yellow, iron oxide black).

كل قرص مطلي من ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ يحتوي على 32.49 ملغ لاكتوز أحادي الهيدرات.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقراص مطلية، مستديرة، بلون أصفر فاتح. جانب واحد مختوم بـ "□" والجانب الثاني بـ "2.5". يتم تسويق المستحضر في لويحات (بليستر) في عبوة تحتوي على 60 قرص مطلي.

اسم صاحب التسجيل والمنتج وعنوانه:

تارو للصناعة الدوائية م.ض.، شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761

تم تحرير النشرة في كانون الثاني 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

171-45-36649-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد هذا النص بصيغة المذكّر. مع هذا، فالدواء معدّ لكلا الجنسين.