

دولر چین

قطرات للاستعمال الفموي

- يحتوي كل مل (20 قطرة) على:  
 بيبيرون 500 مل (Dipyrrone 500 mg)  
 للحصول على معلومات عن المركبات الآمنة في الفعالة انظر البند 2- معلومات مهمة عن قسم من  
 مركيات الدواء والبند 6- معلومات إضافية.  
 اقرأ النشرة التالية لتلقي تفاصيلها وتدرك المخاطر التي تواجهك باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات  
 موجزة عن الدواء (الدواء الذي أكانت قد استهلسته إضافياً)، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.  
 عليك تناول الدواء حسب التعليمات في بند الجرعة من هذه النشرة. استشير الصيدلي إذا كنت بحاجة  
 إلى معلومات إضافية.  
 عليك تناول الدواء بصورة الصيغة: القطرات ليست معدة للتربيط الذين يزبون أقل من 5 كغم.  
 عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا استمرت الآلام لأكثر من 7 أيام.  
 رغم استعمال العلاج، تزداد حدة المضاعفات إذا استمر العلاج لأكثر من 7 أيام (انظر  
 البند 2- الأعراض، الآثار الجانبية).

**١. لم أعد هذه القواطع؟**  
الدواة بعد تشكين الالام متمدة حتى الشديدة مثل الالم الصداع، الالم الأسنان وآلام الطمث واللختير الحرارة المرتفعة التي تتسبب في احتقان وتسلل علاج آخر.  
**المجموعة العلاجية:** المجموعه العلاجييه لـ**البيبرازولينات.**

## ٢. قبل استعمال الدواء

- يمنع استعمال الدواء اذا:
    - كثت تعانى من حساسية (ارجية) لل المادة الفعالة ديبيررون (متاميزول) او مستحضرات البيرازيل و المانجول اخرين اخرين (مثل بروفيغيفارون، فيغارون) او مستحضرات البيريزولينيت (مثل فينيبيغوارون، اوكيسيفيغوارون) يشمل كذلك المتعالجين الذين استجابوا مثلاً من خلال اضطراب وظيفي في تعدد حالياً الدم البيضاء من نوع معين (ندرة المحببات) بعد استخدام هذه المواد الفعالة
    - كثت تعانى من حساسية (ارجية) لأى واحد من المكونات الإضافية التي يحتوى عليها الدواء
      - اضرر اللند - 6 "معلومات اضافية"
    - كثت تعانى من حساسية معروفة لمسكبات الالام (متالزمه الريو نتيجة لتناول مسكتات الالام او حساسية تجاه مسكنات الالام التي تتحسّد بفعّل جذلي / وذمة / عائية) القصد لمعالجين الذين يسعّبون مسكنات الالام (مثل المسالبيلات، ايستامول، ديكاف، بيوبروفين، انوموبان، او تاريفار) حيث ثبتت في سياق الحالات الطبية ان برودوه او برودوه من فوط المسكنات مثل مفعّل مع حكة وكمات، سيلان الانف وانتفاخ (طلع، التهاب في الأنف، وذمة وعلقة).
    - كثت تعانى من خلل في اداء نخاع العظم، مثلاً بعد علاج بادوية معينة تستعمل لعلاج السرطان.
    - كثت تعانى من اضطرابات في انتاج حالياً الدم.
    - كثت تعانى من مرض وراثي يخصّن اضطراباً في انتاج لون حالياً الدم الحمراء (برفيريّة كيدية حادة تقتصر على)

- ٦- تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء
  - يحذّر دولارجين على البيبرون وبوريت بمخاطر نادرة ولكنها فاتحة كال التالي:
  - تشلل المخاطر في تدفق الدم
  - ندمة المحبيات (مرض خطير يبحث سبب انخفاض حاد في تعداد خلايا الدم البيضاء من نوع معين)
  - يجب التوقف عن تناول دولارجين واستشارة الطبيب فوراً، إذا ظهرت العلامات التالية التي تشير

- طرأ تفاقم مفاجئ على حالتك الصحية (مثل حمى، قشعريرة، ألم في الحلق، إلى احتمال حدوث ندمة المحببات).

**٣- يُكَسِّبُ سُلْطَنَةً «**  
**عَلَيْكَ أَنْ تَفْحَصَ مَعَ الْطَّهَارَةِ**