

## סיכון לקרישי דם בוורידים או בריאות:

יש לפנות לרופא/ה או הרוקח/ת אם:

- חשת קוצר נשימה פתאומי או קושי לנשום, כאב בחזה או כאב בגב העליון, נפיחות ברגל או בזרוע, כאב או רגישות ברגל, אדמומיות או שינוי צבע ברגל או בזרוע, משום שאלה עלולים להיות סימנים לקרישי דם בוורידים.

## סיכון למחלת לב:

יש לפנות לרופא/ה או הרוקח/ת לפני הטיפול ובמהלכו אם:

- פיתחת כאב חזה חמור או לחץ בחזה (העשוי להתפשט לזרועות, לסת, צוואר וגב), קוצר נשימה, זיעה קרה, תחושת סחרור או סחרחורת

פתאומית, משום שאלה עלולים להיות סימנים להתקף לב.

## סיכון לסרטן:

סרטן עור שאינו מלנומה נצפה במטופלים שנטלו סיבינקו. הרופא/ה עשוי/ה להמליץ לך לעבור בדיקות עור שגרתיות בזמן נטילת סיבינקו. אם מופיעים נגעי עור חדשים במהלך הטיפול או לאחריו, או אם נגעים קיימים משנים את המראה שלהם, יש להודיע לרופא/ה.

## בדיקות מעבדה

עליך לבצע בדיקות מעבדה (כולל בדיקה לרמת כולסטרול גבוהה) בהוראת רופא/ה לפני התחלת הטיפול עם סיבינקו ובזמן נטילתו, הרופא/ה שלך עשוי/ה לשנות את הטיפול בהתאם.

אין ליטול סיבינקו אם ספירת הלימפוציטים, הנויטרופילים, ההמוגלובין או טסיות הדם נמוכה מדי.

## מניעת היריון והיריון

אין להשתמש בסיבינקו במהלך היריון או בזמן הנקה.

אם את אישה שיכולה להיכנס להיריון, עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעיל בזמן הטיפול בסיבינקו ובמשך חודש נוסף לפחות לאחר נטילת המנה האחרונה של סיבינקו. שוחחי עם הרופא על אמצעי מניעה מתאימים. הודיעי לרופא מיד אם את בהיריון או אם את חושבת שנכנסת להיריון במהלך הטיפול.

## דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח תופעות לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לפיזר במייל: [isr.aereporting@pfizer.com](mailto:isr.aereporting@pfizer.com)

כרטיס זה ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות בפברואר 2023.

כרטיס מידע בטיחותי  
למטופל  
סיבינקו CIBINQO

50 מ"ג, 100 מ"ג, 200 מ"ג  
אברוסיטיניב Abrocitinib

## נושא/ת ברטיס זה מטופל/ת ב- סיבינקו CIBINQO

שם המטופל/ת:

תאריך לידה:

שם הרופא/ה (שרשמו סיבינקו):

מספר הטלפון של הרופא/ה:

תאריך התחלת הטיפול בסיבינקו:

מינון:

• ברטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת לפני הטיפול בסיבינקו ובמהלכו.

• למידע נוסף, יש לקרוא את העלון לצרכן הנכלל בכל אריזה של סיבינקו.

• יש להתייעץ עם רופא/ה או רוקח/ת אם מידע כלשהו אינו ברור.

עליך לשאת איתך את הכרטיס ולהראות אותו לכל איש מקצוע רפואי המעורב בטיפול הרפואי, לדוגמה, רוקחים או רופאי רפואה דחופה. יש לשמור כרטיס זה עימך למשך חודשיים נוספים לפחות לאחר נטילת המנה האחרונה של סיבינקו.

2

## מהו סיבינקו ולמה הוא נועד:

סיבינקו (Cibinqo) מכיל את החומר הפעיל אברוסיטיניב (Abrocitinib). הוא שייך לקבוצת תרופות הנקראות מעכבי ג'אנוס קינאז, העוזרות להפחית דלקת. הוא פועל על ידי הפחתת פעילות אנזים בגוף המכונה 'ג'אנוס קינאז' המעורב בדלקת.

סיבינקו מיועד לטיפול במבוגרים עם אטופיק דרמטיטיס (מכונה גם אקזמה אטופית) בדרגה בינונית-קשה המועמדים לטיפול סיסטמי. על ידי הפחתת פעילות אנזימי ג'אנוס קינאז, סיבינקו מקל על גרד ודלקת של העור. פעולה זו יכולה להפחית הפרעות בשינה והשלכות אחרות של אקזמה אטופית כגון חרדה או דיכאון והיא משפרת את איכות החיים באופן כללי.

3

## כיצד נוטלים סיבינקו:

• המינון ההתחלתי המומלץ הוא 200 מ"ג פעם ביום.

• מינון התחלתי של 100 מ"ג מומלץ למטופלים בגילאי 65 ומעלה ולמטופלים בסיכון גבוה לפתח קרישי דם בוורידים או בריאות. מינון מופחת מומלץ גם למטופלים עם בעיות בכליות.

• הרופא/ה שלך עשוי/ה להחליט להפסיק את הטיפול בסיבינקו אם הוא אינו עובד עבורך בתוך 24 שבועות.

• יש להתאים את המינון של סיבינקו אם יש לך בעיות בכליות, או אם נרשמו לך תרופות מסוימות אחרות. בנוסף, יש להפסיק את הטיפול לצמיתות או באופן זמני אם בדיקות

4

הדם מראות ספירה נמוכה של המוגלובין, תאי דם לבנים או טסיות דם.

• עליך להודיע לרופא/ה אם את/ה נוטל/ת או נטלת לאחרונה תרופות אחרות, לרבות תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, אם יש לך בעיות כבד או כליות ובנוגע לכל שינוי במצבך הרפואי.

• אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המתאים, יש לקחת את המנה הבאה בשעה הרגילה. אין ליטול מנה כפולה.

עליך להכיר תופעות לוואי מסוימות ונושאים המפורטים להלן. עליך להודיע לרופא/ה שלך אם יש לך תופעות לוואי כלשהן.

5

## סיכון לזיהומים

יש לפנות לרופא/ה או הרוקח/ת לפני הטיפול בסיבינקו ובמהלכו אם:

• יש לך תסמינים כגון חום, פצעים, את/ה חש/ה עייפות יותר מהרגיל או שיש לך בעיות דנטליות, משום שאלה עלולים להיות סימנים של זיהום.

## חיסונים

יש לפנות לרופא/ה או הרוקח/ת אם התחסנת לאחרונה או אם את/ה מתכנן/ת להתחסן - זאת מפני שחיסונים חיים מסוימים (לדוגמה, זוסטווקס Zostavax®) אינם מומלצים בסמוך לתחילת השימוש בסיבינקו או בזמן השימוש בו.

6

1