

خطورة حدوث خثرات دموية في الأوردة أو الرئتين:

يجب التوجه إلى الطبيب /ة أو الصيدلي /ة إذا:
● شعرت بضيق مفاجئ في التنفس أو صعوبة في التنفس، ألم في الصدر أو ألم في الجزء العلوي من الظهر، انتفاخ في الرجل أو الذراع، ألم أو حساسية في الرجل، احمرار أو تغير في لون الرجل أو الذراع، لأن هذه قد تكون علامات لحدوث خثرات دموية في الأوردة.

خطورة حدوث مرض قلبي:

يجب التوجه إلى الطبيب /ة أو الصيدلي /ة قبل وأثناء العلاج إذا:
● تطور لديك ألم شديد في الصدر أو ضغط في الصدر (الذي قد ينتشر إلى الذراعين،

الفك، الرقبة والظهر)، ضيق في التنفس، تعرّق بارد، شعور بدوخة أو دوّار مفاجئ، لأن هذه قد تكون علامات على نوبة قلبية.

خطورة الإصابة بالسرطان:

لوحظ سرطان الجلد غير الميلانوما لدى المتعالجين الذين تناولوا سيبيנקو. قد يوصي الطبيب /ة بإجراء فحوصات روتينية للجلد أثناء تناول سيبيנקو. إذا ظهرت آفات جلدية جديدة أثناء العلاج أو بعده، أو إذا غيّرت الآفات الموجودة مظهرها، يجب إبلاغ الطبيب /ة.

فحوصات مخبرية

يجب عليك إجراء فحوصات مخبرية (بما في ذلك فحص نسبة الكوليسترول المرتفعة) بناءً على تعليمات الطبيب /ة قبل بدء العلاج

بسيبيנקو وأثناء تناوله، قد يغير طبيبك /تغيير طبيبتك العلاج وفقاً لذلك. لا يجوز تناول سيبيנקو إذا كان تعداد الخلايا الليمفاوية، العدلات، الهيموغلوبين أو الصفيحات الدموية منخفضاً جداً.

منع الحمل والحمل

لا يجوز استعمال سيبيנקو أثناء الحمل أو أثناء الإرضاع. إذا كنت امرأة يمكنكها أن تحمّل، عليك استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج بسيبيנקو ولمدة شهر آخر على الأقل بعد تناول آخر جرعة دوائية من سيبيנקو. تحدثي مع الطبيب بخصوص وسائل منع الحمل المناسبة. أخبري الطبيب على الفور إذا كنت حاملاً أو إذا كنت تعتقدين أنك أصبحت حاملاً أثناء العلاج.

التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال بوابة التبليغ عن أعراض جانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة:

www.health.gov.il

أو عبر تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

أيضاً يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لشركة فايزر عن طريق البريد الإلكتروني: isr.aereporting@pfizer.com
هذه البطاقة ومحتواها تمت المصادقة عليهما من قبل وزارة الصحة في شباط 2023.

بطاقة معلومات حول
الأمان للمتعالج

CIBINQO سيبيנקو

50 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ
(أبروسيتينيب Abrocitinib)

Pfizer

Pfizer

Version 1.0

فايزر للمستحضرات الصيدلانية إسرائيلية م.ض، شارع شنكار 9،
هرتسليا بيتواح هاتف: 09-9700500 فاكس: 09-9700501

حامل هذه البطاقة يتلقى علاج بدواء سيبيينكو CIBINQO

اسم المتعالج /ة:

تاريخ الميلاد:

اسم الطبيب /ة (الذين وصفوا سيبيينكو):

رقم هاتف الطبيب /ة:

تاريخ بدء العلاج بدواء سيبيينكو:

المقدار الدوائي:

● تحتوي هذه البطاقة على معلومات مهمة حول الأمان التي عليك أن تعرفها قبل وأثناء العلاج بدواء سيبيينكو.

● لمعلومات إضافية، اقرأ النشرة للمستهلك المرفقة في كل علبة من سيبيينكو.

● يجب استشارة الطبيب /ة أو الصيدلي /ة إذا كانت هنالك أية معلومات غير واضحة.

يجب عليك حمل البطاقة معك وأن تريها لكل فرد مهني من الطاقم الطبي المشارك بالعلاج الطبي، مثلاً، الصيدالة أو أطباء الطوارئ. يجب الاحتفاظ بهذه البطاقة معك لمدة شهرين آخرين على الأقل بعد تناول آخر جرعة دوائية من سيبيينكو.

ما هو سيبيينكو ولأي غرض هو مخصص:

يحتوي سيبيينكو (Cibinqo) على المادة الفعالة أبروسيتينيب (Abrocitinib). وهو ينتمي إلى مجموعة الأدوية التي تسمى مثبطات جانوس كيناز، والتي تساعد في تقليل الالتهاب. هو يعمل عن طريق تقليل نشاط إنزيم في الجسم يعرف باسم «جانوس كيناز» الذي يساهم في الالتهاب.

سيبيينكو مخصص لعلاج البالغين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي (يُسمى أيضاً الإكزيما التأتبية) بدرجة متوسطة-شديدة المرشحين للعلاج الجهازى. عن طريق تقليل نشاط إنزيمات جانوس كيناز، يخفف سيبيينكو من الحكمة والتهاب الجلد. هذه العملية يمكن أن تقلل من اضطرابات النوم والتداعيات الأخرى للإكزيما التأتبية مثل القلق أو الاكتئاب وتحسن جودة الحياة بشكل عام.

كيفية تناول سيبيينكو:

- المقدار الدوائي الابتدائي الموصى به هو 200 ملغ مرة في اليوم.
- يوصى بمقدار دوائي ابتدائي مقداره 100 ملغ للمتعالجين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وما فوق وللمتعالجين المعرضين لخطورة عالية لتطوير خثرات دموية في الأوردة أو الرئتين. كما يوصى بمقدار دوائي مخفّض أيضاً للمتعالجين الذين لديهم مشاكل في الكلى.
- قد يقرر طبيبك / تقرر طبيبتك إيقاف العلاج بدواء سيبيينكو إذا لم ينجح معك في غضون 24 أسبوعاً.
- يجب ملاءمة المقدار الدوائي من سيبيينكو إذا كانت لديك مشاكل في الكلى، أو إذا وصفت لك بعض الأدوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب إيقاف العلاج بشكل دائم أو مؤقت إذا أظهرت فحوصات الدم انخفاض

تعداد الهيموغلوبين، خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية.

- عليك إبلاغ الطبيب /ة إذا كنت تتناول /ين أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى وبشأن أي تغيير في حالتك الطبية.
- إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المناسب، يجب تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت المعتاد. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة.

عليك معرفة أعراض جانبية معينة ومساءل المفصلة أدناه. عليك إبلاغ طبيبك / طبيبتك إذا كانت لديك أية أعراض جانبية:

خطورة لحدوث تلوثات

- يجب التوجه إلى الطبيب /ة أو الصيدلي /ة قبل وأثناء العلاج بدواء سيبيينكو إذا:
- كانت لديك أعراض مثل سخونة، قروح، تشعر /ين بالإرهاق أكثر من المعتاد أو لديك مشاكل في الأسنان، لأن تلك قد تكون علامات للتلوث.

لقاحات

يجب التوجه إلى الطبيب /ة أو الصيدلي /ة إذا تلقيت مؤخراً لقاحاً أو إذا كنت تخطط /ين لتلقي لقاح - وذلك لأن بعض اللقاحات الحية (مثلاً، زوستافاكس® Zostavax) لا يوصى بها قرب بداية استعمال سيبيينكو أو في وقت استعماله.