



SK-PHARMA

**כרטיס מידע בטיחותי למטופל
בנוגד הקרישה ריברוקסבאן אס.קיי.**

ריברוקסבאן אס.קיי. 10 מ"ג
ריברוקסבאן אס.קיי. 15 מ"ג
ריברוקסבאן אס.קיי. 20 מ"ג

שא כרטיס זה עימך בכל עת
הצג כרטיס זה לכל רופא או רופא שיניים בתחילת הביקור

נושא כרטיס זה מטופל בנוגד הקרישה ריברוקסבאן אס.קיי.

שם _____

כתובת _____

תאריך לידה _____ משקל _____

מידע לגבי מחלות ותרופות נלוות _____

מידע לשעת חירום

במקרה חירום אנא הודיעו לרופא מטפל _____

טלפון _____

אנא הודיעו גם ל:

שם _____ קרבה משפחתית _____

טלפון _____

טלפון חירום (מרפאה/עזרה ראשונה) _____

מידע על השימוש בתרופה

תאריך התחלת הטיפול _____

התוויה _____

מינון ומשטר מתן _____

תפקוד כלייתי בעת תחילת הטיפול (Creatinine clearance mL/min) _____

מידע לצוות הרפואי:

מדידת INR אינה מתאימה להערכת הפעילות האנטיקואגולנטית של ריברוקסבאן אס.קיי., ולכן אין להשתמש בה למטרה זו.

מידע אודות נוגדי קרישה והנחיות למטופל

- ◆ נוגד הקרישה ריברוקסבאן אס.קיי. הינו מדלל דם, המגן עליך מפני היווצרות קרישי דם מסוכנים.
- ◆ יש ליטול ריברוקסבאן אס.קיי בדיוק לפי מרשם הרופא. על מנת להבטיח הגנה אופטימלית מפני קרישי דם, יש להקפיד על מועדי הנטילה כפי שהומלץ על ידי הרופא ולא לדלג על אף טבליה, אלא בהוראת הרופא.
- ◆ אין להפסיק את נטילת ריברוקסבאן אס.קיי. ללא התייעצות עם הרופא, זאת מאחר שהדבר עלול להגביר את הסיכון שלך להיווצרות קרישי דם.

נטילה עם מזון:

על מנת להבטיח יעילות מירבית של הטיפול:

- ◆ **ריברוקסבאן אס.קיי במינון 20 מ"ג** - חובה ליטול עם מזון.
- ◆ **ריברוקסבאן אס.קיי במינון 15 מ"ג** - חובה ליטול עם מזון.
- ◆ **ריברוקסבאן אס.קיי במינון 10 מ"ג** - ניתן ליטול עם או בלי מזון.

יש לבלוע את הטבליה עם מים. במידה וקשה לך לבלוע את הטבליה בשלמותה, ניתן לרסק את הטבליה ולערבב עם מים או מחית תפוחים, מיד לפני נטילתה. במינונים 15/20 מ"ג יש לאכול מיד לאחר נטילת התרופה המרוסקת.

אם שכחת ליטול ריברוקסבאן אס.קיי בזמן הדרוש:
ריברוקסבאן אס.קיי 10/15/20 מ"ג:

◆ במינון של 10/15/20 מ"ג פעם ביום - יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות באותו יום!

◆ במינון של 15 מ"ג פעמיים ביום - [במהלך שלושת השבועות הראשונים של הטיפול בפקקת ורידים עמוקים (DVT) או תסחיף ריאתי (PE)] יש ליטול מנה מיד כשנזכרת. אין ליטול יותר משתי טבליות של 15 מ"ג ביום אחד. ניתן ליטול שתי טבליות של 15 מ"ג ביחד לקבלת מינון של 30 מ"ג ליום אחד. למחרת היום יש להמשיך וליטול טבליה אחת של 15 מ"ג פעמיים ביום.
* בכל מקרה של ספק, יש להתייעץ עם הרופא.

- ◆ ספר לרופא על כל תרופה נוספת שאתה נוטל, שנטלת לאחרונה או שבכוונתך להתחיל ליטול, טרם התחלת הטיפול ריברוקסבאן אס.קיי. הנחייה זו כוללת גם תרופות ללא מרשם (לרבות נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, NSAIDs) ותוספי תזונה.
- ◆ טרם ביצוע פעולה כירורגית או פולשנית כלשהי, לרבות טיפולי שיניים, עליך ליידע את הרופא המטפל בך על נטילת ריברוקסבאן אס.קיי.
- ◆ בעת נטילת נוגד קרישה כגון ריברוקסבאן אס.קיי., עליך להיות מודע לתופעות הלוואי האפשריות שלו.
 - לרשימה מלאה של תופעת הלוואי, יש לעיין בעלון לצרכן .
 - דימום הוא תופעת הלוואי השכיחה ביותר.
 - אם ידוע לך כי אתה נמצא בסיכון לדימום, אל תחל בנטילת ריברוקסבאן אס.קיי לפני שתדון בכך עם הרופא המטפל בך.

פנה מיד לרופא אם תסבול מסימנים או תסמינים העלולים להעיד על דימום, כגון:

- כאב
- חיוורון
- נפיחות בלתי מוסברת או אי נוחות
- כאב ראש, סחרחורת, עייפות או חולשה יוצאת דופן
- קוצר נשימה
- כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס)
- שטפי דם תת-עוריים חריגים, דימום מהאף, דימום מהחניכיים,
- דימום מחתכים אשר אינו פוסק במשך פרק זמן ארוך
- דימום נרתיקי או דימום ווסתי מוגבר באופן חריג
- דם בשתן, שעשוי להיות ורוד או חום; צואה אדומה או שחורה
- שיעול דמי או הקאה של דם או של חומר דמוי גרגרי קפה

אם אתה מצוי בסיכון לדמם מוגבר, יש לדון בכך/להוועץ עם הרופא שלך. גורמי סיכון עיקריים לדימום כוללים בין היתר:

- מחלת כליה בדרגה בינונית או חמורה
- הפרעה כבדית

• תרופות המשפיעות על קרישת דם כגון נוגדי דלקת שאינם סטרואידים,

אספירין ונוגדי קרישה אחרים

• יתר לחץ דם חמור בלתי מאוזן

• הינך סובל מדימומים

• מחלה בקיבה או במעי העלולה לגרום לדימום כגון: דלקת המעי או

הקיבה, או דלקת בוושט כתוצאה, למשל, ממחלת החזר ושטי-קיבתי

• רטינופתיה

• ברונכיאקטזיות או דימום קודם מהריאה

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות פורטל לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות:

www.health.gov.il

או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

כמו כן ניתן לדווח על תופעות לוואי ועל פגמי איכות ליחידת המעקב התרופתי של אס.קיי. פארמה ישראל:

דואר אלקטרוני: report@sk-pharma.com

פקס: 03-7512601.

למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן. בכל שאלה, אנא פנה לרופא המטפל שלך.
כרטיס מידע בטיחותי זה ותוכנו נבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאות בתאריך
17.12.2019.



SK-PHARMA

ריברוקסבאן אס.קיי. 10 מ"ג
ריברוקסבאן אס.קיי. 15 מ"ג
ריברוקסבאן אס.קיי. 20 מ"ג