



بطاقة معلومات السلامة للمتعالج
بمضادات التخثر ريفاروكسابان اس.كي

ريفاروكسابان اس.كي. 10 ملغ
ريفاروكسابان اس.كي. 15 ملغ
ريفاروكسابان اس.كي. 20 ملغ

احمل هذه البطاقة معك دومًا
أظهر هذه البطاقة لكل طبيب أو طبيب أسنان عند بدء الزيارة

حامل هذه البطاقة متعالج بمضاد التخثر يفاروكسابان اس.كي.

الإسم _____

العنوان _____

تاريخ الولادة _____ الوزن _____

معلومات بشأن أمراض وأدوية مترافقة _____

معلومات عند الطوارئ

عند الطوارئ الرجاء أبلغوا:

الطبيب المعالج _____ هاتف _____

الرجاء أبلغوا أيضاً:

الإسم _____ القرابة العائلية _____

هاتف _____ هاتف الطوارئ (العيادة/الإسعاف الأولي) _____

معلومات عن استعمال الدواء

_____ تاريخ بداية العلاج

_____ دواعي الاستعمال

_____ الجرعة والمقدار الدوائي

الأداء الوظيفي الكلوي عند بداية العلاج (Creatinine clearance mL/min)

معلومات للطاقم الطبي :

قياس INR غير مناسب لتقييم نشاط مضاد التخثر في ريفاروكسابان اس.كي،
لذلك لا يجوز استعماله لهذا الهدف.

معلومات عن استعمال الدواء

- ◆ مضاد التخثر ريفاروكسابان اس.كي هو مميع للدم, والذي يحميك من تشكل خثرات دموية خطية.
- ◆ يجب تناول ريفاروكسابان اس.كي وفق وصفة الطبيب بالضبط. من أجل ضمان حماية مثالية من الخثرات الدموية, يجب الحرص على مواعيد تناول كما أوصى بها الطبيب ولا يجوز تجاوز أي قرص, إلا بتعليمات من الطبيب.
- ◆ لا يجوز التوقف عن تناول ريفاروكسابان اس.كي بدون استشارة الطبيب, ذلك أن الأمر قد يفاقم خطورة تشكل خثرات دموية لديك.

التناول مع الطعام:

من أجل ضمان نجاعة قصى للعلاج:

- ◆ ريفاروكسابان اس.كي. 20 ملغ - يجب تناول مع الطعام.
- ◆ ريفاروكسابان اس.كي. 15 ملغ - يجب تناول مع الطعام.
- ◆ ريفاروكسابان اس.كي. 10 ملغ - ممكن تناول مع أو بدون طعام.

يجب بلع القرص مع الماء. في حال كان من الصعب عليك بلع القرص بأكمله، من الممكن سحق القرص وخلطه مع الماء أو مهروس التفاح مباشرةً قبل تناوله. في جرعات 20 / 15 ملغ يجب تناول الطعام فوراً بعد تناول الدواء المسحوق.

إذا نسيت تناول ريفاروكسابان اس.كي. بالوقت المحدد:

ريفاروكسابان اس.كي. 10 / 15 / 20 ملغ:

- ◆ في جرعة 10/15/20 ملغ مرة باليوم – يجب تناول الجرعة الدوائية فور تذكرك ولكن بأي حال لا يجوز تناول جرعتين بنفس اليوم!
- ◆ في جرعة 15 ملغ مرتين باليوم – [خلال الثلاثة أسابيع الأولى من علاج جلطة الأوردة العميقة (DVT) أو إنصمام رئوي (PE)] يجب تناول الجرعة الدوائية فور تذكرك. لا يجوز تناول أكثر من قرصين من عيار 15 ملغ في يوم واحد. بالإمكان تناول قرصين من عيار 15 ملغ معاً للحصول على جرعة دوائية قدرها 30 ملغ ليوم واحد. في اليوم التالي يجب الاستمرار في تناول قرص واحد من عيار 15 ملغ مرتين في اليوم. في حال الشك, يجب استشارة الطبيب.

◆ احك للطبيب عن كل دواء اضافي تتناوله, تناولته مؤخراً أو تنوي تناوله قبل بدء العلاج ريفاروكسابان اس.كي. هذه التوصية تشمل كذلك أدوية بدون وصفة طبية (بما في ذلك مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية, NSAIDs) والإضافات الغذائية.

◆ قبل تنفيذ عملية جراحية أو اختراقية ما, بما في ذلك علاجات الأسنان عليك إعلام الطبيب الذي يعالجك عن تناول ريفاروكسابان اس.كي.

◆ عند تناول مضاد التخثر مثل ريفاروكسابان اس.كي,, عليك أن تكون على دراية بالأعراض الجانبية المحتملة منه.

- لقائمة الأعراض الجانبية الكاملة, يجب الإطلاع على نشرة المستهلك.

- النزيف هو العرض الجانب ي الأكثر شيوعاً.

- إذا كان معلوماً لك أنك موجود في خطر للنزف لا تبدأ بتناول

ريفاروكسابان اس.كي. قبل أن تناقش الأمر مع الطبيب الذي يعالجك.

توجه للطبيب فوراً إذا عانيت من علامات أو أعراض ممكن أن تشير إلى حدوث نزف, مثل:

- ألم
- شحوب
- انتفاخ غير مبرر أو عدم ارتياح
- صداع, دوخة, ارهاق أو ضعف غير عادي
- ضيق التنفس
- ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (angina pectoris)
- نزف شاذ تحت الجلد, نزف من الأنف نزف من اللثة, نزف من الجروح والذي يستمر لفترة زمنية طويلة
- نزف مهبلي أو نزف طمئي متزايد بشكل شاذ
- دم في البول, والذي من الممكن أن يكون وردي أو بني; براز أحمر أو أسود
- سعال دموي أو تقيؤ دم أو مادة شبيهة بحبيبات القهوة

إذا كنت في خطورة لنزف متزايد يجب مناقشة الأمر/استشارة طبيبك. عوامل الخطورة الأساسية للنزف تتضمن، بما في ذلك:

- مرض كلوي بدرجة متوسطة أو خطيرة
- اضطراب كبدي
- أدوية تؤثر على تخثر الدم مثل مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية
أسبرين ومضادات تخثر أخرى
- ضغط دم مرتفع خطير غير متوازن
- كنت تعاني من أنزفة
- مرض بالمعدة أو بالمعي والذي يمكن أن يؤدي لنزف مثل: التهاب المعى أو المعدة، أو التهاب المريء نتيجة مثلاً، مرض ارتداد المريء معدي
- اعتلال الشبكية
- مرض توسع القصبات الهوائية أو نزف رئوي سابق

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة مدخل التبليغ عن أعراض جانبية الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة
www.health.gov.il

أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>
كذلك يمكن التبليغ عن أعراض جانبية وعن عيوب في الجودة لوحدة المتابعة
الدوائية لشركة اس.كي. فارما إسرائيل:
البريد الإلكتروني: report@sk-pharma.com, فاكس: 03-7512601.

لمعلومات إضافية يجب مراجعة نشرة المستهلك. عند كل سؤال، الرجاء التوجه
لطبيبك المعالج. بطاقة معلومات السلامة هذه ومحتواها فحصت وصدوق عليها
من قبل وزارة الصحة بتاريخ 17.12.2019



SK-PHARMA

ريفاروكسابان اس.كي. 10 ملغ
ريفاروكسابان اس.كي. 15 ملغ
ريفاروكسابان اس.كي. 20 ملغ