

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) -1986
يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

ديبيراز قطرات للغم قطرات للاستعمال الفموي

التريكمب

يحتوي كل 1 مل (20 قطرة) على:

ديبيرون 500 ملغ (Dipyron 500 mg)
معلقة نظيفة غير المعقاة
انظر للبلند 2-
"معلومات مهمّة عن قسم من للحصول على معلومات عن المربكات غير المعقاة
انظر للبلند 2-
"معلومات مهمّة عن قسم من مربكات الدواء"
والبلند 6-
"معلومات إضافية"

اقرأ النشرة يمتنع حتى نهائها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.
يحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية:
توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

عليك تناول الدواء حسب التعليمات في بند الجرعة من هذه النشرة.
استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

عليك تناول الدواء بالصورة الصحيحة.
القطرات ليست معدة للرضع الذين يزيدون أقل من 5 كغم.
عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا استمرت الإلام لأكثر من 7 أيام.
رغم استعمال الدواء، يجب متابعة حدوث نذرة المحيبات إذا استمر العلاج لأكثر من 7 أيام (انظر للبلند 4 - "الأعراض الجانبية").

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء معد لتسكين الإلام المعتدلة حتى الشديدة مثل الأم الصداغ، الآم الأسنان وآلام الطمث ولخفض الحرارة المرفعة التي لا تستجيب لوسائل علاج أخرى.
المجموعة العلاجية: مجموعة البيراز ولينبات.

2. قيل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

• كنت تعاني من حساسية (أرجية) للمادة الفعالة
ديبيرون (ميثاميزول) أو لمستحضرات البييراز ولبينات الأخرى (مثل بروبيفينازون، فينازون) أو لمستحضرات البييرازولينديبات (مثل فينبليوفيتازون، فينبليوفيتازون)،
يشمل كذلك المتعلّجين الذين استجابوا، مثلاً، من خلال انخفاض ملحوظ في تعداد خلايا الدم البيضاء من نوع معين (نذرة المحيبات) بعد استخدام هذه النوا (الوقاية).

• كنت تعاني من حساسية (أرجية) لأي واحد من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبلند - 6 "معلومات إضافية").

• كنت تعاني من حساسية معروفة لمسكّنات الإلام (ملازمة الربو نتيجة لتناول مسكّنات الإلام أو حساسية تجاه مسكّنات الإلام التي تتسبب بطفح جلدي ودمّة وعائية)،
القدص للمتعلمين الذين يستجيبون لمسكّنات الإلام (مثل السالييسيلات، پاراسيتامول، ديكلوفيناك، ايبوبروفين، إندوميثاسين أو نابروكسين)
بحدوث تشنجات في مسالك التنفس السفلية أو بردود فعل أخرى من فرط الحساسية مثل طفح مع حكة وكدمات، سيلان الأنف وانفخاخ (طفح، التهاب في الأنف، ودمّة وعائية).

• كنت تعاني من خلل في أداء نخاع العظم، مثلاً بعد علاج بأدوية معينة تستعمل لعلاج السرطان.

• كنت تعاني من اضطرابات في إنتاج خلايا الدم.

• كنت تعاني من مرض وراثي يتضمن اضطراباً في إنتاج لون خلايا الدم الحمراء (تفريعية كبدية حادة متقطعة).

تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء

• يحتوي ديبيراز قطرات للغم على ديبيرون ويرتبط بمخاطر نادرة ولكنها فتاكة كالتالي:

• فشل مفاجئ في تقفؤ الدم.

• نذرة المحيبات (مرض خطير يحدث بسبب انخفاض حاد في تعداد خلايا الدم البيضاء من نوع معين).

• **يجب التوقف عن تناول ديبيراز قطرات للغم واستشارة الطبيب فوراً**، إذا ظهرت العلامات التالية التي تشير إلى احتمال حدوث نذرة المحيبات

• إذا تطرق لمغلي على حالتك المسحية (مثل حمى، قشعريرة، ألم في الحلق، صعوبة في الابتلاع).

- حمى لا تزول أو حمى تظهر مرة ثلث الأخرى.

- تغييرات على الأنسجة المخاطية مع ألم، لا سيما في الفم، الألف وفي الحنجرة أو في الأعضاء التناسلية أو منطقة فتحة الشرج.
انظر للبلند 4 - "الأعراض الجانبية".

• إذا تطورت لديك علامات تدل على انخفاض تعداد خلايا الدم المختلفة (قلة الكريات الشاملة) (مثل شعور عام بالإعياء العام، التهاب أو حمى متواصلة، كدمات، نزيف وشحوب) أو علامات تدل على انخفاض تعداد الصفائح الدموية (قلة الصفائح).
(مثل زيادة الميل إلى النزيف، أنزفة صغيرة في الجلد وفي الأغشية المخاطية)
يجب التوقف عن تناول ديبيراز قطرات للغم فوراً واستشارة الطبيب دون تأجيل (انظر للبلند 4 - "الأعراض الجانبية").

• إذا تطورت لديك رد فعل تحسسي تجاه ديبيراز قطرات للغم، فستكون معرضاً لخطر عال لتطوير ردود فعل شبيهة تجاه مسكّنات الإلام الأخرى.

• إذا تطورت لديك ردود فعل تحسسية تجاه ديبيراز قطرات للغم أو ردود فعل أخرى بواسطة جهاز المناعة (مثل نذرة المحيبات)، أنت عرضة لخطر عال لتطوير ردود فعل شبيهة تجاه مستحضرات البييرازولينبات والبييرزولينديبات الأخرى (مواد تشبه من ناحية كيميائية)، مثل مسكّنات الإلام التي تحتوي على فينازون، بروبيفينازون، فينبليوفيتازون، وكيفينوفيتازون.

• إذا تطورت لديك رد فعل تحسسي تجاه مستحضرات البييرازولينبات والبييرازولينديبات الأخرى أو مسكّنات الإلام الأخرى أو رد فعل آخر بواسطة جهاز المناعة فستكون معرضاً لخطر عال لتطوير رد فعل مشابه تجاه ديبيراز قطرات للغم.

ردود فعل فرط الحساسية الحادة

إذا كنت تعاني من أحد الأعراض المفصلة أدناه، فإن خطر ظهور ردود فعل فرط التحسس الحادة تجاه ديبيراز قطرات للغم يزداد بشكل ملحوظ:

- حساسية تجاه أدوية لتسكين الإلام وأدوية مضادة للروماتيزم، تتجسد في أعراض مثل الطفح مع حكة وكدمات أو تورم، في مثل هذه الحالة، لا يجوز تناول ديبيراز قطرات للغم.
لمزيد من المعلومات، انظر للبلند 2 - "لا يجوز استعمال الدواء إذا"

- نوبات من ضيق التنفس تحدث مثلاً بسبب الربو، لا سيما إذا كنت تعاني أيضاً من زوائد لحمية في الأنف أو من التهاب الأنف والجيوب الأنفية.

- طفح مزمن (شرى).

- حساسية مفرطة تجاه صبغيات (مثل تارترازين) أو المواد الحافظة (مثل بنزوات).

- حساسية تجاه الكحول، تتجسد في العطاش، العيون الدامعة، وتورد وخيم في الوجه.
حدثت هذه الأعراض أيضاً عند استهلاك كميات صغيرة من الكحول.
قد تشكل الحساسية للكحول من هذا النوع علامة تدل على حساسية لمسكّنات الإلام التي لم تتّضح حتى الآن (انظر للبلند 2 - "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

يستخد ديبيراز قطرات للغم لدى المتعلّجين المعرضين لخطر متزايد لحدوث ردود فعل فرط التحسس فقط بعد إجراء الطبيب تقييماً دقيقاً للمخاطر المحتملة مقابل الفائدة المتوقعة (انظر أيضاً للبلند 2 - "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

إذا استخدمت ديبيراز قطرات للغم في هذه الحالات، على المتعلّج أن يخضع لمراقبة طبية مكثّفة، إضافة إلى توفير علاج الطوارئ للاستعمال بشكل فوري.

• قد تحدث صدمة تأقية، لا سيما لدى المتعلّجين الحساسين (انظر للبلند 4 - "الأعراض الجانبية")، هناك حاجة إلى توخي الحذر بشكل خاص لدى مرض الربو أو المتعلّجين الذين لديهم ميل إلى حدوث ردود فعل تحسسية.

ردود فعل جلدية حادة

تم الإبلاغ عن ردود فعل جلدية شديدة، تشمل ملازمة ستيفنس-جونسون، تقشّر الأنسجة الممتّونة البشرية (بعض (TEN) وملازمة التفاعل الدوائي المناعي مع فرط الحمصّات والأعراض الجلدية الجزئية (تسمى DRESS) بعد العلاج بديبيرون.
إذا شعرت بواحد أو أكثر من أعراض رد الفعل الجلدي الشديد هذه الموصوفة في البند 4 "الأعراض الجانبية")، يجب عليك التوقف عن تناول ديبيراز قطرات للغم والتوجه فوراً لتلقي علاج طبي.

إذا عانيت ذات مرة من ردود فعل جلدية شديدة، لا يجوز إطلاقاً تناول العلاج بديبيراز قطرات للغم مجدداً (انظر للبلند 4 - "الأعراض الجانبية").

انخفاض ضغط الدم

قد يسبب ديبيراز قطرات للغم الانخفاض في ضغط الدم (انظر للبلند 4 - "الأعراض الجانبية").

تزداد هذه الخطورة إذا كنت:

- تعاني من ضغط دم منخفض، من نقص السوائل الكبير (جفاف)، خلل في تدفق الدم أو علامات أولية لحدوث فشل في تدفق الدم المثلاً في أعقاب حدوث نوبة قلبية أو إصابات خطيرة).

- كنت تعاني من حمى مرتفعة.

سوف يفكر الطبيب بحرص في العلاج بديبيراز قطرات للغم، يجري متابعة مكثّفة للمتعالج ويتخذ إجراءات وقائية (مثل موازنة تدفق الدم) لتقليل خطر انخفاض ضغط الدم.

يجب استعمال ديبيراز قطرات للغم فقط من خلال الخضوع لمراقبة مكثّفة لتتفقد الدم عند الحاجة إلى تجنب انخفاض ضغط الدم مثلاً في حال:

- مرض قلب تاجي وخيم.

- تضيق يقيم تدفق الدم في الأوعية الدموية التي تزوّد الدم إلى الدماغ.

مشاكل في أداء الكبد

تم الإبلاغ عن حالات التهاب الكبد لدى متعلّجين تناولوا ديبيرون وتطورت لديهم أعراض خلال بضعة أيام حتى بضعة أشهر بعد بدء العلاج.

عليك التوقف عن تناول ديبيراز قطرات للغم واستشارة الطبيب إذا تطورت لديك أعراض متعلّقة بمشاكل في أداء الكبد، مثل:

• غثيان أو قئ، حمى، تعب، فقدان الشهية، بول داكن، براز فاتح، اصفرار الجلد أو بياض العينين، حكة، طفح أو ألم في البطن العلوية.

• يجب التوقف عن تناول ديبيراز قطرات للغم والتوجه فوراً لتلقي علاج طبي في حال شعرت بأي من ردود الفعل الجلدية الشديدة التالية (انظر أيضاً للبلند 2):

• يقع مسطحه ضاربة إلى الحمرة تشبه "الهدف" أو دائرية على الجزء العلوي من الجسم، غالباً ما تكون مع حويصلات مركزية.
جلد متقشر، تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية والعينين.
قد تظهر حالات الطفح الحاد هذه بعد ظهور سخونة وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا (ملازمة ستيفنس-جونسون، تقشّر الأنسجة الممتّونة البشرية (تسمى).

• طفح واسع النطاق، سخونة مرتفعة وتضخم في الغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS أو متلازمة فرط الحساسية للدواء).

أعراض جانبية إضافية
أعراض جانبية ليست شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 100 متعلّج):

- طفح بولن بنفسجي حتى أحمر داكن، ترافقه بثور أحياناً (رد فعل جلدي تجاه الدواء في مكان ثابت (fixed drug eruption).

- انخفاض حاد في ضغط الدم قد يحدث بسبب تأثير الدواء المباشر، ولا يكون مصحوباً بعلامات أخرى من رد فعل فرط التحسس.
أدى رد فعل كبدياً إلى انخفاض حاد في ضغط الدم في حالات نادرة فقط.
قد يرتفع خطر انخفاض ضغط الدم عند ارتفاع درجة حرارة الجسم ارتفاعاً استثنائياً.

العلامات المميزة لانخفاض الحاد في ضغط الدم هي وتيرة نظم قلب سريعة، شحوب، رجفة، دوران، غثيان وإسهام.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 متعلّج):

• **ردود فعل فرط التحسس (ردود فعل تأقية أو تأقية):** تشمل علامات ردود الفعل الألف:

شعور بالحرقة في العينين، سُعال، زكام، عطاس، ضغط في الصدر، احمرار في الجلد (تحديداً في منطقة الوجه والرأس)، طفح وتورم الوجه، وفي حالات أقل شيوعاً، غثيان، وتشنجات في البطن.

تشمل علامات الأذنان الخاصة الحرقة، حكة، وشعور بالحرارة في اللسان وتحتّه، لا سيما في كفتي اليدين والقدمين.

قد تصعب ردود الفعل الألف من هذا النوع أكثر حدة وتشتمل على: طفح حاد، ودمّة وعائية حادة (تورم، بما في ذلك في منطقة الحنجرة)، تضيق حاد بسبب تشنجات (تقلص) في مسالك التنفس السفلية، وتيرة نظم قلب سريعة (تفريّة نظم قلب بطيئة أيضاً أحياناً)، اضطرابات في نظم القلب، انخفاض حاد في ضغط الدم، سببها أحياناً ارتفاع ضغط الدم، فقدان الوعي، وفشل في الدورة الدموية.

قد تحدث ردود الفعل هذه أيضاً إذا تناولت الدواء في الماضي عدة مرات ولم تحدث لديك مضاعفات.
قد تكون ردود الفعل هذه حادة حتى مهددة للحياة، وفي حالات معينة يمكن أن تسبب الوفاة أيضاً.

لدى المتعلّجين الذين يعانون من متلازمة الربو نتيجة تناول مسكّنات الإلام، تتجسد ردود فعل فرط التحسس غالباً في نوبات (انظر للبلند 2 - "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

- انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (لوكوبينيا).

- **طفح جلدي** (مثلاً: طفح بقعي حطاطي).

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 متعلّج):

- انخفاض حاد في تعداد نوع من خلايا الدم البيضاء (نذرة المحيبات)، يشتمل على حالات تؤدي إلى الوفاة، أو انخفاض تعداد الصفائح الدموية (قلة الصفائح).
يبدو أن ردود الفعل هذه ناتجة عن جهاز المناعة.
وهي قد تحدث حتى إذا تم تناول ديبيرون في الماضي دون أي بوذي إلى مضاعفات.
هناك شهادات على زيادة خطر حدوث نذرة المحيبات إذا تم تناول ديبيراز قطرات للغم لأكثر من أسبوع.

تتجسد نذرة المحيبات في ارتفاع حرارة الجسم، قشعريرة، ألم في الحنجرة، صعوبات في الابتلاع، والتهاب في الفم، الألف، الحنجرة، وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو في فتحة الشرج.
قد تظهر هذه الأعراض بشكل خفيف فقط.
لدى المتعلّجين الذين يتلقون مضادات حيوية (أدوية لعلاج التهاب تشبیه الجرم)، تكون وتيرة ترسب الدم مرتفعة إلى حد كبير، في حين لا تكون غالباً الغدد الليمفاوية متضخمة إطلاقاً أو أنها تكون متضخمة بدرجة قليلة فقط.

تشتمل الأعراض المميزة لثة الصفائح على ميل متزايد إلى النزيف وظهور نقاط حمراء صغيرة على الجلد وفي الأنسجة المخاطية التي تحدث بسبب نزيف.

- **نوبة ربو**.

- مناطق كبيرة من الجلد مغطاة بثبور وتقرّش الجلد (متلازمة ستيفنس-جونسون أو تقشّر الأنسجة الممتّونة البشرية (تسمى).

- **تدهور حاد في أداء الكلى**، في حالات معينة ترافقه كمية قليلة من البول بشكل استثنائي أو بدون تيول، إفراز بروتينات الدم في البول، قصور حاد في عمل الكلى، التهاب الكلى (التهاب الكلى الخلالي الحاد).

أعراض جانبية ذات انتشار غير معروف (لا يمكن تقييم انتشارها استناداً إلى البيانات المتوفرة):

- فشل مفاجئ في تدفق الدم بسبب رد فعل تحسسي حاد (صدمة تأقية).

- **نوبة قلبية** بسبب رد فعل تحسسي (متلازمة كوينس).

- **قفر الدم** مع خلل في أداء نخاع العظم (**قفر الدم اللا تنسجي**).
انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية (**قلة الكريات الشاملة**)، بما في ذلك حالات تشبه بالوفاة.

تشتمل علامات هذه التغييرات في الدم على شعور عام بالإعياء العام، ثلوث، حمى مستمرة، كدمات، نزيف وشحوب.

- **نزيف في الجهاز الهضمي**.

- التهاب الكبد، اصفرار الجلد وبياض العينين، ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد في الدم.

- طفح واسع النطاق، سخونة مرتفعة وتضخم في الغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS أو متلازمة فرط الحساسية للدواء).

- قد يجعل الناجح غير الضار لتفكيك ديبيرون لون البول أحمر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تطفم أيّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يتكرّر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية
يمكن الإبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط"الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:
https://sideeffects.health.gov.au

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• تجنب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تجنب التسمّم.
لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية
• **الصلاحية** ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن **25 درجة مئوية**.

• **يمكن استعمال الدواء حتى 6 أشهر بعد فتح القنبينة للمرة الأولى**، ولكن ليس بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الظاهر على العبوة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً على:

* Saccharin sodium, Raspberry aroma, Sodium Phosphate monobasic
* 2H2O, Sodium Phosphate bibasic
* 12 H2O, Purified water.

الرضع والأطفال:

العمر	وزن الجسم (كغم)	الجرعة الدوائية (عدد القطرات)
3-11 شهراً	5-8	2-4 قطرات، حتى 3 مرّات في اليوم
1-3 سنوات	9-15	3-10 قطرات، حتى 3 مرّات في اليوم
4-6 سنوات	16-23	5-15 قطرة، حتى 3 مرّات في اليوم
7-9 سنوات	24-30	8-20 قطرة، حتى 3 مرّات في اليوم
10-12 سنة	31-40	10-30 قطرة، حتى 3 مرّات في اليوم
13-14 سنة	46-53	15-35 قطرة، حتى 3 مرّات في اليوم

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا استمرت الإلام لأكثر من 7 أيام، رغم استعمال الدواء.

تزداد خطورة نذرة المحيبات إذا استمر العلاج لأكثر من 7 أيام (انظر للبلند 4 - "الأعراض الجانبية").

المتعلّجون المسنون، المتعلّجون بحالة صحية عامة متديئة أو الذين لديهم خلل في أداء الكلى

يجب تقليل الجرعة لأن إفراز نواتج تفكيك ديبيراز قطرات للغم قد يُوخّر.

المتعلّجون الذين لديهم خلل في أداء الكلى أو الكبد
بما أن وتيرة الإحلاه من الجسم تتخفّض عند وجود خلل في أداء الكلى أو الكبد، يجب تجنب إعطاء جرعات عالية بشكل متكرر.
إذا استخدمت الدواء لفترة قصيرة فقط، فإن تقليل الجرعة الدوائية ليس ضرورياً.
ليست هناك تجربة حول استخدام الدواء على الأمد الطويل.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال

القطرات معدة للاستعمال الفموي.
يوصى بتناول القطرات مع الماء، يمكن تناولها قبل أو بعد الوجبة.

تأكد من أن سدادة القنبينة مغلقة جيداً بعد الاستعمال.

إذا تناولت جرعة مفرطة عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توخّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، مصطحباً عبوة الدواء معك.

تشتمل علامات الجرعة المفرطة على:

غثيان، حالاً تقوُّو، ألم في البطن، انخفاض أداء الكلى حتى فشل كلوي، دوران، نعاس، فقدان الوعي، اختلاجات، انخفاض حاد في ضغط الدم، فشل تنفّذ الدم، وتيرة نظم قلب سريعة.

في حال وجود شك في تناول جرعة مفرطة، يجب إبلاغ الطبيب فوراً لاتخاذ التدابير الملانمة.

ملاحظة: عند تناول جرعات عالية جداً من الدواء، فإن إفراز نواتج التفكيك غير الضار لديبيرون قد يجعل لون البول أحمرًا.

إذا نسيتم تناول الدواء، يمنع تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسية.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كلّ مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلّق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أيّ دواء، يمكن أن يسبب استخدام ديبيراز قطرات للغم أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فمن المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

قد تؤدي الأعراض الجانبية التالية إلى السقاطات وخيمة؛ يجب التوقف فوراً عن استعمال ديبيراز قطرات للغم قطرات والتوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن:

• إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية المفصلة أدناه بشكل مفاجئ أو إذا تطاقم إلى حد كبير، يجب إبلاغ الطبيب فوراً.
هناك بعض الأعراض الجانبية (مثل ردود فعل حادة من فرط التحسس؛ ردود فعل جلدية حادة مثل ملازمة ستيفنس-جونسون، تقشّر الأنسجة الممتّونة البشرية (تسمى أو متلازمة DRESS؛ نذرة المحيبات أو قلة الكريات الشاملة) التي قد تشكّل أحياناً خطراً على الحياة، في هذه الحالات، لا يجوز إطلاقاً استمرار تناول ديبيراز قطرات للغم دون مراقبة طبية.
قد يكون إيقاف العلاج ميكرًا هماً جدًّا للشفاء.

• إذا ظهرت علامات نذرة المحيبات، قلة الكريات الشاملة أو نقص الصفائح (انظر أدناه والبلند 2)، يجب التوقف عن استعمال ديبيراز قطرات للغم فوراً ويجب على الطبيب إجراء فحص تعداد الدم (يشمل التعداد التفريقي لخلايا الدم البيضاء).
يجب إيقاف العلاج قبل الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية.

• إذا ظهرت الأعراض التالية التي قد تكون علامات تدل على ضرر في الكبد (انظر أيضاً للبلند 2):

• غثيان أو تقوُّو، حمى، تعب، فقدان الشهية، بول داكن، براز فاتح، اصفرار الجلد أو بياض العينين، حكة، طفح أو ألم في البطن العلوية.

• يجب التوقف عن تناول ديبيراز قطرات للغم والتوجه فوراً لتلقي علاج طبي في حال شعرت بأي من ردود الفعل الجلدية الشديدة التالية (انظر أيضاً للبلند 2):

• يقع مسطحه ضاربة إلى الحمرة تشبه "الهدف" أو دائرية على الجزء العلوي من الجسم، غالباً ما تكون مع حويصلات مركزية.
جلد متقشر، تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية والعينين.
قد تظهر حالات الطفح الحاد هذه بعد ظهور سخونة وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا (ملازمة ستيفنس-جونسون، تقشّر الأنسجة الممتّونة البشرية (تسمى).

• طفح واسع النطاق، سخونة مرتفعة وتضخم في الغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS أو متلازمة فرط الحساسية للدواء).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية ليست شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 100 متعلّج):

- طفح بولن بنفسجي حتى أحمر داكن، ترافقه بثور أحياناً (رد فعل جلدي تجاه الدواء في مكان ثابت (fixed drug eruption).

- انخفاض حاد في ضغط الدم قد يحدث بسبب تأثير الدواء المباشر، ولا يكون مصحوباً بعلامات أخرى من رد فعل فرط التحسس.
أدى رد فعل كبدياً إلى انخفاض حاد في ضغط الدم في حالات نادرة فقط.
قد يرتفع خطر انخفاض ضغط الدم عند ارتفاع درجة حرارة الجسم ارتفاعاً استثنائياً.

العلامات المميزة لانخفاض الحاد في ضغط الدم هي وتيرة نظم قلب سريعة، شحوب، رجفة، دوران، غثيان وإسهام.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 متعلّج):

• **طفح جلدي** (مثلاً: طفح بقعي حطاطي).

- انخفاض حاد في تعداد نوع من خلايا الدم البيضاء (نذرة المحيبات)، يشتمل على حالات تؤدي إلى الوفاة، أو انخفاض تعداد الصفائح الدموية (قلة الصفائح).
يبدو أن ردود الفعل هذه ناتجة عن جهاز المناعة.
وهي قد تحدث حتى إذا تم تناول ديبيرون في الماضي دون أي بوذي إلى مضاعفات.
هناك شهادات على زيادة خطر حدوث نذرة المحيبات إذا تم تناول ديبيراز قطرات للغم لأكثر من أسبوع.

تتجسد نذرة المحيبات في ارتفاع حرارة الجسم، قشعريرة، ألم في الحنجرة، صعوبات في الابتلاع، والتهاب في الفم، الألف، الحنجرة، وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو في فتحة الشرج.
قد تظهر هذه الأعراض بشكل خفيف فقط.
لدى المتعلّجين الذين يتلقون مضادات حيوية (أدوية لعلاج التهاب تشبیه الجرم)، تكون وتيرة ترسب الدم مرتفعة إلى حد كبير، في حين لا تكون غالباً الغدد الليمفاوية متضخمة إطلاقاً أو أنها تكون متضخمة بدرجة قليلة فقط.

تشتمل الأعراض المميزة لثة الصفائح على ميل متزايد إلى النزيف وظهور نقاط حمراء صغيرة على الجلد وفي الأنسجة المخاطية التي تحدث بسبب نزيف.

- **نوبة ربو**.

- مناطق كبيرة من الجلد مغطاة بثبور وتقرّش الجلد (متلازمة ستيفنس-جونسون أو تقشّر الأنسجة الممتّونة البشرية (تسمى).

- **تدهور حاد في أداء الكلى**، في حالات معينة ترافقه كمية قليلة من البول بشكل استثنائي أو بدون تيول، إفراز بروتينات الدم في البول، قصور حاد في عمل الكلى، التهاب الكلى (التهاب الكلى الخلالي الحاد).

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 متعلّج):

- انخفاض حاد في تعداد نوع من خلايا الدم البيضاء (نذرة المحيبات)، يشتمل على حالات تؤدي إلى الوفاة، أو انخفاض تعداد الصفائح الدموية (قلة الصفائح).
يبدو أن ردود الفعل هذه ناتجة عن جهاز المناعة.
وهي قد تحدث حتى إذا تم تناول ديبيرون في الماضي دون أي بوذي إلى مضاعفات.
هناك شهادات على زيادة خطر حدوث نذرة المحيبات إذا تم تناول ديبيراز قطرات للغم لأكثر من أسبوع.

تتجسد نذرة المحيبات في ارتفاع حرارة الجسم، قشعريرة، ألم في الحنجرة، صعوبات في الابتلاع، والتهاب في الفم، الألف، الحنجرة، وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو في فتحة الشرج.
قد تظهر هذه الأعراض بشكل خفيف فقط.
لدى المتعلّجين الذين يتلقون مضادات حيوية (أدوية لعلاج التهاب تشبیه الجرم)، تكون وتيرة ترسب الدم مرتفعة إلى حد كبير، في حين لا تكون غالباً الغدد الليمفاوية متضخمة إطلاقاً أو أنها تكون متضخمة بدرجة قليلة فقط.

تشتمل الأعراض المميزة لثة الصفائح على ميل متزايد إلى النزيف وظهور نقاط حمراء صغيرة على الجلد وفي الأنسجة المخاطية التي تحدث بسبب نزيف.

- **نوبة ربو**.

- مناطق كبيرة من الجلد مغطاة بثبور وتقرّش الجلد (متلازمة ستيفنس-جونسون أو تقشّر الأنسجة الممتّونة البشرية (تسمى).

- **تدهور حاد في أداء الكلى**، في حالات معينة ترافقه كمية قليلة من البول بشكل استثنائي أو بدون تيول، إفراز بروتينات الدم في البول، قصور حاد في عمل الكلى، التهاب الكلى (التهاب الكلى الخلالي الحاد).

أعراض جانبية ذات انتشار غير معروف (لا يمكن تقييم انتشارها استناداً إلى البيانات المتوفرة):

- فشل مفاجئ في تدفق الدم بسبب رد فعل تحسسي حاد (صدمة تأقية).

- **نوبة قلبية** بسبب رد فعل تحسسي (متلازمة كوينس).

- **قفر الدم** مع خلل في أداء نخاع العظم (**قفر الدم اللا تنسجي**).
انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية (**قلة الكريات الشاملة**)، بما في ذلك حالات تشبه بالوفاة.

تشتمل علامات هذه التغييرات في الدم على شعور عام بالإعياء العام، ثلوث، حمى مستمرة، كدمات، نزيف وشح