

## لاكوساميد تيفع 50 ملغ لاكوساميد تيفع 100 ملغ لاكوساميد تيفع 150 ملغ لاكوساميد تيفع 200 ملغ

### أقرص مطليّة

التوكرب  
يحتوي كل قرص مطلي من لاكوساميد تيفع على لاكوساميد (Lacosamide) 50 ملغ، 100 ملغ، 150 ملغ أو 200 ملغ.

لمعلومات حول المركبات غير الفعالة ومُسيبات الحساسية، انظر الفصل 2 "معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء" والفصل 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي. هذا الدواء مُصنف لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

الصرع هو مرض يتميز بنوبات اختلاجات متكررة. يُعطى دواء لاكوساميد تيفع عندما يتميز الصرع بنوبات جزئية في البداية (تشتمل على جانب واحد فقط من الدماغ)، لكنها قد تتطور حتى تصبح اختلاجات عامة (تؤثر في أجزاء واسعة من كلا جانبي الدماغ). العلاج بلاكوساميد تيفع مواصل. لا يجوز التوقف عن العلاج من دون تعليمات صريحة من الطبيب. قد يتسبب التوقف عن العلاج عودة أو تفاقم أعراض المرض. انظر البند "إذا توقفت عن تناول الدواء".

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

- لاكوساميد تيفع معدّ للاستعمال لدى البالغين، المراهقين، والأطفال من جيل 4 سنوات وما فوق.
- لاكوساميد تيفع مُستطب لعلاج نوع معين من داء الصرع (epilepsy)، الذي يتميز بحدوث "نوبة جزئية مع أو من دون تعميم ثانوي" ("with or without secondary generalisation partial-onset seizure").
- يُمكن استعمال لاكوساميد تيفع وحده أو بالدمج مع أدوية أخرى مضادة للصرع. يحتوي لاكوساميد تيفع على لاكوساميد، الذي ينتمي إلى فصيلة المواد التي تُدعى "أدوية مضادة للصرع". تُستعمل هذه الأدوية لعلاج الصرع.

الفصيلة العلاجية، مضادات الاختلاج.

### 2. قبل استعمال الدواء

#### يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (لديك حساسية) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر "معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء" في هذا البند أدناه، وفي البند 6 - "معلومات إضافية"). إذا لم تكن متأكدًا أنك حساس، يرجى التحدث مع طبيبك.
- كان لديك نوع معين من مشكلة في النبض تُدعى AV block من الدرجة الثانية أو الثالثة.

لا تتناول لاكوساميد تيفع إذا كانت إحدى الحالات الموصوفة أعلاه تنطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

#### تحذيرات خاصة متعلّقة باستخدام الدواء

- لا يجوز استعمال هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج
- إذا كانت لديك أفكار حول إصابة ذاتية أو أفكار انتحارية. عانى عدد قليل من الأشخاص الذين عولجوا بأدوية مضادة للاختلاجات مثل لاكوساميد، من أفكار للإصابة الذاتية أو أفكار انتحارية. إذا كانت لديك إحدى هذه الأفكار في أي وقت كان، أخبر طبيبك فوراً.
- إذا كانت لديك مشكلة قلبية تؤثر في نبض القلب، وإذا كان لديك غالباً نبض بطيء، سريع أو غير منظم (مثل AV block، رجحان أذيني أو رفرقة أذينية).
- إذا كان لديك مرض قلب حاد، مثل قصور القلب أو نوبة قلبية.
- إذا عانيت من الدوار أو السقوط أحياناً. قد يؤدي لاكوساميد تيفع إلى أن تشعر بالدوار، ما قد يزيد من خطر الإصابة أو السقوط العرضي لديك. يعني هذا أن عليك توخي الحذر حتى تعتاد على تأثيرات الدواء.

إذا كانت إحدى الحالات الموصوفة أعلاه تنطبق عليك (أو إذا لم تكن متأكدًا)، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول لاكوساميد تيفع. إذا كنت تتناول لاكوساميد تيفع وتعاين من أعراض لنوبات قلب غير سليمة (مثل تباطؤ، تسارع أو نوبات قلب غير عادية، خفقان القلب، ضيق تنفس، الشعور بدوار، إغماء)، توجه للاستشارة الطبية على الفور (انظر الفصل 4).

#### الأطفال دون سن 4 سنوات

لا يوصى بتناول لاكوساميد تيفع للأطفال دون سن 4 سنوات. وذلك لأنه ليس معروفًا حتى الآن فيما إذا كان لاكوساميد تيفع ناجعًا، وأما لدى الأطفال من هذه الفئة العمرية.

#### التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تتناول مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. من المهم إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بشكل خاص إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية التي تؤثر في قلبك، وذلك لأن لاكوساميد تيفع قد يؤثر في قلبك:

- أدوية لعلاج مشاكل في القلب.
- أدوية تطيل مقطع PR في مسح القلب (مخطط كهربية القلب (ECG) أو Electrocardiography) مثل: أدوية للصرع أو لثلام تدعى كاريمازيبين، لاموتريجين، أو بريجابالين.
- أدوية تستعمل لعلاج أنواع مختلفة من ضربات القلب غير المنتظمة أو قصور القلب. إذا كانت إحدى الحالات الموصوفة أعلاه تنطبق عليك (أو إذا لم تكن متأكدًا)، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول لاكوساميد تيفع.
- كما أنه من المهم بشكل خاص أن تخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية، لأنها قد تزيد أو تقلل من تأثير لاكوساميد تيفع على جسمك:
- أدوية للعدوى الفطرية تدعى فلوكونازول، إيتراكونازول أو كيتوكونازول.
- دواء لـ HIV يدعى ريتونافير.
- أدوية للعدوى الجرثومية يدعى كلاريثروميسين أو ريفامبيسين.
- دواء نباتي المستعمل لعلاج الفلق الخفيف والاكنتاب يدعى St. John's Wort.
- إذا كانت إحدى الحالات الموصوفة أعلاه تنطبق عليك (أو إذا لم تكن متأكدًا)، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول لاكوساميد تيفع.

### استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

بهدف توخي الحذر، لا يجوز تناول لاكوساميد تيفع مع الكحول.

### الحمل والإرضاع

يجب على النساء اللواتي في سن الخصوبة التحدث مع الطبيب عن استعمال وسائل منع الحمل.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بالدواء، وذلك إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدن أنك حامل، أو تخططين للحمل.

لا يوصى بتناول لاكوساميد تيفع إذا كنت حاملاً، لأن تأثيرات لاكوساميد تيفع على الحمل والجنين غير معروفة.

لا يوصى بإرضاع رضيعك أثناء تناول لاكوساميد تيفع لأن لاكوساميد ينتقل عبر حليب الأم.

استشيري طبيبك فوراً إذا أصبحت حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل. سوف يُساعدك الطبيب على اتخاذ القرار فيما إذا كان عليك تناول لاكوساميد تيفع أم لا.

لا توقفي العلاج من دون استشارة طبيبك أولاً، لأن الأمر قد يزيد من نوبات الاختلاج لديك. إن إز تقاوم مرضك قد يُلحق ضرراً بجنينك أيضاً.

### السياقة واستخدام الماكينات

لا يجوز السياقة، ركوب الدراجة الهوائية أو استعمال أية أدوات أو ماكينات حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء فيك. وذلك لأن لاكوساميد تيفع قد يسبب لك الشعور بالدوار أو تشوش الرؤية.

### معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء

تحتوي أقراص لاكوساميد تيفع 100 ملغ و 150 ملغ على المركب:

FD&C yellow #6/sunset yellow FCF aluminium lake (E110) الذي قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

تحتوي أقراص لاكوساميد تيفع 200 ملغ على المركب: Ponceau 4R aluminium lake (E124)، الذي قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

### 3. كيف تُستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. افحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء.

#### الجرعة الدوائية

الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب، فقط.

- عليك تناول لاكوساميد تيفع مرتين في اليوم - مرة في الصباح ومرة في المساء
- عليك محاولة تناول الدواء تقريبا في ذات الساعة من اليوم
- عليك ابتلاع قرص لاكوساميد تيفع مع كأس من الماء

ستبدأ بشكل عام بتناول جرعة منخفضة في كل يوم، ثم سيرفع طبيبك الجرعة تدريجياً خلال بضعة أسابيع. عندما تصل إلى الجرعة الملائمة لك، المسماة "جرعة الصيانة" ("maintenance dose")، عندها ستتناول ذات الكمية كل يوم. يُستعمل لاكوساميد تيفع لعلاج طويل الأمد. عليك الاستمرار بتناول لاكوساميد تيفع حتى يطلب منك طبيبك أن تتوقف عن تناوله.

#### ما هي الجرعة التي يجدر تناولها

تظهر أدناه الجرعات الاعتيادية الموصى بها من لاكوساميد تيفع وفق فئات عمرية مختلفة وأوزان مختلفة. قد يصف طبيبك جرعة مختلفة لك إذا كانت لديك مشاكل في كليتيك أو كبدك.

#### المراهقون والأطفال الذين يزنون 50 كغم أو أكثر والبالغون

عندما تتناول لاكوساميد تيفع كعلاج وحيد:

الجرعة الابتدائية من لاكوساميد تيفع هي 50 ملغ مرتين في اليوم غالباً. يُحتمل أن يصف لك طبيبك أيضاً جرعة ابتدائية مقدارها 100 ملغ من لاكوساميد تيفع مرتين في اليوم. قد يرفع طبيبك جرعتك (التي تُعطى مرتين في اليوم) بـ 50 ملغ كل أسبوع. وذلك حتى تصل إلى جرعة صيانة تتراوح بين 100 ملغ حتى 300 ملغ مرتين في اليوم.

عندما تتناول لاكوساميد تيفع مع أدوية أخرى مضادة للصرع:

الجرعة الابتدائية من لاكوساميد تيفع هي 50 ملغ مرتين في اليوم غالباً.

قد يرفع طبيبك جرعتك (التي تُعطى مرتين في اليوم) بـ 50 ملغ كل أسبوع. وذلك حتى تصل إلى جرعة صيانة تتراوح بين 100 ملغ حتى 200 ملغ مرتين في اليوم.

إذا كنت تزن 50 كغم أو أكثر، قد يقرر طبيبك بدء العلاج بلاكوساميد تيفع عن طريق إعطاء جرعة تحميل مفردة مقدارها 200 ملغ. ثم بعد مرور 12 ساعة، سوف تبدأ بتناول جرعة الصيانة الخاصة بك لفترة ما.

#### الأطفال والمراهقون الذين يزنون أقل من 50 كغم

تعمد الجرعة على وزنهم. سيتلقى الأطفال علاجاً بالأقراص فقط إذا كانوا قادرين على ابتلاع الأقراص وتلقي الجرعة الملائمة وفق جرعات الأقراص المختلفة. بدلاً من ذلك، وكما يظهر في السياق في بند "السحق/الشرط/المضغ" إذا لزم الأمر، يمكن سحق القرص والابتلاع فوراً مع الماء. إذا كانت هناك حاجة لجرعة أخرى، يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة وبشكل الإعطاء الملائمين. في إسرائيل مُسجّل أيضاً مستحضر يحتوي على لاكوساميد على شكل جرعة من محلول للحقن الوريدي.

#### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

#### طريقة الاستعمال

##### السحق/الشرط/المضغ

لا يجوز شطر الأقراص. لا يوجد خط للشرط، لذلك لا يمكن أن تضمن تجانس الصنفين. من أجل تسهيل البلع، إذا دعت الحاجة، يمكن سحق القرص، وابتلاعه فوراً مع الماء. يُحتمل أن يكون طعم القرص المسحوق مرّاً.

#### مدة العلاج

لاكوساميد تيفع معدّ لعلاج طويل الأمد.

عليك إكمال العلاج الذي وصفه الطبيب. لا يجوز لك التوقف عن العلاج من دون تعليمات من الطبيب.

#### إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء. تجنّب السياقة.

قد تعاني من:

## أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال

حمى، زكام (التهاب الأنف والبلعوم)، ألم في الحنجرة (التهاب البلعوم)، تناول كمية أقل من الطعام مما هو معتاد، تغييرات في السلوك، عدم التصرف كالمعتاد. نقص الطاقة (Lethargy). الشعور بنعاس هو عرض جانبي شائع جدًا لدى الأطفال ومن شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أطفال.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

## الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

## 5. كيف يُخزّن الدواء؟

تجنّب التسلّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسلّم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة واللوححة (بليستر). تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

## شروط التخزين:

يجب التخزين بدرجة حرارة تحت 25°C.

يُنصح بإبقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو حاوية القمامة. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Cellulose microcrystalline, crospovidone, hydroxypropylcellulose - low substituted, hydroxypropylcellulose, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate

يحتوي الطلاء على:

Poliviny alcohol, titanium dioxide, polyethylene, glycol, talc

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الطلاء على:

لاكوساميد تيفغ 50 ملغ:

Red iron oxide, black iron oxide, yellow iron oxide

لاكوساميد تيفغ 100 ملغ:

Yellow iron oxide, Quinoline yellow, FD&C yellow #6/sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

لاكوساميد تيفغ 150 ملغ:

Yellow iron oxide, FD&C yellow #6/sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

لاكوساميد تيفغ 200 ملغ:

FD&C blue/brilliant blue FCF aluminium lake, Ponceau 4R aluminium lake (E124)

## كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة

لاكوساميد تيفغ 50 ملغ: قرص بيضوي، لونه زهري، مطبوع عليه "50" في جهة واحدة، وأملس في الجهة الأخرى.

لاكوساميد تيفغ 100 ملغ: قرص بيضوي، لونه أصفر، مطبوع عليه "100" في جهة واحدة، وأملس في الجهة الأخرى.

لاكوساميد تيفغ 150 ملغ: قرص بيضوي، لونه برتقالي، مطبوع عليه "150" في جهة واحدة، وأملس في الجهة الأخرى.

لاكوساميد تيفغ 200 ملغ: قرص بيضوي، لونه أزرق، مطبوع عليه "200" في جهة واحدة، وأملس في الجهة الأخرى.

عبوات لويحات: تتضمن كل عبوة 14، 56، 60، 98، 112، 168، 200 أو 210 أقراص

عبوات قنّان: في كل عبوة 60 قرصا

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

اسم المُنتج وصاحب التسجيل وعنوانه

تيفغ إسرائيل م.ض.،

شارع دقّورا هفتينا 124،

تل أبيب 6944020.

تم تحرير النشرة في كانون الثاني 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

لاكوساميد تيفغ 50 ملغ: 163-96-35487

لاكوساميد تيفغ 100 ملغ: 163-97-35488

لاكوساميد تيفغ 150 ملغ: 163-98-35489

لاكوساميد تيفغ 200 ملغ: 163-99-35490

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

• غثيان أو تقيؤات.

• اختلاجات، مشكلة في النبض مثل نبض بطيء، سريع أو غير منتظم، غيبوبة (coma)، أو هبوط ضغط الدم المصحوب بضربات قلب سريعة، وتعرق.

## إذا نسيت تناول الدواء

• إذا نسيت تناول جرعة خلال الساعات الـ 6 الأولى من موعد الجرعة المخطط له، تناولها فورًا عند تذكرك.

• إذا نسيت تناول الجرعة بعد الساعات الـ 6 الأولى من موعد الجرعة المخطط له، لا تتناول القرص المنسي. بدلا من ذلك، تناول لأكوساميد تيفغ في الموعد القادم الذي يتعين عليك تناوله فيه.

• لا يجوز لك إطلاقًا تناول جرعتين معا تعويضا عن الجرعة المنسية!

## إذا توقفت عن تناول الدواء

• لا يجوز لك إيقاف تناول لأكوساميد تيفغ من دون التحدث مع الطبيب، لأن داء الصرع لديك قد يعود مجددا أو يتفاقم.

• إذا قرر طبيبك إيقاف علاجك بلاكوساميد تيفغ، فسوف يخبرك كيفية تقليل الجرعة تدريجيا خطوة تلو الأخرى.

• عليك المداومة على العلاج تبعًا لتوصية الطبيب.

• حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

• يُمنع تناول الأدوية في الظام! تحقّق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

• إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال لأكوساميد تيفغ أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أي منها.

قد تكون حدة الأعراض الجانبية المتعلقة بالجهاز العصبي مثل الدوار أعلى بعد جرعة التحميل. تحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أحد الأعراض التالية:

## أعراض جانبية شائعة جدا (تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 متعالجين):

• صداع.

• شعور بالدوار أو الغثيان.

• رؤية مزدوجة (Diplopia).

## أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 متعالجين):

• مشاكل في التوازن، رجفة، وخز (تتميل)، أو تشنّج العضلات، السقوط بسهولة والتعرض لكدمات.

• مشاكل في الذاكرة، التفكير أو في صياغة التعبيرات، ارتباك.

• حركات سريعة وغير إرادية في العينين (Nystagmus)، تتّوش الرؤية.

• شعور بالدوار (Vertigo)، شعور بالتمالّة.

• تقيؤ، جفاف في الفم، إمساك، عسر الهضم، فرط الغازات في البطن أو الأمعاء، إسهال.

• انخفاض مستوى الإحساس أو التمسّس، صعوبة في لفظ الكلمات، انخفاض التركيز.

• سماع ضجيج في الأذن مثل طنين، رنين، أو صفير.

• عصبية، اضطراب في النوم، اكتئاب.

• نعاس، تعب أو ضعف (Asthenia).

• حكة، طفح.

## أعراض جانبية ليست شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 متعالجين):

• وتيرة نظم قلب بطيئة، خفقان، نبض غير منتظم أو تغييرات أخرى في نشاط القلب الكهربائي (اضطراب في التوصيل الكهربائي).

• شعور مبالغ به من الرفاه الجسدي والنفسي، رؤية و/أو سماع أشياء غير حقيقية.

• رد فعل تحسسي على تناول الدواء، شرى.

• قد تُظهر نتائج فحوصات الدم استثناءات في وظائف الكبد، إصابة كبدية.

• أفكار لإلحاق الضرر الذاتي أو أفكار انتحارية أو محاولة لإلحاق الضرر الذاتي: أخبر طبيبك فورًا.

• شعور بالغضب أو عدم الهدوء.

• اضطراب في التفكير أو شعور بالعربة عن الواقع.

• رد فعل تحسسي شديد مصحوب بتورم الوجه، الحنجرة، اللسان، راحتي القدمين، الكاحلين أو الساقين.

• إغماء.

• حركات لا إرادية غير سلمية (خلل الحركة).

• صعوبات في تناسق الحركات أو المشي.

أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض لا يمكن تحديدها وتيرة شيوعها استنادا إلى البيانات المتوفرة):

• نبض سريع شاذ (تسرّع القلب البطيني)

• ألم في الحنجرة، حمى، وخطر مزياد للإصابة بالعدوى. قد تشير فحوصات الدم إلى انخفاض حاد في نوع معين من خلايا الدم البيضاء (Agranulocytosis).

• رد فعل جلدي شديد قد يشمل على: ارتفاع الحرارة، وأعراض أخرى شبيهة بالإنفلونزا، طفح جلدي على الوجه، طفح واسع، تورم الغدد (تضخم الغدد الليمفاوية). قد تُظهر فحوصات الدم ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد، وارتفاع نوع معين من خلايا الدم البيضاء (Eosinophils).

• طفح جلدي واسع مصحوب بحويصلات وتقرّح الجلد، لا سيما حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة Stevens-Johnson) وشكل حد أكثر من تقرّح الجلد بنسبة تزيد عن 30% من مساحة الجسم (Toxic epidermal necrolysis).

• اختلاج.