

# פלאג'יל תרחיף

## החומר הפעיל וכמותו:

כל 1 מ"ל מכיל:

מטרונידאזול במינואט 40 מ"ג

שווה ערך למטרונידאזול 25 מ"ג

Metronidazole benzoate 40 mg

Corresponding to Metronidazole 25 mg

כל כפית מדידה (5 מ"ל) מכילה:

מטרונידאזול 125 מ"ג

Metronidazole 125 mg

חומרים בלתי פעילים – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק

מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6.

## קרא בעיון את העלון עד סופו ברם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול בנכונ. אל תעביר אותה לאחרים. היא

עולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

## 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת לטיפול בזיהומים הנובעים מאמבות, למבליאזיס, טריכומונס, חיידקים אנארוביים או חיידקים הרגישים למטרונידאזול.

התרופה מכילה חומר פעיל בשם מטרונידאזול השייך לקבוצת תרופות הנקראות אנטיביוטיקה.

החומר פועל על ידי הריגת החיידקים והפריזיטים הגורמים לזיהום בגוף.

במקרים מסוימים, יש צורך במתן בו זמני של טיפול תרופתי לבן/בת הזוג, גם אם לא מופיעים אצל/ה תסמינים – אנה היוועץ ברופא.

**קבוצה תרופית:** אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה אנטי-פריזיטית מקבוצת ה-5-ניטורואימידאזול.

קוד ATC: P01AB01 – J01XD01

## 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל מטרונידאזול או לתרופה השייכת לקבוצת האימידאזולים (קבוצת האנטיביוטיקות אליה שייך מטרונידאזול) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בפלאג'יל תרחיף, ספר לרופא אם יש לך:

- הפרעות נוירולוגיות,
- הפרעות פסיכיאטריות,
- הפרעות בדם,
- היתה לך בעבר דלקת קרום המוח בזמן טיפול במטרונידאזול. אם אתה עומד לעבור בדיקת דם, ספר לרופא או לאחות המבצעים את הבדיקה שאתה נוטל פלאג'יל תרחיף. פלאג'יל תרחיף עשויה להשפיע על התוצאות של בדיקות דם מסוימות.
- פנה לרופא מייד אם מתרחשות אחת או יותר מהתופעות הבאות בזמן הטיפול עם פלאג'יל:

החל מהמנה הראשונה, יש סיכון לתגובה אלרגית חמורה ופתאומית (שוק אנאפילקטי, אנגידידמה) שעשויה לגרום לתסמינים הבאים: לחץ בחזה, סחרחורת, בחילה או התעלפות, או סחרחורת בעת קיחה לעמידה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). אם תסמינים אלה מתרחשים, הפסק את השימוש בתרופה כיוון שחייך עלולים להיות בסכנה ופנה לרופא מייד.

אם, בתחילת הטיפול, אתה מבחין באדמומיות בכל הגוף עם מורסות, המלווה בחום, יש לחשוף בתופעה רצינית שנקראת "תופעות לוואי" (generalized exanthematous pustulosis חריפה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). ידע את הרופא שלך מייד, כיוון שהדבר דורש את הפסקת הטיפול. תגובה זו משמעותה שאין לקחת יותר גלועם מטרונידאזול, לבד או בשילוב אותה תרופה עם חומר פעיל אחר.

עליך לשים לב לסימנים אפשריים או להחמרה בהפרעות עצביות כגון קושי בתיאום התנועות, סחרחורת (תחושה ש"הראש מסתובב"), בלבול, פרכוסים, קושי בדיבור או בהליכה, רעד, תנועות עיניים לא רצוניות, וכן להפרעות אחרות בידיים ובכפות הרגליים כגון עקצוץ, תחושות דקירה, תחושת קור, חוסר תחושה וירידה בתחושת מגע. הפרעות אלה הן בדרך כלל הפיכות עם הפסקת הטיפול. לכן, חשוב להפסיק את הטיפול בתרופה ולראות רופא מייד (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

החל מהמנות הראשונות של הטיפול, ההתנהגות שלך עשויה להשתנות ולסכן אותך, במיוחד אם היו לך בעיות פסיכיאטריות בעבר. אם זה קורה, הפסק לטול את התרופה ופנה לרופא (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

מקרים של רעילות כבדת חמורה או כשל כבדי חריף, כולל מקרים של מוות, במטופלים עם סינדרום קוקיין (Cockayne syndrome) דווחו עם תרופות המכילות מטרונידאזול.

אם הנך סובל מסינדרום קוקיין, על הרופא שלך לנטר לעיתים תכופות את תפקודי הכבד שלך, בעת הטיפול במטרונידאזול וגם לאחר מכן.

ספר מייד לרופא שלך והפסק לקחת מטרונידאזול אם אתה מפתח את התופעות הבאות:

כאב בטן, חוסר תיאובן, בחילה, הקאה, חום, חולשה, עייפות, צהבת, שתן כהה, צואה בצבע חימר או גרד.

### בדיקות ומעקב:

אם היו לך הפרעות בדם בעבר, או שאתה מקבל מינון גבוה ו/או לאורך זמן, הרופא שלך עשוי להפנות אותך לבדיקות דם תקופתיות כדי לבדוק את ספירת הדם המלאה שלך.

ידע את הרופא או את מועדבת הבדיקה שאתה לוקח תרופה זו אם אתה צריך לעבור בדיקת מעבדה, כיוון שנטילת מטרונידאזול עשויה להשפיע על חלק מתוצאות בדיקות המעבדה (בדיקה לטרופומה) על ידי מתן תשובה חיובית שאינה נכונה (לדוגמה בבדיקת נלסון).

**אינטראקציות/תגובות בין תרופות:**  
**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות המכילות אלכוהול בגלל הסיכון לתופעות לוואי כגון אדמומיות בפנים, תחושת חום, הקאה וקצב לב מוגבר,
- בוסופלן (מומלץ לטיפול בסוגים מסוימים של הפרעות בדם וכחנכה להשתלת מח עצם),
- דיסולפיראם (משמש למניעת נסיגה במטופלים עם תלות באלכוהול),
- כל תרופה שיכולה לגרום להפרעות בקצב הלב (נקרא גם הארכת מקטע QT, תופעה שניתן לראות באלקטרוקארדיוגרמה [אק"ג]), כגון תרופות מסוימות להפרעת קצב, אנטיביוטיקות מסוימות, ותרופות המשמשות כטיפול קו ראשון בפסיכוזות (הכוללות דלזיות, זיתות, פרנויה, או הפרעות בחשיבה),
- נוגדי פרסודים המאיימים יצור אנזימים (enzyme-inducing anticonvulsants), המשמשים לטיפול בהתקפים אפילפטיים,
- ריפארפיצין (מומלץ לטיפול בזיהומים חיידקיים מסוימים, כגון שחפת),
- ליתיום (משמש לטיפול במחלות נפשיות),
- 5-פלאורואורזיל (תרופה לטרטן),
- מדליל דם הניתילם דרך הפה ונקראים אנטגוניסטים לויטמין K, אשר נרשמים כדי למנוע היווצרות קרישי דם.

### שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול:

יש להימנע משתיית אלכוהול בתקופת הטיפול בתרופה זו בגלל הסיכון לתופעות לוואי כגון אדמומיות בפנים, תחושת חום, הקאה וקצב לב מוגבר.

### הריון והנקה:

אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון, התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני נטילת תרופה זו. אם הדבר הכרחי, ניתן ליטול תרופה זו במהלך הריון. עם זאת, עליך תמיד להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילתה. יש להימנע מהנקה בזמן נטילת תרופה זו.

### נהיגה ושימוש במכונית:

עליך ליתן בחשבון, במיוחד אם אתה נוהג או משתמש במכונית, שקיים סיכון לסחרחורת (תחושה ש"הראש מסתובב"), בלבול, הזיות (ראייה או שמיעה של דברים שאינם נמצאים), התכווצויות (פרסודים) הקשורות זמניות בראייה (כגון ראייה מטושטשת או כפולה) או הפרעות לפלאג'יל תרחיף.

אם תסמינים אלה מתרחשים, אל תנהג ברכב או תפעיל מכונית.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

**פלאג'יל תרחיף מכילה סוכרוז, אתנול, נתרן, ופראיידרוקסיבנזואט.**

תרופה זו מכילה סוכרוז. כמותו של סוכרוז נמוכה בהריון או נטילת תרופה זו. נדירות של אי-סבילות לפרוקטוז, קושי בספיגת גלוקוז-גלקטוז או אי-ספיקת סוכראז-איזומלטיאז לא ליטול תרופה זו.

תרופה זו מכילה 3 גרם סוכרוז בכל כפית מדידה. יש לקחת את הדבר בחשבון בצריכה היומית של מטופלים בדיאטה דלת סוכר או סוכרת.

תרופה זו מכילה אתנול (אלכוהול) 1% V/V, כלומר, עד 40 מ"ג אתנול בכל כפית מדידה, אשר שווה ערך ל-12 מ"ל בירה או 5 מ"ל למונה. השימוש בתכשיר זה מייק למי שסובל מאלכוהוליזם. יש לקחת את הדבר בחשבון בשנים בהריון או מניקות, בילדים ובקבוצות בסיכון גבוה כגון מטופלים עם מחלת כבד או אפילפסיה.

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למונה, כלומר למעשה "נטולת נתרן".

התרופה מכילה פראיידרוקסיבנזואט ועשויה לגרום לתגובות אלרגיות.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. חשוב לסיים את כל משך הטיפול. המינון ומשך הטיפול תלויים במחלתך.

### המינון המקובל בדרך כלל הוא:

**לאמבליאזיס:**  
מבוגרים – 1.50 גרם מטרונידאזול ליום, מחולק ל-3 מנות. ילדים – 30-40 מ"ג מטרונידאזול לק"ג משקל גוף ליום, מחולק ל-3 מנות.

משך הטיפול – 7 ימים רצופים.  
**לטריומונס:**  
גברים (טריומונס בשופכה ובנרתיק) – טיפול של 10 ימים המשלב:

0.50 גרם מטרונידאזול ליום במתן דרך הפה, מחולק ל-2 מנות; טבליה וגינלית אחת ליום.

במידה וצורת המתן של הטבליות הוגינליות אינה זמינה הרופא ישקול טיפול חלופי.

יש לטפל במקביל גם בשותף ליחסי מין, ללא תלות בהופעת סימנים לזיהום וגם בבדיקות המעבדה שליליות.

- גברים (טריומונס בשופכה):  
0.50 גרם מטרונידאזול ליום במתן דרך הפה, מחולק ל-2 מנות, למשך 10 ימים.

במקרים נדירים מאוד יהיה צורך להעלות את המינון ל-0.750 גרם או 1 גרם מטרונידאזול.

**ללמבליאזיס:**  
מבוגרים – 0.750 גרם עד 1 גרם מטרונידאזול ליום למשך 5 ימים רצופים.

ילדים בגיל 2 עד 5 שנים – 250 מ"ג מטרונידאזול ליום. ילדים בגיל 5 עד 10 שנים – 375 מ"ג מטרונידאזול ליום. ילדים בגיל 10-15 שנים – 500 מ"ג מטרונידאזול ליום.

**לדלקת לא-ספציפית בנרתיק:**  
500 (2 X 250 מ"ג) מטרונידאזול פעמיים ביום למשך 7 ימים. יש לטפל במקביל גם בשותף ליחסי מין.

**לחיידקים אנארוביים:**  
מבוגרים – 1 גרם עד 1.5 גרם מטרונידאזול. ילדים – 20-30 מ"ג מטרונידאזול לק"ג משקל גוף ליום.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לנער את התרחיף לפני התחלת השימוש. עליך להשתמש בכפית המדידה המצורפת לאריה למדידת הכמות הנכונה של התרופה. אין להשתמש בכפית ביתית לצורך מדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן וייתכן שלא תקבל את הכמות הנכונה של התרופה.

## הוראות לניטול התרופה:

- על מנת לפתוח את הבקבוק, לחץ מטה וסובב את הפקק העמיד לפתיחה על ידי ילדים, כמתואר באיור מטה:



- תרופה זו ניתנת עם כפית מדידה למתן דרך הפה המסופקת עם הבקבוק באריזה. כפית מדידה זו נועדה לשימוש רק למתן דרך הפה של פלאג'יל תרחיף.


השתמש בכפית מדידה זו למתן דרך הפה למידת המנה של מטרונידאזול שיש ליטול.

הנפח הכולל של כפית המדידה המלאה עד הסוף הוא 5 מ"ל, או מנה של 125 מ"ג של מטרונידאזול.

ניתן לתת 2.5 מ"ל, או מנה של 62.5 מ"ג של מטרונידאזול, על ידי שימוש בכפית המדידה המלאה עד לסימון "1/2 כפית" ("1/2 CULLER").

ניתן לתת כמויות אחרות של מטרונידאזול עם כפית מדידה זו. לדוגמה: על מנת לתת מנה של 250 מ"ג של מטרונידאזול, מלא את כפית המדידה עד הסוף, תן מנה זו, וחזור על התהליך.

תרשים כפית המדידה:



כפית מדידה אחת מלאה עד הסוף (5 מ"ל) מכילה 125 מ"ג של מטרונידאזול.

חצי אחד של כפית מדידה מלאה עד הסימון "1/2 כפית" ("1/2 CULLER") (2.5 מ"ל) מכילה 62.5 מ"ג של מטרונידאזול.

- לאחר כל שימוש, סגור את בקבוק התרחיף, שטוף היטב במים את כפית המדידה למתן דרך הפה וישב אותה. החזר מייד את כפית המדידה למתן דרך הפה לאריזה ואחסן הרחק מהישג ידם של ילדים. לעולם אל תפריד את כפית המדידה למתן דרך הפה מהפריטים האחרים באריזה התרופה (בקבוק, אריזה, עלון לצרכן).

**אנשים שעוברים דיאליזה** – דיאליזה מוציאה את פלאג'יל תרחיף מהדם. אם הנך עובר דיאליזה, יש ליטול פלאג'יל תרחיף לאחר טיפול הדיאליזה.

**אנשים עם בעיות בכבד** – ייתכן שהרופא יורה לך להשתמש במינון נמוך מהרגיל או בתדירות נמוכה מהרגיל.

**בדיקות ומעקב** – ייתכן שהרופא ירצה לבצע בדיקות אם הנך נוטל את התרופה במשך יותר מ-10 ימים.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארית התרופה איתך.

**אם נשכחת ליטול את התרופה** בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אולם אם כבר הגיע כמעט הזמן המיועד למנה הבאה, דלג על מנה זו וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא. אין ליטול מנה כפולה כפיצוי על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושי! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרופא ממשקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפלאג'יל תרחיף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

התופעות במערכת העיכול:

- הפרעות עיכול שאינן רציניות, כגון כאב בטן, בחילה, הקאה, שלשול.
- דלקת בלשון יובש בפה, דלקת בפה, הפרעות בחוש הטעם, אובדן תיאבון.
- פנקראטיטיס (דלקת של הלבלב), שהינה הפיכה לאחר הפסקת הטיפול.
- שינוי בצבע או במראה של הלשון (עשוי להיגרם בגלל פטריה).

השפעות על העור ורקמות ריריות:

- גלי חום עם אדמומיות בפנים, גרד, פריחה המלווה לפעמים בחום.
- פריחה בעור, התנפחות אלרגית פתאומית של הפנים והצוואר (אנגיואדמה), שוק אלרגי שיכול להיות מסכן חיים (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- מקרים נדירים מאוד של אדמומיות המתפשטת לכל הגוף עם מורסות/מוגליות (pustules), המלווה בחום

(generalized exanthematous pustulosis חריפה) (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

- פריחה שלפוחיתית עם התקלפות של העור שעשויה להתפשט לכל הגוף ולהיות מסכנת חיים (toxic epidermal necrolysis), תסמונת סטיבנס-ג'ונסון).
- תפרחת מקובעת מהתרופה: כתמים עגולים ואדומים של פריחה בעור עם תחושת גרד ושריפה, המותירה סימנים בעלי צבע וייתכן שתופיע באותם מקומות אם הטיפול באותה תרופה מתחיל שוב.

הפרעות במערכת העצבים:

- נזק עצבי בגפיים (ניורופתיה תחושתית פריפריאלית), עם השפעות על הידיים וכפות הרגליים כגון עקצוץ, תחושות דקירה, תחושת קור, חוסר תחושה וירידה בתחושת מגע, כאב ראש,
- סחרחורת (תחושה "הראש מסתובב"),
- פרוסים,
- בלבול,

- הפרעות נוירולוגיות, הנקראות אנצפלופתיה או תסמונת צרברית, עם תסמינים הכוללים בלבול, הפרעות בהכרה, הפרעות התנהגותיות, קושי בתיאום תנועות, בעיות בביטוי, הפרעות שיווי משקל, תנועות עיניים לא רצונית, רעד.
- הפרעות אלה הן כדרך כלל הפיכות עם הפסקת הטיפול ועשויות להיות קשורות לשינויים בסריקות MRI. מקרי מוות נדירים מאוד דווחו (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- דלקת קרום המוח לא חידקית.

הפרעות פסיכיאטריות:

- הזיות,
- הפרעות באישיות (פרנויה, דליריום) אשר עשויות להיות מלוות במחשבות או פעולות אובדניות (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- נטייה לדיכאון.

הפרעות בראייה:

- הפרעות זמניות בראייה כגון ראייה מטושטשת, ראייה כפולה, קוצר ראייה, ירידה בראייה, שינויים בראיית צבעים,
- נזק או דלקת בעצב הראייה.

הפרעות בדם:

- ספירת טסיות נמוכה באופן חריג, מספר נמוך באופן חריג או ירידה גדולה במספר תאי דם לבנים מסוימים (ניוטרופילים).

הפרעות לבבויות:

- שכיחות לא ידועה (לא ניתן להעריך מהנתונים הקיימים): הפרעות בקצב הלב (נקרא גם הארכת מקטע QT, תופעה שניתן לראות באלקטרוקארדיוגרמה [אק"ג]), במיוחד כאשר משתמשים בפלאג'יל תרחיף עם תרופות אחרות שעשויות לגרום להפרעות בקצב הלב.

השפעות על הכבד:

- עלייה באנזימי כבד (טראנסאמינאזות, אלקליין פוספאז),
- מקרים נדירים מאוד של נזק רציני לכבד (לפעמים מלווה בצהבת), ובמיוחד מקרים של כשל כבדי הדורש השתלה.

מידע נוסף:

- שתן בצבע אדמדם-חום הנגרם על ידי התרופה.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן במקום מוגן מאור, בטמפרטורה שאינה עולה על 30°C. לאחר הפתיחה הראשונה, ניתן להשתמש במשך עד 8 ימים, מאוחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 30°C.

אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. לאחר סיום הטיפול, קח את כל האריזות הפתוחות (כולל כפית המדידה והבקבוק) לרוקח אשר ישליך אותן כנדרש. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Ready-to-use sucrose solution/sucrose powder, Ph. Eur., ethanol 96%, aluminium magnesium silicate, saccharin sodium, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, methyl parahydroxybenzoate, concentrated lemon essence, detersinated orange essence, propyl parahydroxybenzoate, purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

התרחיף הינו בצבע לבן-אפרפר ובריח תפוח-לימון. התכשיר ארוז בבקבוק זכוכית וסגור בפקק העמיד לפתיחה על ידי ילדים. כפית מדידה מצורפת.

גודל אריזה: 120 מ"ל.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התרופה. אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

**בעל הרישום היבואן וכתובתו:** סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 8090, נתניה.

נערך באוקטובר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 104-56-22129.

לשם הפשטות ולהקלה על הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.