

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

# סיקוסטט G 66 וטרינרי CYCOSTAT 66 G VETERINARY

קדם תערובת בצורת גרנולות אבקה

20 ק"ג

עפ"י מרשם רופא וטרינר בלבד

**תכולה:** כל 1 ק"ג מוצר מוגמר מכילים 66 גרם רובנידין הידרוכלוריד  
Robenidine Hydrochloride.

**קבוצה תרפויטית:** קוקסידיוסטטים.

**התוויות:** לתרנגולי פטם, תרנגולי הודו וארנבות למניעת קוקסידיוזיס.

**מינון:**  
תרנגולי פטם ותרנגולי הודו- יש להוסיף 450-540 גרם של סיקוסטט 66G לכל  
טונה מזון, בהתאם להוראות רופא וטרינר.  
ארנבות - יש להוסיף 750-1000 גרם של סיקוסטט 66G לכל טונה מזון,  
בהתאם להוראות רופא וטרינר.

ALN-CYCOSTAT-1122

## אופן השימוש:

תחילה יש להוסיף ולערבב באופן הומוגני כל כמות מינון הסיקוסטט 66G יחד  
עם מזון בכמות של 10 פעמים ממשקלו. לאחר ערבוב הומוגני, יש להוסיף  
ליתרת כמות המזון ולערבב שוב עד לקבלת תערובת הומוגנית.  
לאחר הכנת התערובת הרפואית היא יציבה במשך 12 שבועות, כאשר התערובת  
מאוחסנת במקום קריר ויבש.

**התוויות נגד:** אין להשתמש בתכשיר במידה וידועה רגישות ל Hydrochloride Robenidine.  
אין לתת בו זמנית עם תכשירים אחרים למניעת קוקסידיוסיס.

**זמני המתנה:** זמן המתנה לפני שחיטה - 5 ימים.

## אזהרות:

- ◆ לא לשימוש במטילות.
- ◆ הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ◆ לשימוש וטרינרי בלבד.

## אזהרות למפעיל:

אין לבלוע או לנשום אבק של תכשיר זה. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. כל  
כלי הכנה ישטף היטב מיד בסיום ההכנה. המפעיל ישטוף ידיו בסבון ומים לאחר  
השימוש. באחריות המפעיל להכיר את כל הוראות הבטיחות כפי שרשומים ב  
MSDS (material safety data sheet) של המוצר.

## חומרי גלם בלתי פעילים:

Calcium lignosulphonate, Calcium sulphate dehydrate

**אחסנה:** יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C. יש לסגור את השק  
היטב לאחר פתיחתו.

**מספר רישום:** 083-13-92348-00

**היצרן:** Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l, Via Rubadello 6, 41036  
Medolla, Italy

**בעל הרישום:** זואטיס ישראל הולדינג בי.וי. רחוב עתיר ידע 5 כפר סבא.



zoetis

