

Lot:

Expiry date:

Manufacturing date:

Net weight:

Product code:

20 kg



## אווטק 150 ג' וטרינרי AVATEC 150 G VETERINARY

Lasalocid Sodium 150g/kg

**פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו  
בדצמבר 2019  
עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

**1. שם התרופה:**

אווטק 150 ג' וטרינרי  
Avatec 150 G Veterinary  
קדם תערובת בצורת אבקה

**2. הרכב:**

כול 1 ק"ג מכיל:

לסלוסיד סודיום Lasalocid Sodium 150g

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף 13 "מידע נוסף".



ALN-AVATEC-1122

### 3. למה מיועדת התרופה:

כתוסף רפואי למוזן של פטמים והודיים למניעת קוקסידיוזיס הנגרם מזני אימיריה (Eimeria).  
קבוצה תרפויטית: קוקסידיוסטאט.

### 4. התוויות נגד:

אין להשתמש בתכשיר במידה ויודעה רגישות לסלוסיד סודיום.

### 5. תופעות לוואי:

אין תופעות לוואי ידועות.  
אם הבחנת בתופעות חמורות כלשהן או בתופעות אחרות אשר אינן מוזכרות בעלון לצרכן זה, אנא יידע את הרופא הוטרינרי שלך.  
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 6. חיות מטרה:

פטמים והודיים.

### 7. צורת מתן ומינון:

קדם תערובת בצורת אבקה.

יש לערבב תחילה עם כמות קטנה של מזון ורק לאחר מכן עם הכמות הסופית.

פטמים:

יש לערבב היטב 500-830 גרם של אווטק 150 ג' וטרינרי בטון תערובת, על מנת להגיע למינון של 125-75 ppm לסלוסיד סודיום בתערובת מזון סופית.

המינון המוקבל הוא 600 גרם לטון, על מנת להגיע לריכוז של 90ppm לסלוסיד סודיום בתערובת.

יש להאכיל באופן ממושך מגיל יום ולא מאוחר יותר מ-5 ימים לפני שחיטה.

הודיים:

יש לערבב היטב 500-830 גרם של אווטק 150 ג' וטרינרי בטון תערובת, על מנת להגיע למינון של 125-75 ppm לסלוסיד סודיום בתערובת מזון סופית.

יש להאכיל באופן ממושך מגיל יום עד גיל מקסימום של 16 שבועות.

### 8. אופן השימוש בתכשיר:

להוספה וערבוב הומוגניים במזון בהתאם להוראות רופא וטרינר.

### 9. זמן המתנה:

זמן המתנה לבשר לפטמים והודיים - 5 ימים

### 10. אזהרות:

אזהרות מיוחדות לכל זני המטרה

לא לשימוש במטילות.

לא לשימוש בבעלי החיים המייצרים חלב למאכל אדם.

אסור לשימוש בסוסים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות לשימוש בתרופה בבעלי חיים

אין.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

בזמן הערבוב או העיסוק בחומר יש ללבוש כפפות ומסכה לפנים.

יש להתרחץ לאחר העבודה ולפני האוכל.

אין לבלוע או לנשום אבק של תכשיר זה.

יש להימנע ממוגע בעור ובעיניים.

באחריות המפעיל להכיר את כל הוראות הבטיחות כפי שרשומים ב MSDS (material safety data sheet) של המוצר.

פריית והטלה

לא לשימוש במטילות.

תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציות

אין להשתמש בו זמנית עם תרופות אחרות נגד קוקסידיוזיס.

מינון יתר

אין תופעות ידועות.

חוסר תאימות (incompatibility)

אין.

### 11. הוראות אחסון:

מנע הרעלה! הורפה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

תנאי אחסון: לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל-25°C.

לאחסן באריזה המקורית.

חיי מדף לאחר הערבוב עם מזון: התערובת ניתנת לשימוש למשך 3 חודשים.

### 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

### 13. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Calcium lignosulphonate  
Ferric oxide  
Calcium sulphate dihydrate

• כיצד נראית התרופה: אבקה אדמדמה.

• האריזה: שק המכיל 20 ק"ג.

• שם היצרן וכתובתו: Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l, Via Rubadello 6, 41036 Medolla, Italy

• בעל הרישום וכתובתו: זואטיס ישראל הולדינג ב.י.ו. רחוב עתיר ידע 5 כפר סבא.

מספר רישום התכשיר בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 146-20-33397-00

zoetis

