

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) 1986 يُسوّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

أُتِيتت XR 5 ملغ
أُتِيتت XR 10 ملغ
أُتِيتت XR 15 ملغ

كيسولات للإطلاق المستديم

تحتوي كل كيسولة للإطلاق المستديم من أُتِيتت XR 5 ملغ على:

1.25 ملغ ديكسترو أمفيتامين ساكارات	1.25 mg dextroamphetamine saccharate
1.25 ملغ أمفيتامين أسبارتات مونوهيدرات	1.25 mg amphetamine aspartate monohydrate
1.25 ملغ ديكسترو أمفيتامين سولفات	1.25 mg dextroamphetamine sulfate
1.25 ملغ أمفيتامين سولفات	1.25 mg amphetamine sulfate

كمية الأمفيتامين المكافئة الإجمالية هي 3.1 ملغ.

تحتوي كل كيسولة للإطلاق المستديم من أُتِيتت XR 10 ملغ على:

2.5 ملغ ديكسترو أمفيتامين ساكارات	2.5 mg dextroamphetamine saccharate
2.5 ملغ أمفيتامين أسبارتات مونوهيدرات	2.5 mg amphetamine aspartate monohydrate
2.5 ملغ ديكسترو أمفيتامين سولفات	2.5 mg dextroamphetamine sulfate
2.5 ملغ أمفيتامين سولفات	2.5 mg amphetamine sulfate

كمية الأمفيتامين المكافئة الإجمالية هي 6.3 ملغ.

تحتوي كل كيسولة للإطلاق المستديم من أُتِيتت XR 15 ملغ على:

3.75 ملغ ديكسترو أمفيتامين ساكارات	3.75 mg dextroamphetamine saccharate
3.75 ملغ أمفيتامين أسبارتات مونوهيدرات	3.75 mg amphetamine aspartate monohydrate
3.75 ملغ ديكسترو أمفيتامين سولفات	3.75 mg dextroamphetamine sulfate
3.75 ملغ أمفيتامين سولفات	3.75 mg amphetamine sulfate

كمية الأمفيتامين المكافئة الإجمالية هي 9.4 ملغ.

تحتوي كل كيسولة للإطلاق المستديم من أُتِيتت XR 20 ملغ على:

5.0 ملغ ديكسترو أمفيتامين ساكارات	5.0 mg dextroamphetamine saccharate
5.0 ملغ أمفيتامين أسبارتات مونوهيدرات	5.0 mg amphetamine aspartate monohydrate
5.0 ملغ ديكسترو أمفيتامين سولفات	5.0 mg dextroamphetamine sulfate
5.0 ملغ أمفيتامين سولفات	5.0 mg amphetamine sulfate

كمية الأمفيتامين المكافئة الإجمالية هي 12.5 ملغ.

تحتوي كل كيسولة للإطلاق المستديم من أُتِيتت XR 25 ملغ على:

6.25 ملغ ديكسترو أمفيتامين ساكارات	6.25 mg dextroamphetamine saccharate
6.25 ملغ أمفيتامين أسبارتات مونوهيدرات	6.25 mg amphetamine aspartate monohydrate
6.25 ملغ ديكسترو أمفيتامين سولفات	6.25 mg dextroamphetamine sulfate
6.25 ملغ أمفيتامين سولفات	6.25 mg amphetamine sulfate

كمية الأمفيتامين المكافئة الإجمالية هي 15.6 ملغ.

تحتوي كل كيسولة للإطلاق المستديم من أُتِيتت XR 30 ملغ على:

7.5 ملغ ديكسترو أمفيتامين ساكارات	7.5 mg dextroamphetamine saccharate
7.5 ملغ أمفيتامين أسبارتات مونوهيدرات	7.5 mg amphetamine aspartate monohydrate
7.5 ملغ ديكسترو أمفيتامين سولفات	7.5 mg dextroamphetamine sulfate
7.5 ملغ أمفيتامين سولفات	7.5 mg amphetamine sulfate

كمية الأمفيتامين المكافئة الإجمالية هي 18.8 ملغ.

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر في الفصل 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ للنشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء للعلاج من اجلتهامن أجل ولدك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك ان حالتهم الطبية مشابهة.

يحتوي الدواء على الأمفيتامينات، التي يُحتمل ان تتم معارفتها (سوء استخدامها)، التناول طوال مدة طويلة قد يسبب الاعتماد.
معايرة الأمفيتامينات قد تسبب موتًا فجائيًا وأعراضًا جانبية خطيرة خطيرة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

يحتوي الدواء على خليط من أملاح الأمفيتامينات، التي تعتبر مواد منشطة للجهاز العصبي المركزي، وهو مخصص لعلاج اضطراب الانتباه، التركيز وفرط النشاط (اضطراب نقص الانتباه والتركيز)، المسمى بالإنجليزية:

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

الفصلية العلاجية: خليط من أملاح الأمفيتامينات المنشطة للجهاز العصبي المركزي.

قد يساعد الدواء على زيادة الانتباه وتقليل عتبة الاندفاعية وفرط النشاط لدى متلقي العلاج الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه والتركيز وفرط الحركة. يجب استعمال هذا الدواء في إطار برنامج علاجي شامل ل ADHD والذي من شأنه ان يشمل وسائل أخرى (نفسية، تربوية، اجتماعية).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت أو كان ولدك:

<ul style="list-style-type: none">تعاني/يعاني من مرض في القلب أو من تكلس الشرايين تعاني/يعاني من فرط ضغط الدم من الدرجة المتوسطة أو الخطيرة تعاني/يعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية تعاني/يعاني من الزرق - جلاوكوما تعاني/يعاني من حالة قلق خطيرة، توتر أو عدم الهدوء تعاني/يعاني الأن أو عانيت في الماضي/لوجد لديك ماضٍ من الإمان على الكحول أو على الأدوية تستعمل/يستعمل دواء مضادًا للاكتئاب من نوع مثبّطات الأوكسيداز احادي الأمين (MAOIs) أو إذا تناولت دواء كهذا خلال الأسبوعين الأخيرين
<ul style="list-style-type: none">حساسًا (لديك/لديه أرجية) للأمفيتامينات، لأدوية منشطة أخرى أو لأحد المركبات الأخرى في الدواء

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل البدء بالعلاج يجب إخبار الطبيب إذا كنت تعاني أو كان ولدك يعاني الآن أو عاتى/عانيت في الماضي من مشكلة طبية ما، أو إذا كان هناك ماضٍ عاتلي، بما في ذلك:

- مرض في القلب، عيب في القلب، فرط ضغط الدم
- مشاكل نفسية، ذهان، هوس، مرض ثنائي القطب، اكتئاب، انتحار
- عرّات (ردود فعل لا إرادية في العضلات)، متلازمة توريت (Tourette's syndrome)
- مشاكل في الكبد
- مشاكل في الكليتين
- مرض كلوي في المرحلة النهائية (ESRD)
- مشاكل في الغدة الدرقية
- اختلاجات أو نتيجة شاذة في فحص موجات الدماغ (فحص EEG)
- مشاكل في الدورة الدموية في أصابع اليدين والقدمين. انعدام الإحساس (خدر)، ألم، تغير في لون الجلد، حساسية لدرجة الحرارة في أصابع اليدين أو القدمين
- المعاقرة أو الاعتماد على الكحول، على أدوية ملازمة بوصفة طبيب أو على مخدرات الشوارع
- إذا كنت حاملاً أو تحططين للحمل
- إذا كنت مرضعًا أو تحططين للرضاع

تحذيرات أخرى

سيفكر الطبيب في إجراء فحص لوظيفة القلب قبل البدء بالعلاج بالدواء.

سيفكر الطبيب في إجراء فحوص منتظمة لضغط الدم ونبض القلب في فترة العلاج بالدواء.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت أنت أو ولدك تستعملان الآن أو قد استعملتما مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك خاصة يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت أنت أو ولدك تستعملان:

- أدوية مضادة للاكتئاب بما في ذلك أدوية من فصيلة مثبّطات الأوكسيداز احادي الأمين (MAOIs). انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت أو كان ولدك"
- أدوية مضادة للذهان
- ليثيوم
- مسكنات الآلام الباركويتية
- أدوية لعلاج فرط ضغط الدم
- أدوية لعلاج الاختلاجات
- أدوية لتخفيف الزكام أو أدوية مضادة للحساسية تحتوي على مزيلات الاحتقان
- أدوية لعلاج فرط الحموضة في المعدة (مثل بيكربونات الصوديوم، أومييرازول)
- أدوية لتميع الدم
- أدوية سيروتونية المفعول (من فصيلة SNRI، من فصيلة SSRI، تريبتانات، مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات، فينتانيل، ليثيوم، ترامادول، تريپتوفان، بوسبيرون، St. John's Wort)
- كينيدين، ريتونايفر
- أستيأز ولاميد

يجب عليك معرفة الأدوية التي تتناولها أو التي يتناولها ولدك. يجب تحضير قائمة بالأدوية والاحتفاظ بها من أجل عرضها على الصيدلي أو الطبيب بحسب الحاجة.

الحمل

يجب عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو إذا كنت تفكرين في إحداث حمل، إذ إن الدواء قد يسبب الضرر لجنينك.

الإرضاع

ينقل الدواء إلى حليب الأم. لا يجوز الإرضاع خلال فترة استعمال الدواء.

الاستعمال لدى الأولاد

هذا الدواء غير مخصص للأولاد الذين سنهم دون الـ 6. لا تتوفر معلومات بخصوص سلامة وفعالية استعمال هذا الدواء لدى الأولاد دون سن الـ 6.

السياقة واستعمال الماكنت

قد يدخل الدواء بالقدرة على السياقة وبالقدرة على تشغيل الماكنت الخطرة. يجب على متلقي العلاج بموجب ذلك توخي الحذر بما يتناسب مع هذه الأعمال عند القيام بها.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون الطعام.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على السكر. إذا أخذك الطبيب بأن لديك أو لدى ولدك عدم تحمّل لسكريات معينة، فراجع الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.
كمية السكر: أُتِيتت XR 5 ملغ – ما يقارب 46 ملغ من السكر، أُتِيتت XR 10 ملغ – ما يقارب 91 ملغ من السكر، أُتِيتت XR 15 ملغ – ما يقارب 136 ملغ من السكر، أُتِيتت XR 20 ملغ – ما يقارب 181 ملغ من السكر، أُتِيتت XR 25 ملغ – ما يقارب 226 ملغ من السكر، أُتِيتت XR 30 ملغ – ما يقارب 271 ملغ من السكر.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

يجب تناول الدواء تمامًا كما تم وصفه. سيلائم الطبيب الجرعة الدوائية لك أو لولدك بشكل شخصي.

يجب تناول الدواء مرة واحدة في اليوم، في الصباح بعد أن تستيقظ.

كيسولة أُتِيتت XR هي كيسولة للإطلاق المستديمّ تقوم بإطلاق الدواء داخل الجسم أثناء اليوم.

يجب بلع الكيسولة بكاملها مع الماء.

إذا كانت هناك صعوبة في بلع الكيسولة بكاملها فيمكن فتحها ونثر محتواها على ملعقة من هريس التفاح.

يجب بلع خليط هريس التفاح والدواء كله بشكل فوري دون المضغ. بعد ذلك يجب شرب الماء.

يُمنع مضغ أو سحق الكيسولة أو الدواء الموجود داخل الكيسولة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

الفحوص والمتابعة

- من حين إلى آخر، قد يوقف الطبيب العلاج من أجل إجراء تقييم لاضطراب نقص الانتباه والتركيز
- قد يجري الطبيب فحوصًا منتظمة للقلب وضغط الدم في فترة العلاج بالدواء
- بالنسبة للأولاد، فيجب فحص الوزن والطول في أحيان متقاربة
- سيفكر الطبيب في إيقاف العلاج إذا كانت النتائج تشير إلى مشكلة ما.
- إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتياديّ واستمر الطبيب. يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي مسبقًا.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟

لا يجوز تناول الأدوية في التمتع! راجع المُلصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال أُتِيتت XR إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقّ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية بعد استعمال أدوية منشطة:

- مشاكل تتعلق بالقلب**
 - موت فجائي لدى متلقي العلاج الذين يعانون من عيب أو من خلل في وظيفة القلب
 - حدث دماغي أو نوبة قلبية لدى البالغين
 - ارتفاع ضغط الدم وتيرة القلب

يجب عليك مراجعة الطبيب فورًا إذا أحسست أو أحنّ ولدك بأعراض تعكس مشاكل في القلب أثناء استعمال الدواء مثل آلام في الصدر، صعوبات في التنفّس، أو إغماء.

2- مشاكل نفسية (متعلقة بالمطب النفسي)

جميع متلقي العلاج

- ظهور مشاكل سلوكية وتفكيرية جديدة أو تفاقم هذه الأعراض
- ظهور مرض ثنائي القطب جديد أو تفاقم المرض الثنائي القطب القائم من قبل
- ظهور سلوك عدواني أو عدائية جديدة أو تفاقمها

الأولاد والفتيان

- ظهور أعراض ذهانية جديدة (مثل سماع أصوات، الإيمان بأشياء غير حقيقية تبدو مشوهة) أو أعراض جديدة للبهوس.
- يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا عانيت أو عاتى ولدك من ظهور مشاكل نفسية جديدة أو أي أعراض نفسية جديدة أو من تفاقمها أثناء استعمال الدواء، خاصة رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية، الإيمان بأشياء غير حقيقية تبدو مشوهة.**
- 3-** مشاكل في جريان الدم في أصابع اليدين والقدمين (مشكلة في الأوعية الدموية المحيطية، بما في ذلك متلازمة رينو (Raynaud))
 - انعدام الإحساس (خدر)، برودة، ألم في أصابع اليدين والقدمين
 - تغير اللون من الشاحب إلى الأزرق والأحمر في أصابع اليدين والقدمين
- يجب إبلاغ الطبيب فورًا إذا تطورت هذه الأعراض أو إذا لوحظت جروح غير مفسرة، تظهر في أصابع اليدين أو القدمين في فترة استعمال الدواء.**

الأعراض الجانبية الخطيرة الأخرى تشمل على:

- تباطؤ النمو (الطول والوزن) لدى الأولاد
- اختلاجات، خصوصًا لدى متلقي العلاج الذين لديهم ماضٍ من الاختلاجات
- تغيرات في الرؤية أو تشوش الرؤية
- عرّات (ردود فعل لا إرادية في العضلات)
- متلازمة السيروتونين – عرض قد يشكّل خطرًا على الحياة، وقد يحدث عندما يتم تناول أدوية مثل هذا الدواء مع أدوية معينة أخرى (أدوية سيروتونية المفعول مثل SSRI، SNRIs، تريبتانات، مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات، فينتانيل، ليثيوم، ترامادول، تريپتوفان، بوسبيرون، St. John's Wort. وما إلى ذلك) وكذلك في حالات فرط الجرعة. قد تشمل أعراض متلازمة السيروتونين على:

- هياج عاطفي، هلوسات، غيبوبة أو تغيرات أخرى في الوضع النفسي
- مشاكل في السيطرة على الحركات أو تقلصات في العضلات
- نبض سريع
- ضغط دم مرتفع أو منخفض
- تعرّق أو حمّى
- غثيان أو تقيؤات
- إسهال
- تصلّب أو توتر عضلي

يجب إيقاف العلاج بالدواء والمبادرة إلى علاج داعم.

أعراض جانبية شائعة

- صداع
- ألم في البطن
- مشاكل في النوم
- انخفاض في الوزن
- جفاف في الفم
- وتيرة قلب سريعة
- انخفاض في الشهية
- عصبية
- تقلّبات في المزاج
- دوار

أعراض جانبية إضافية

أعراض قليلة: خفقان القلب، اعتلال العضلة القلبية (مرض في عضلة القلب).

الجهاز العصبي المركزي: أعراض ذهانية، فرط التهيج، تامل، عصبية، نشوة، اضطرابات حركية، ديسفوريا - انزعاج (مزاج يتمثّل بعدم الرضا)، اكتئاب، ارتعاش، عدوانية، عرّات، غضب، ثثرة (logorhea)، الإضرار الذاتي بالجلد (dermatilomania)،

إحساس بالوخز، وصربير الأسنان.

العينان: رؤية مشوّشة، توسّع الحدقة.

الجهاز الهضمي: طعم غير لطيف، إمساك.

ردود فعل تحسسية: فرط الحساسية بما في ذلك الوذمة الوعائية (انتفاخ الجلد والأغشية المخاطية غالبًا في منطقة الفم، اللسان والحلق) وثاق (رد فعل تحسسي حاد قد يشكّل خطرًا على الحياة)، طفوح جلدية خطيرة بما في ذلك متلازمة ستيفينس جونسون و-s toxic epidermal necrolysis (التي تتمثّل بتكوّن حويصلات وتقرّش الجلد).

الجهاز الغدّي الصمّاويّ: تغيرات في الرغبة الجنسية (الشبق)، الضعف الجنسي، الانتصاب المتواتر أو المديد.

الجلد: تساقط الشعر.

الجهاز العضلي-هيكلي: انحلال العضل (انحلال الريدادات).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فطليكَ استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجنبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وبذلك ستمنع التسسم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C.

يمكن استعمال الدواء حتى 60 يومًا منذ فتح القنينة لأول مرة، وليس بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية.

لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. أسال الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Sugar Spheres (sucrose and corn starch)، Ammonio Methylacrylate copolymer، Talc، Hydroxypropyl cellulose، Triethyl citrate.

يحتوي جسم الكيسولة، غطاء الكيسولة والحبر على:

5 mg: Gelatin, Titanium Dioxide, Yellow Iron Oxide, FD&C Blue # 1, Red Iron Oxide
10 mg: Gelatin, Titanium Dioxide, FD&C Blue # 1, D&C Yellow # 10
15 mg: Gelatin, Titanium Dioxide, Yellow Iron Oxide, Red Iron Oxide, D&C Yellow # 10
20 mg: Gelatin, Titanium Dioxide, FD&C Blue # 1
25 mg: Gelatin, Titanium Dioxide, D&C Yellow # 10
30 mg: Gelatin, Titanium Dioxide, Yellow Iron Oxide, Red Iron Oxide

وكذلك:

FD&C Red # 40 (E129), FD&C Blue # 2 (E132), FD&C Blue # 1 (E133), D&C Yellow # 10
كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

أُتِيتت XR 5 ملغ:

كيسولات معتمة ذات جسم كيسولة لونه برتقالي وغطاء كيسولة لونه أزرق فاتح. مطبوع R و-3062 بالأسود على جسم الكيسولة وغطائها.

أُتِيتت XR 10 ملغ:

كيسولات معتمة ذات جسم كيسولة لونه عاجيّ وغطاء كيسولة لونه أزرق فاتح. مطبوع R و-3059 بالأسود على جسم الكيسولة وغطائها.

أُتِيتت XR 15 ملغ:

كيسولات معتمة ذات جسم كيسولة لونه برتقالي وغطاء كيسولة لونه عاجيّ. مطبوع R و-3063 بالأسود على جسم الكيسولة وغطائها.

أُتِيتت XR 20 ملغ:

كيسولات معتمة ذات جسم كيسولة لونه أزرق فاتح وغطاء كيسولة لونه أزرق فاتح. مطبوع R و-3060 بالأسود على جسم الكيسولة وغطائها.

أُتِيتت XR 25 ملغ:

كيسولات معتمة ذات جسم كيسولة لونه عاجيّ وغطاء كيسولة لونه عاجيّ. مطبوع R و-3064 بالأسود على جسم الكيسولة وغطائها.

أُتِيتت XR 30 ملغ:

كيسولات معتمة ذات جسم كيسولة لونه برتقالي وغطاء كيسولة لونه برتقالي. مطبوع R و-3061 بالأسود على جسم الكيسولة وغطائها.

محتوى العبوة:

الكيسولات معبأة في قنينة بلاستيكية ذات سدّاد صعب الفتح من قبل الأولاد. في كل عبوة توجد 30 كيسولة للإطلاق المستديم.

قد لا تسوّق فعليًا جميع جرعات الدواء وأحجام العبوات.

اسم المصنّع وصاحب الاستياز وعنوانه:

تبيّع إسرائيل مرض. دفوره هانيقينه 124، تل أبيب 6944020.

تمت المصادقة على هذه النشرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

أرقام تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

5 ملغ 170-89-35975

10 ملغ 170-90-35994

15 ملغ 170-91-35995

20 ملغ 170-92-35996

25 ملغ 170-93-35997

30 ملغ 170-94-35988

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

ATTENT XR PIL MW1122

teva