

تزيبيلماب TM

محلون للحقن

الحقن تحت الجلد

التكوين:

تحتوي كل حقنة جاهزة للإستعمال (1.91 ملل) على:

تزيبيلماب 210 ملغ Tezepelumab 210 mg

المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

احفظ النشرة من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1 ما هو تزيبيلماب ولأي غرض مخصص الدواء؟

تزيبيلماب مخصص كعلاج داعم بالإضافة إلى العلاج الحالي للربو الشديد لدى الكبار والمراهقين فوق عمر 12 سنة.

الفصلية العلاجية:

من أدوية علاج تضيقات الطرق التنفسية.

ضد وحيد النسيلة ضد البروتين TSLP (thymic stromal lymphopoietin)

ما هو تزيبيلماب

تزيبيلماب عبارة عن دواء يحتوي على المادة الفعالة تزيبيلماب، التي تعتبر ضد وحيد النسيلة. إن الضد عبارة عن نوع بروتين مصمم للتعرف والإرتباط بموقع هدف معين في الجسم. موقع الهدف الخاص لـ تزيبيلماب هو بروتين يسمى TSLP (thymic stromal lymphopoietin). للبروتين TSLP دور هام في المسيرة الإنتهائية في الطرق التنفسية حيث يسبب أعراض وعلامات الربو. بواسطة حجب عمل البروتين TSLP، فإن تزيبيلماب يساهم في تقليل المسيرة الإنتهائية وأعراض الربو.

2 قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البريحي) لـ تزيبيلماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6). تحقق من الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً أو كنت تعتقد أن ذلك قد ينطبق عليك

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال تزيبيلماب

- تزيبيلماب ليس دواء طوارئ. لا تستعمله لعلاج نوبات الربو المفاجئة.
- إذا لم يتحسن الربو لديك أو يتفاقم أثناء تناول الدواء، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة.
- إنتبه لأعراض رد الفعل التحسسي. يمكن أن تسبب أدوية مثل تزيبيلماب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. تختلف علامات رد الفعل التحسسي ويمكن أن تشمل مشاكل في التنفس، شرى وطفح. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.
- تحدث مع الطبيب حول كيفية تشخيص علامات مبكرة للحساسية وكيفية التعامل معها إذا ظهرت.
- إنتبه للعلامات المحتملة لحدوث تلوث خطير أثناء إستعمالك تزيبيلماب مثل:
 - سخونة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تعرّق ليلي
 - سعال لا يتوقف
 - جلد مائل للون الأحمر، ساخن ومؤلم أو طفح جلدي مؤلم يتراكم بحويصلات.
 - إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.
 - إذا وُجد لديك حالياً تلوث خطير، تحدث مع طبيبك، قبل إستعمالك لـ تزيبيلماب.
- إنتبه لأعراض المشاكل القلبية، مثل:
 - آلام في الصدر
 - ضيق في التنفس
 - شعور عام بعدم الراحة، وعكة أو تضرر جودة الحياة.
 - دوام أو إغماء.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، تحدث مع الطبيب أو مع الممرضة فوراً.

- إذا وُجد لديك تلوث طفلي (تسبب به طفيلي) أو كنت تظن في منطقة تنتشر فيها التلوثات الطفيلية (أو إذا كنت مسافراً إلى مثل هذه المنطقة)، تحدث مع طبيبك. قد يضعف تزيبيلماب من قدرة جسمك على محاربة أنواع معينة من التلوثات الطفيلية.

الأطفال والمراهقون

تزيبيلماب غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة. لا تتوفر معلومات حول سلامة ونجاعة إستعمال هذا المستحضر لدى أطفال دون عمر 12 سنة.

التفاعلات والتفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إخط طبيبك أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص ما يلي:

- أخبر الطبيب إذا تلقيت مؤخراً لقاحاً أو ستلقى لقاحاً في الفترة القريبة.

أدوية إضافية لعلاج الربو

لا تتوقف بشكل مفاجئ عن أدوية الوقاية من الربو بمجرد أن تبدأ العلاج بـ تزيبيلماب. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تتناول الستيروئيدات (تسمى أيضاً كورتيكوستيروئيدات). يجب التوقف عن إستعمال هذه الأدوية بشكل تدريجي، تحت إشراف مباشر من طبيبك وبناءً على إستجابتك لـ تزيبيلماب.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو ممرضة، إذا كنت تعتقدن بأنه من الجائز أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، إستشيري طبيبك قبل إستعمال الدواء.

لا يجوز إستعمال تزيبيلماب أثناء الحمل إلا إذا أخبرك الطبيب خلاف ذلك. من غير المعروف ما إذا كان تزيبيلماب من شأنه أن يلحق الضرر بالجنين.

قد ينتقل تزيبيلماب إلى رضيعك عبر حليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، يجب إستشارة الطبيب.

السياسة وإستعمال الماكينات

من غير المحتمل أن يؤثر تزيبيلماب على قدرتك على القيادة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي تزيبيلماب على أقل من 1 ميغرام من الصوديوم (23 ملغ) في كل مقدار دوائي قدره 210 ملغ، وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال تزيبيلماب دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

الكبار والمراهقون فوق عمر 12 سنة:

المقدار الدوائي الموصى به هو 210 ملغ (حقنة واحدة) كل أربعة أسابيع. يُعطى تزيبيلماب بالحقن تحت الجلد. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

سيفر كل من طبيبك أو الممرضة، ما إذا كان بإمكانك حقن الدواء بنفسك أو إذا كان بإمكان شخص آخر يعتني بك القيام بذلك من أجلك. إذا كان الأمر كذلك، فستتلقى أنت أو سيقلقى الشخص الذي يُعالجك إرشاداً حول الطريقة الصحيحة لتحضير وحقن الدواء تزيبيلماب.

قبل إستعمال تزيبيلماب، عليك قراءة كامل "تعليمات الإستعمال" بالنسبة لـ تزيبيلماب حقنة جاهزة للإستعمال. قم بذلك قبل كل عملية حقن، من الجائز أن يتم تحديث المعلومات الواردة في "تعليمات الإستعمال".

لا يجوز مشاركة حقنة تزيبيلماب للإستعمال أو إستعمال الحقنة أكثر من مرة واحدة.

إذا فوّت مقداراً دوائياً من تزيبيلماب

● إذا نسيت حقن مقداراً دوائياً من تزيبيلماب، قم بحقن المقدار الدوائي في أسرع وقت ممكن. وبعد ذلك، إحنقن الحقنة التالية في الوقت المخطط له.

● إذا لم تلاحظ أنك فوّت مقداراً دوائياً وقد حان وقت المقدار الدوائي التالي بالفعل، إحنقن المقدار الدوائي التالي كما هو مخطط له. لا تحقن مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي الذي فوّته.

● إذا لم تكن واثقاً متى عليك حقن تزيبيلماب، إسال الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

التوقف عن إستعمال تزيبيلماب

لا يجوز التوقف عن العلاج بـ تزيبيلماب دون التحدث عن ذلك أولاً مع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي. قد يؤدي إيقاف أو تضيوش العلاج بـ تزيبيلماب إلى عودة أعراض ونوبات الربو.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تزيبيلماب قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهم من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

● أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

● ألم في الحنجرة

● طفح

● آلام في المفاصل

● أعراض في موقع الحقن (مثل إحمرار، إنتفاخ وآلم)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5 كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسهم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

● يجب الحفظ في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية (في البراد). إذا دعت الحاجة، يمكن حفظ تزيبيلماب في علبة الكرتون في درجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يوماً. لا يجوز إعادته إلى البراد بعد أن تم تخزين تزيبيلماب في درجة حرارة الغرفة.

● يجب حفظ تزيبيلماب في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.

● لا يجوز الخفض، التجميد أو التعريض للحرارة.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. عند أي حالة من الشك، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

● لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.

● لا تستعمل تزيبيلماب إذا سقطت الحقنة، تضررت أو في حالة تلف ختم العلبة.

لا يجوز إلقاء أي دواء إلى المجاري. يجب إستشارة الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

L-proline, Acetic acid glacial, Polysorbate 80, Sodium hydroxide, Water for injection

كيف يبدو الدواء؟

تزيبيلماب عبارة عن محلول شفاف حتى طليبي، عديم اللون حتى مائل للأصفر.

يتوفر تزيبيلماب ضمن علبة تحتوي على حقنة واحدة جاهزة للإستعمال.

المنتج:

أسترازينيكا AB، سودرتالية، السويد

صاحب الإمتياز والمستورد:

أسترازينيكا (إسرائيل) م.ض.،

شارع عتيري بيدع 1، كفار سابا 4464301.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 171-59-37290

تمت المصادقة عليها في كانون الثاني 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تعليمات الإستعمال للحقن الذاتي

تزيبيلماب TM

محلون للحقن ضمن حقنة جاهزة للإستعمال

تحتوي كل حقنة جاهزة للإستعمال (1.91 ملل) على:

تزيبيلماب 210 ملغ Tezepelumab 210 mg

الحقن تحت الجلد

حقنة جاهزة للإستعمال لمرة واحدة

تحتوي تعليمات الإستعمال هذه على معلومات حول كيفية حقن تزيبيلماب.

قبل إستعمال حقنة تزيبيلماب، سيوضح أحد أفراد الطاقم الطبي لك أو لشخص يساعدك حول كيفية إستعمال الحقنة بشكل صحيح.

يجب قراءة 'تعليمات الإستعمال للحقن الذاتي' قبل أن تبدأ بإستعمال حقنة تزيبيلماب لأول مرة وقبل كل إستعمال. قد تكون هناك معلومات جديدة، المعلومات التي تظهر هنا لا تحل محل الحاجة إلى التحدث مع الطبيب المعالج حول حالتك الطبية أو علاجك.

إذا توفرت لديك أنت أو لدى الشخص الذي يساعدك أية أسئلة، فيجب التحدث مع الطبيب المعالج.

معلومات هامة يجب أن تعرفها قبل حقن تزيبيلماب

يجب تخزين تزيبيلماب في البراد في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية في العلبة الأصلية حتى تكون مستعداً للإستعمال. إذا دعت الحاجة، يمكن حفظ تزيبيلماب في العلبة الأصلية في درجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) لمدة أقصاها 30 يوماً. لا يجوز الإعادة إلى البراد بعد أن تم تخزين تزيبيلماب في درجة حرارة الغرفة. يجب التخلص من تزيبيلماب الذي تم تخزينه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من 30 يوماً (انظر المرحلة 10).

لا يجوز إستعمال محقنة ترسپاير الجاهزة للإستعمال إذا:

- تم تجميد المحقنة
- سقطت المحقنة أو تلتفت
- تلف ختم العبوة
- إنقضى تاريخ إنتهاء صلاحية الدواء.

لا يجوز خض المحقنة الجاهزة للإستعمال

لا يجوز المشاركة مع شخص آخر أو معاودة إستعمال المحقنة الجاهزة للإستعمال

لا يجوز تعريض المحقنة الجاهزة للإستعمال لمصدر حراري.

في حالة حدوث إحدى الحالات الموضحة أعلاه، يجب رمي المحقنة في حاوية مقاومة للأشياء الحادة ويجب إستعمال محقنة جديدة جاهزة للإستعمال.

تحتوي كل محقنة جاهزة للإستعمال من ترسپاير على مقدار دوائي واحد من ترسپاير للإستعمال لمرة واحدة فقط.

تجنب التسمم! يجب حفظ ترسپاير وكل دواء آخر بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.


يُعطى ترسپاير بالمحقن تحت الجلد فقط.

المحقنة الجاهزة للإستعمال


لا يجوز نزع غطاء الإبرة حتى تصل إلى المرحلة 7 من تعليمات الإستعمال هذه وتكون جاهزاً لحقن ترسپاير.

لا يجوز لمس مثبتات آلية حماية الإبرة، وذلك لتجنب تفعيلها أكر مما ينبغي.

قبل الإستعمال:



بعد الإستعمال:



إستعد لحقن ترسپاير

المرحلة 1 - تنظيف المعدات

- 1 محقنة ترسپاير جاهزة للإستعمال من البراد
- 1 ضمادة كحولية
- 1 قطن أو شاش
- 1 بلاستر صغير (ممكن)
- 1 حاوية مقاومة للأشياء الحادة (الرجاء أنظر المرحلة 10 - تخلص من المحقنة المستعملة)



المرحلة 2 - خض محقنة ترسپاير للإستعمال



ضع محقنة ترسپاير خارج البراد لمدة 60 دقيقة أو أكثر قبل الحقن (كحد أقصى 30 يوماً)، من أجل أن تسخن قليلاً وتبلغ درجة حرارة الغرفة (بين 20 إلى 25 درجة مئوية).

قم بإبقاء محقنة ترسپاير في علبة الكرتون لحمايتها من الضوء.


لا يجوز تسخين المحقنة بأي طريقة أخرى. على سبيل المثال، لا يجوز تسخينها في الميكروويف، بالماء الساخن، تحت الشمس المباشرة أو وضعها بالقرب من أية مصادر للحرارة.

لا تعيد محقنة ترسپاير إلى البراد بعد بلوغها درجة حرارة الغرفة. تخلص من محقنة ترسپاير إذا مكثت خارج البراد لأكثر من 30 يوماً.

لا يجوز نزع غطاء الإبرة حتى المرحلة 7.

المرحلة 3 - أخرج المحقنة الجاهزة للإستعمال من العبوة

أمسك جسم المحقنة (وليس المكبس) لإخراج المحقنة الجاهزة للإستعمال من اللوحة.



المرحلة 4 - إفحص المحقنة الجاهزة للإستعمال


تحقق من عدم تلف المحقنة الجاهزة للإستعمال. لا تستعمل المحقنة الجاهزة للإستعمال إذا كانت تالفة.

تحقق من تاريخ إنتهاء الصلاحية التي على المحقنة الجاهزة للإستعمال. لا تستعمل المحقنة الجاهزة للإستعمال إذا إنقضى تاريخ الصلاحية.

أنظر إلى السائل من خلال نافذة المشاهدة في المحقنة. يجب أن يكون السائل الموجود في المحقنة راتفاً وديم اللون أو مائلاً للأصفر.

لا تستعمل محقنة ترسپاير الجاهزة للإستعمال إذا كان السائل الموجود في المحقنة عكرًا، إذا كان لونه مختلفًا عن الموصوف أعلاه أو إذا كان يحتوي على جزيئات كبيرة.

قد تلاحظ فقاعات هواء صغيرة في السائل الموجود في المحقنة. هذا سليم. ليست هناك حاجة لفعل أي شيء حيال ذلك.



حقن ترسپاير

المرحلة 5 - إختَر أين تحقن ترسپاير

إذا كنت تحقن ترسپاير لنفسك، فإن موقع الحقن الموصى به هو الجزء الأمامي من فخذك أو الجزء الأسفل من بطنك. لا تحقن لنفسك في الذراع.

إذا تم إجراء الحقن من قبل شخص آخر فيمكنه حقنك في أعلى الذراع، في الفخذ أو في البطن. بالنسبة لكل عملية حقن، إختَر مكان حقن مختلف يبعد

3 سنتيمترات على الأقل عن مكان الحقن الأخير.

• لا تحقن في مسافة قدرها حتى 5 سنتيمترات من سرتك.

• لا تحقن في مكان يكون فيه الجلد حساساً، مرضوفاً، فيه ندبة أو قاسياً.

• لا تحقن على ندبة أو على جلد متضرر.

• لا تحقن عبر الملابس

المرحلة 6 - اغسل يديك ونظف مكان الحقن

اغسل يديك جيداً بالصابون والماء.

نظف منطقة الحقن بضمادة كحولية بحركات دائرية. دع المنطقة تجف في الهواء.

لا تلمس المنطقة التي نظفتها قبل الحقن.

لا تجفف المنطقة بالزفر عليها أو بأي وسيلة تهوية

المرحلة 7 - إنزع غطاء الإبرة

لا تنزع غطاء الإبرة حتى تكون جاهزاً للحقن.

أمسك جسم المحقنة بيد واحدة، وأسحب بحذر وبشكل مستقيم غطاء الإبرة بيدك الأخرى.

لا تمسك المكبس أو رأس المكبس عندما تقوم بنزع غطاء الإبرة.

ضع غطاء الإبرة جانباً للتخلص منه لاحقاً.

قد تلاحظ وجود قطرة سائل على طرف المحقنة، هذا سليم

لا تلمس الإبرة ولا تسمح للإبرة بلمس أي سطح.

لا تضع غطاء الإبرة مرة أخرى على المحقنة

المرحلة 8 - إحقن الدواء ترسپاير

أمسك المحقنة الجاهزة للإستعمال بيد واحدة كما هو موضح في الصورة:




إستعمل يدك الأخرى من أجل القرص برفق وممسك الجلد في منطقة الحقن، حيث ترغب في الحقن. تشكل هذه العملية منطقة صلبة مناسبة للحقن


لا تضغط على المكبس حتى يتم إدخال الإبرة بالكامل في الجلد.

لا تسحب رأس المكبس للخلف في أي مرحلة.


إتبع التعليمات المفصلة في الصور التالية 1، 2، و-3 من أجل حقن الدواء ترسپاير:



1. أدخل الإبرة بالكامل في الجلد المقروص بزاوية 45 درجة. لا تحاول تغيير وضعية المحقنة بعد إدخال الإبرة إلى الجلد.



2. ادفع رأس المكبس نحو الأسفل بواسطة إبهامك. إستمر في الدفع قدر الإمكان للتأكد من أنك تحقن كافة سائل الدواء.



3. إستمر في الضغط على رأس المكبس نحو الأسفل بإبهامك أثناء إخراج الإبرة من جلدك. حرر إبهامك ببطء من رأس المكبس، حتى يتم تغطية الإبرة بآلية حماية الإبرة.

المرحلة 9 - إفحص موقع الحقن

قد تلاحظ قليلاً من الدم أو السائل في موقع الحقن. هذا سليم. إضغط بلطف على مكان الحقن بالقطن أو الشاش حتى يتوقف النزف.

لا تفرح منطقة الحقن. إذا لزم الأمر، قم بتغطية موقع الحقن بواسطة بلاستر

التخلص من المحقنة

المرحلة 10 - تخلص من المحقنة المستعملة بأمان

تحتوي كل محقنة جاهزة للإستعمال من ترسپاير على مقدار دوائي واحد ولا يمكن معاودة إستعمالها مرة أخرى.

لا تقم بإعادة غطاء الإبرة مرة أخرى إلى الإبرة.

ضع المحقنة المستعملة وغطاء الإبرة في حاوية مقاومة للأشياء الحادة مباشرة

بعد الإستعمال. إرم المعدات الإضافية في سلة المهملات المنزلية.

لا يجوز التخلص من المحقنة المستعملة في سلة المهملات المنزلية.

تخلص من الحاوية المقاومة للأشياء الحادة وفقاً للتعليمات التي قدمها لك الطبيب أو الصيدلي.

لا ترم الحاوية المقاومة للأشياء الحادة، في القمامة المنزلية، إلا إذا كانت هذه هي الإرشادات الخاصة بمنطقة إقامتك.

لا تقم بإعادة تدوير الحاوية المقاومة للأشياء الحادة.

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.