

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986
يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

داساتينيب تارو 20 ملغ
داساتينيب تارو 50 ملغ
داساتينيب تارو 70 ملغ
داساتينيب تارو 80 ملغ
داساتينيب تارو 100 ملغ
داساتينيب تارو 140 ملغ
أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص مطلي على:

داساتينيب 20 ملغ، داساتينيب 50 ملغ، داساتينيب 70 ملغ، داساتينيب 80 ملغ، داساتينيب 100 ملغ، داساتينيب 140 ملغ.
dasatinib 20 mg, dasatinib 50 mg, dasatinib 70 mg, dasatinib 80 mg, dasatinib 100 mg,
dasatinib 140 mg

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية: أنظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

داساتينيب تارو غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال ولدى المراهقين دون عمر 18 سنة. هناك تجربة محدودة بالنسبة لاستعمال داساتينيب تارو لدى هذه الفئة العمرية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

داساتينيب تارو مخصص لمعالجة الكبار:

- المرضى الجدد الذين يعانون من مرض ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML) ذوي صبغي فيلادلفيا إيجابي، في المرحلة المزمنة.
- مرضى ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML) في المرحلة المزمنة، المتسارعة أو الأرومية الذين لديهم مقاومة أو عدم تحمل لعلاج سابق، بما في ذلك في حالة علاج سابق بـ imatinib mesilate.
- مرضى ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد (ALL) ذوي صبغي فيلادلفيا إيجابي ومرضى ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML) الأرومي الليمفاوي المنشأ والذين لديهم مقاومة أو عدم تحمل لعلاج سابق.

الفصيلة العلاجية: مثبطات بروتين كيناز.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة داساتينيب (dasatinib) أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء والمفصلة في البند 6 "معلومات إضافية".

إذا كان من المحتمل أن تكون حساساً، توجه إلى الطبيب للحصول على استشارة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يجب إبلاغ الطبيب المُعالج أو الصيدلي قبل العلاج بداساتينيب تارو إذا:

- كنت تتناول أدوية لتميع للدم أو لمنع تخثرات الدم (أنظر البند "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد أو في القلب.
- بدأت تعاني من صعوبات في التنفس، ألم في الصدر أو سعال أثناء العلاج بداساتينيب تارو، راجع الطبيب. قد تكون هذه علامة لاحتباس السوائل في الرئتين أو في الصدر (الذي قد يكون أكثر شيوعاً لدى متلقي العلاج بعمر 65 عاماً وما فوق) أو جراء تغييرات في الأوعية الدموية التي توصل الدم للرئتين.

- كان لديك أو يوجد لديك التهاب الكبد الفيروسي من نوع B. وذلك لأن داساتينيب تارو قد يؤدي إلى أن يتحول التهاب الكبد الفيروسي من نوع B (Hepatitis B) إلى فعال مرة أخرى، وأن يكون مميتاً في حالات معينة. يتم فحص المرضى بدقة من قبل الطبيب للكشف عن علامات لهذه العدوى قبل بدء العلاج.
- ظهرت كدمات، نزيف، سخونة، إرهاق وارتباك أثناء العلاج بـ داساتينيب تارو، راجع الطبيب. من المحتمل أن تكون هذه علامات ضرر في الأوعية الدموية، المعروفة باسم اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري [thrombotic microangiopathy (TMA)].

الأطفال والمراهقون

داساتينيب تارو ليس معداً لاستعمال الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاماً. توجد تجربة محدودة بخصوص استعمال داساتينيب تارو في هذه الفئة العمرية.

الفحوصات والمتابعة

سيقوم الطبيب بمتابعة حالتك بصورة منتظمة من أجل الفحص فيما إذا كان داساتينيب تارو يؤدي إلى التأثير المرغوب. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بإجراء فحوصات دم بشكل منتظم خلال تناول الدواء.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يتم التخلص من داساتينيب تارو بشكل رئيسي من قبل الكبد. قد تشوش أدوية معينة تأثير داساتينيب تارو إذا تم تناولها سوياً.

لا يجوز تناول الأدوية التالية سوياً مع داساتينيب تارو:

- كيتوكونازول وإيتراكونازول – أدوية مضادة للفطريات
- إريثروميسين، كلاريثروميسين وتليثروميسين – مضادات حيوية
- ريتونافير – دواء مضاد للفيروسات
- فينيتوين، كاربامازيبين، فينوباربيتال – لعلاج الصرع
- ريفامبيسين – علاج للسلس
- فاموتيدين وأوميبيرازول – أدوية مضادة للحموضة في المعدة
- St. John's wort – مستحضر على أساس نباتي لمعالجة الاكتئاب. (معروف أيضاً باسم عرن مثقوب).

لا يجوز تناول أدوية مضادة للحموضة في المعدة (مضادات الحموضة مثل هيدروكسيد الألومنيوم أو هيدروكسيد المغنيسيوم لمعالجة الحرقلة) في الساعتين ما قبل أو ما بعد تناول داساتينيب تارو.

أخبر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية لتميع الدم أو مضادات التخثر.

استعمال الدواء والغذاء

بالإمكان تناول الدواء مع طعام أو بدون طعام. لا يجوز تناول الدواء مع الجريب-فروت أو عصير الجريب-فروت.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنك قد تكونين حاملاً. أخبري الطبيب فوراً. لا يجوز تناول داساتينيب تارو خلال الحمل إلا إذا كان ذلك ضرورياً بصورة واضحة. سيتناقش معك الطبيب حول الخطورة المحتملة جراء تناول داساتينيب تارو خلال الحمل. يتوجب على الرجال والنساء الذين يتناولون داساتينيب تارو استشارة الطبيب حول استعمال وسائل منع حمل ناجعة، خلال فترة العلاج. إذا كنت مرضعة، أخبري الطبيب بذلك. يجب عليك التوقف عن الإرضاع أثناء تناول داساتينيب تارو.

السياقة واستعمال الماكينات

يجب توخي الحذر بشكل خاص أثناء السياقة أو استعمال ماكينات في حال كنت تشعر بأعراض جانبية مثل دوام ورؤية مشوشة.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي داساتينيب تارو على لاكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم قدرة تحمل لسكريات معينة، تشاور مع الطبيب قبل تناول الدواء.

يحتوي داساتينيب تارو على أقل من 23 ملغ صوديوم في القرص، ولذلك فإنه يعتبر عملياً خالٍ من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يتم وصف داساتينيب تارو لك فقط من قبل طبيب ذي تجربة في علاج اللوكيميا. يجب استعمال داساتينيب تارو دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. داساتينيب تارو معدّ للبالغين.

الجرعة وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب تناول الدواء بموجب الجرعة والفترة الزمنية التي حددت من قبل الطبيب. بحسب استجابتك للعلاج، سيقوم الطبيب بتبليغك إذا كانت هنالك ضرورة لجرعة أعلى أو أقل من داساتينيب تارو أو حتى إيقاف العلاج لفترة زمنية قصيرة. لجرعات أعلى أو أقل، من المحتمل أن تحتاج إلى تناول مزيج من أقراص بقوى مختلفة. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

يجب تناول داساتينيب تارو يوميًا إلى أن يعطيك الطبيب تعليمات بالتوقف. يجب عليك التأكد من أنك تتناول داساتينيب تارو طيلة المدة التي وُصفت لك.

يجب تناول الدواء في وقت محدد كل يوم.

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز سحق، شطر أو مضغ الأقراص (من أجل الحفاظ على ثبات الجرعة وتقليل خطر التعرض الجلدي). يُمنع إذابة الأقراص (لأن التعرض يكون أقل لدى متلقي العلاج الذين حصلوا على قرص مُذاب مقارنة بمتلقي العلاج الذين بلعوا القرص بأكمله). ليس بإمكانك أن تكون متأكدًا بأنك ستحصل على الجرعة الصحيحة إذا سحقته، شطرت، مضغته أو أذبت الأقراص.

بالإمكان تناول الدواء مع طعام أو بدون طعام. لا يجوز تناول الدواء مع الجريب-فروت أو عصير الجريب-فروت. إذا كنت تتناول أيضاً أدوية مضادة للحموضة (علاج الحرقة) مثل الأدوية التي تحتوي على هيدروكسيد الألومنيوم (Aluminium Hydroxide) أو هيدروكسيد المغنيسيوم (Magnesium Hydroxide) - فيجب تناول مضادات الحموضة قبل أو بعد ما لا يقل عن ساعتين من تناول داساتينيب تارو.

تعليمات علاجية خاصة لـ داساتينيب تارو:

من غير المحتمل أن تنكسر أقراص داساتينيب تارو. لكن إذا حدث ذلك، فيجب على الأشخاص الآخرين غير الشخص المتلقي للعلاج استعمال القفازات أثناء ملامسة داساتينيب تارو.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد، واستشر الطبيب. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

في حال توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! يجب فحص مُلصق الدواء والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، فإن استعمال داساتينيب تارو قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني من أيٍّ منها.

يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية التي يمكن أن تكون علامات لأعراض جانبية خطيرة:

- الشعور بالألم في الصدر، صعوبات في التنفس، سعال وإغماء.
- نزف غير متوقع أو يوجد لديك كدمات من دون أن تصاب.
- ظهور دم بالتقيؤ، في البراز أو في البول، أو ظهور براز أسود.
- ظهور علامات تلوث مثل سخونة وشعريرة شديتين.
- ظهور سخونة، ألم في الحنجرة أو الفم، حويصلات أو تقشر الجلد و/أو الأغشية المخاطية.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):

- **تلوثات** (وهذا يشمل تلوثات من مصدر جرثومي/ فيروسي وفطري).
- **القلب والرئتان:** ضيق تنفس.
- **مشاكل الهضم:** حالات إسهال، غثيان، تقيؤات.
- **الجلد، الشعر، العيون وأعراض عامة:** طفح في الجلد، سخونة، انتفاخ حول الوجه، اليدين والقدمين، صداع، الشعور بإرهاق أو ضعف، نزف.
- **ألم:** ألم في العضلات (أثناء العلاج أو بعد إيقاف العلاج)، ألم في البطن.
- **من شأن الفحوص أن تُبين:** انخفاض تعداد الصفيحات الدموية، انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء (neutropenia)، فقر الدم، سوانل حول الرئتين.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين):

- **تلوثات:** التهاب الرئتين (pneumonia)، تلوث فيروس الهربس (بما في ذلك عدوى الفيروس المضخم للخلايا – CMV)، تلوث في مجاري التنفس العلوية، تلوث خطير في الدم أو في الأنسجة (وهذا يشمل حالات غير شائعة ذات نتائج مميتة).
- **القلب والرئتان:** خفقان القلب، اضطرابات بنظم القلب، قصور القلب، ضعف عضلة القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم الرئوي، سعال.
- **مشاكل في الهضم:** اضطرابات في الشهية للطعام، اضطراب في حاسة الذوق، توسع أو انتفاخ في البطن، التهاب القولون، إمساك، حرقة، تفرحات في الفم، زيادة الوزن، انخفاض الوزن، التهاب المعدة.
- **الجلد، الشعر، العيون وأعراض عامة:** وخز في الجلد، حكة، جفاف الجلد، حب الشباب، التهاب في الجلد، ضجيج متواصل في الأذنين، تساقط الشعر، تعرق زائد، اضطراب في الرؤية (يشمل رؤية مشوشة ورؤية غير واضحة)، جفاف العين، كدمات، اكتئاب، أرق، تورّد، دوار، كدمات، فقدان الشهية للطعام، نعاس، وذمة شاملة.
- **ألم:** ألم في المفاصل، ضعف العضلات، ألم في الصدر، ألم في منطقة اليدين والقدمين، حالات قشعريرة، تصلب العضلات والمفاصل، تشنجات عضلية.
- **من شأن الفحوصات أن تُبين:** سوانل حول القلب، سوانل في الرئتين، اضطرابات في نظم القلب، قلة العدلات الحُموية، نزف في الجهاز الهضمي، ارتفاع نسب حمض اليوريك في الدم.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل):

- **القلب والرئتان:** نوبة قلبية (وهذا يشمل نتائج مميتة)، التهاب الغشاء المخاطي (fibrous sack) الذي يحيط بالقلب، عدم انتظام نظم القلب، ألم في الصدر بسبب نقص في تزويد الدم للقلب (ذبحة)، ضغط دم منخفض، تضيق المجاري التنفسية والذي قد يؤدي إلى صعوبات تنفس، ربو، ضغط دم متزايد في شرايين الرئتين، تخثرات دموية.
- **مشاكل في الهضم:** التهاب البنكرياس، قرحة معدية، التهاب في المريء، انتفاخ البطن، تمزق في جلد القناة الشرجية، صعوبة في البلع، التهاب المرارة، انسداد القنوات الصفراوية، ارتجاع معدي مريئي (reflux) (وهي حالة تعود فيها الأحماض وباقى محتويات المعدة إلى داخل الحلق).
- **الجلد، الشعر، العيون وأعراض عامة:** رد فعل تحسسي يشمل كتل حمراء وحساسية على الجلد (حمامى عقدة - erythema nodosum)، قلق، ارتباك، تغيرات في المزاج، انخفاض في الرغبة الجنسية، إغماء، رجفة، التهاب العين الذي يسبب احمراراً أو ألماً، مرض جلدي يتميز ببقع حمراء، حساسية، واضحة جيداً مصحوبة بظهور مفاجئ لسخونة وارتفاع في تعداد خلايا الدم البيضاء (neutrophilic dermatosis)، فقدان السمع، حساسية للضوء، خلل في الرؤية، إفراز زائد للدمع، تغير لون الجلد، التهاب النسيج الشحمي تحت الجلد، تقرح الجلد، حويصلات في الجلد، تغيير في الأظافر، تغيير في الشعر، متلازمة اليد والقدم (hand-foot disorder)، قصور كلوي، تكرار التبول، تضخم الثديين لدى الرجال، اضطراب في الطمث، ضعف وانزعاج عام، قصور الغدة الدرقية، فقدان التوازن أثناء المشي، نخر (هشاشة) العظم (osteonecrosis) – مرض تدفق دم منخفض للعظام، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان وموت العظم)، التهاب المفاصل، انتفاخ الجلد بأماكن مختلفة من الجسم.
- **ألم:** التهاب وريدي قد يسبب احمراراً، حساسية وانتفاخ، التهاب الوتر.
- **الدماغ:** فقدان الذاكرة.
- **من شأن الفحوصات أن تُبين:** نتائج فحوصات دم غير سليمة ومن المحتمل أن يكون هناك خلل في الأداء الوظيفي للكلية نتيجة لإبعاد فضلات الورم (tumour lysis syndrome)، نسب منخفضة من الألبومين في الدم، نسب منخفضة من اللمفاويات (نوع من خلايا الدم البيضاء) في الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، انتفاخ الغدة للمفاوية، نزف دماغي، عدم انتظام النشاط الكهربائي للقلب، تضخم القلب، التهاب الكبد، بروتين في البول، ارتفاع إنزيم كرياتينين فوسفوكيناز (إنزيم موجود بشكل رئيسي في القلب، في الدماغ، وفي عضلات الهيكل العظمي)، ارتفاع التروپونين (إنزيم موجود بشكل رئيسي في الأنسجة مثل عضلة القلب وعضلات الهيكل العظمي)، ارتفاع جاما - جلوتاميل - ترانسفيراز (إنزيم موجود بشكل رئيسي في الكبد)، ظهور سوانل تشبه شكل الحليب حول الرئتين (chylothorax).

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل):

- القلب والرئتان: تضخم البطين الأيمن للقلب، التهاب عضلة القلب، حالات مختلفة تحدث نتيجة انسداد في تزويد الدم لعضلة القلب (acute coronary syndrome)، سكتة قلبية (توقف تدفق الدم من القلب)، مرض قلبي تاجي، التهاب النسيج الذي يغلف القلب والرئتين، خثرات دموية (في الأوردة العميقة)، خثرات دموية في الرئتين.
- مشاكل في الهضم: فقدان مواد مغذية ضرورية مثل البروتين من جهاز الهضم، انسداد الأمعاء، ناسور في فتحة الشرج (فتحة غير سليمة في فتحة الشرج باتجاه الجلد المحيط لفتحة الشرج)، تضرر وظائف الكلى، سكري.
- الجلد، الشعر، العيون وأعراض عامة: تشنجات، التهاب عصب الرؤية الذي قد يؤدي لفقدان كامل أو جزئي للرؤية، لون الجلد مائل إلى الأزرق - مائل إلى البنفسجي، فرط نشاط الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية، الرّيح (اضطراب في التناسق الحركي)، صعوبة المشي، إجهاض، التهاب الأوعية الدموية في الجلد، ندبة ليفية في الجلد.
- الدماغ: سكتة دماغية، اختلال مؤقت في الأداء الوظيفي العصبي نتيجة خلل في تدفق الدم، شلل في عصب الوجه، خرف (dementia).
- الجهاز المناعي: ردّة فعل تحسّسية خطيرة.

أعراض جانبية إضافية نسبة شيوعها غير معروفة (لا يمكن تقديرها من المعلومات الموجودة):

- التهاب الرئتين.
- نزيف في المعدة أو في الأمعاء قد يؤدي للوفاة.
- تكرار (Reactivation) التلوث بفيروس التهاب الكبد B، إذا عانيت من فيروس التهاب الكبد B في الماضي (تلوث في الكبد).
- رد فعل مصحوب بسخونة، حوصلات على الجلد وتقرح الأنسجة المخاطية.
- مرض كلي مع أعراض تشمل وذمة ونتائج فحوصات مخبرية غير عادية مثل وجود بروتين في البول ومستوى بروتين منخفض في الدم.
- ضرر في الأوعية الدموية المعروف باسم اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري [thrombotic microangiopathy (TMA)]، الذي يشمل انخفاض في تعداد كريات الدم الحمراء، انخفاض في الصفائح وتكوّن تخثرات دموية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي"، الموجود على الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب الحفظ في درجة حرارة دون الـ 25°C.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو القمامة. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, film coating consisting of hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide (E171), triacetin.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

داساتينيب تارو 20 ملغ:

قرص مطلي مستدير، محدد من الجانبين، لونه أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي) قطره حوالي 6 ملم. مطبوع على القرص "D7SB" من جانب واحد و- "20" من الجانب الثاني.

داساتينيب تارو 50 ملغ:

قرص مطلي بيضوي، محدب من الجانبين، لونه أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي) طوله حوالي 11 ملم وعرضه حوالي 6 ملم. مطبوع على القرص "D7SB" من جانب واحد و- "50" من الجانب الثاني.

داساتينيب تارو 70 ملغ:

قرص مطلي مستدير، محدب من الجانبين، لونه أبيض حتى أوف وايت (أبيض مائل للرمادي) قطره حوالي 9 ملم. مطبوع على القرص "D7SB" من جانب واحد و- "70" من الجانب الثاني.

داساتينيب تارو 80 ملغ:

قرص مطلي مثلث، محدب من الجانبين، لونه أبيض حتى أوف وايت (أبيض مائل للرمادي) طوله حوالي 10 ملم وعرضه حوالي 11 ملم. مطبوع على القرص "D7SB" من جانب واحد و- "80" من الجانب الثاني.

داساتينيب تارو 100 ملغ:

قرص مطلي بيضوي، محدب من الجانبين، لونه أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي) طوله حوالي 15 ملم وعرضه حوالي 7 ملم. مطبوع على القرص "D7SB" من جانب واحد و- "100" من الجانب الثاني.

داساتينيب تارو 140 ملغ:

قرص مطلي مستدير، محدب من الجانبين، لونه أبيض حتى أوف وايت (أبيض مائل للرمادي) قطره حوالي 12 ملم. مطبوع على القرص "D7SB" من جانب واحد و- "140" من الجانب الثاني.

يتم تسويق داساتينيب تارو 20 ملغ، 50 ملغ، 70 ملغ بعبوة تحتوي على 60 قرصا.
يتم تسويق داساتينيب تارو 80 ملغ، 100 ملغ، 140 ملغ بعبوة تحتوي على 30 قرصا.
قد لا تُسوّق جميع تراكيز المستحضر.

صاحب التسجيل وعنوانه: تارو إنترناشيونال م.ض.، شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761.

اسم المنتج وعنوانه: Synthon Hispania, S.L., C/ Castello, 1,08830 Sant Boi de Llobregat, .
Barcelona, Spain

تمّ تحرير هذه النشرة في كانون الأول 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

داساتينيب تارو 20 ملغ: 168-32-36363-00

داساتينيب تارو 50 ملغ: 168-33-36364-00

داساتينيب تارو 70 ملغ: 168-34-36365-00

داساتينيب تارو 80 ملغ: 168-35-36366-00

داساتينيب تارو 100 ملغ: 168-36-36367-00

داساتينيب تارو 140 ملغ: 168-37-36368-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.