

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

דסטיניב תרו 20 מ"ג
דסטיניב תרו 50 מ"ג
דסטיניב תרו 70 מ"ג
דסטיניב תרו 80 מ"ג
דסטיניב תרו 100 מ"ג
דסטיניב תרו 140 מ"ג
טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבלייה מצופה מכילה:

דסטיניב 20 מ"ג, דסטיניב 50 מ"ג, דסטיניב 70 מ"ג, דסטיניב 80 מ"ג, דסטיניב 100 מ"ג, דסטיניב 140 מ"ג
dasatinib 20 mg, dasatinib 50 mg, dasatinib 70 mg, dasatinib 80 mg, dasatinib 100 mg,
dasatinib 140 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

דסטיניב תרו אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. קיים ניסיון מצומצם לגבי שימוש בדסטיניב תרו בקבוצת גיל זו.

1. למה מיועדת התרופה?

דסטיניב תרו מיועדת לטיפול במבוגרים:

- חולים חדשים הסובלים מלויקמיה מיאלואידית כרונית (CML) בעלי כרומוזום פילדלפיה חיובי, בשלב הכרוני.
- חולי לויקמיה מיאלואידית כרונית (CML) בשלב כרוני, מואץ או בלסטי לבעלי עמידות או אי-סבילות לטיפול קודם, כולל במקרה של טיפול קודם ב-imatinib mesilate.
- חולי לויקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL) בעלי כרומוזום פילדלפיה חיובי וחולי לויקמיה מיאלואידית כרונית (CML) בלסטית לימפואידית בעלי עמידות או אי-סבילות לטיפול קודם.

קבוצה תרפויטית: מעכבי פרטאין קינאז.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (dasatinib) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה המפורטים בפרק 6 "מידע נוסף".

אם ייתכן שאתה אלרגי, פנה לרופא לייעוץ.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

יש ליידע את הרופא המטפל או הרוקח לפני הטיפול בדסטיניב תרו אם:

- אתה נוטל תרופות לדילול הדם או למניעת קרישי דם (ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").
- יש לך או היו לך בעיות בכבד או בלב.
- אתה מתחיל לסבול מקשיי נשימה, כאב בחזה או שיעול בזמן הטיפול בדסטיניב תרו, פנה לרופא. זה עלול להיות סימן לאצירת נוזלים בריאות או בחזה (אשר יכול להיות נפוץ יותר במטופלים בגיל 65 ומעלה) או עקב שינויים בכלי הדם המובילים דם לריאות.
- הייתה לך או יש לך דלקת כבד נגיפית מסוג B (הפטיטיס B). זאת כיוון שדסטיניב תרו עלולה לגרום להפטיטיס B להפוך שוב לפעילה, ולהיות קטלנית במקרים מסוימים. מטופלים ייבדקו בקפידה על ידי הרופא לאיתור סימנים של זיהום זה לפני התחלת הטיפול.

- הופיעו חבורות, דימום, חום, תשישות ובלבול בזמן הטיפול בדסטיניב תרו, פנה לרופא. ייתכן שמדובר בסימנים של נזק לכלי דם הידוע כמיקרואנגיופתיה תרומבוטית [thrombotic microangiopathy (TMA)].

ילדים ומתבגרים

דסטיניב תרו אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. קיים ניסיון מצומצם לגבי שימוש בדסטיניב תרו בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב

הרופא יעקוב באופן סדיר אחר מצבך על מנת לבדוק אם דסטיניב תרו גורמת להשפעה הרצויה. בנוסף, תעבור בבדיקות דם באופן סדיר במהלך נטילת התרופה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

דסטיניב תרו מפונה בעיקר על ידי הכבד. תרופות מסוימות עלולות להפריע להשפעתה של דסטיניב תרו אם ניטלות יחד.

אין ליטול את התרופות הבאות יחד עם דסטיניב תרו:

- קטוקונאזול ואיטרקונאזול – תרופות אנטי-פטרייתיות
- אריתרומיצין, קלריתרומיצין וטליתרומיצין – אנטיביוטיקות
- ריטונאביר – תרופה אנטי-ויראלית
- פניטואין, קרבמזפין, פנוברביטל – לטיפול באפילפסיה
- ריפמיציין – טיפול לשחפת
- פמוטידין ואומפרזול – תרופות נוגדות חומצה בקיבה
- St. John's wort – תכשיר על בסיס צמחי לטיפול בדיכאון (ידוע גם בשם היפריקום פרפורטום)

אין ליטול תרופות שסותרות את החומצה בקיבה (נוגדי חומצה כגון אלומיניום הידרוקסיד או מגנזיום הידרוקסיד לטיפול בצרבת) בשעתיים שלפני או בשעתיים שאחרי נטילת דסטיניב תרו.

ספר לרופא אם אתה לוקח תרופות לדילול הדם או נוגדי קרישה.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לקחת את התרופה עם אוכל או ללא אוכל.
אין ליטול את התרופה עם אשכוליות או מיץ אשכוליות.

היריון והנקה

אם את בהריון או חושבת שאת עשויה להיות בהריון, ספרי לרופא מייד.
אין ליטול דסטיניב תרו במהלך ההריון אלא אם הכרחי באופן מפורש. הרופא ידון איתך לגבי הסיכון האפשרי בנטילת דסטיניב תרו במהלך ההריון.

על גברים ונשים הנוטלים דסטיניב תרו להיוועץ ברופא באשר לשימוש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול.
אם את מניקה, ספרי לרופא. עלייך להפסיק את ההנקה בזמן נטילת דסטיניב תרו.

נהיגה ושימוש במכונות

יש להיזהר במיוחד בנהיגה או בשימוש במכונות במקרה שאתה חווה תופעות לוואי כגון סחרחורת וראייה מטושטשת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

דסטיניב תרו מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
דסטיניב תרו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן לטבלטייה ועל כן נחשבת למעשה נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

דסטיניב תרו תירשם לך רק על ידי רופא שמנוסה בטיפול בלוקמיה. יש להשתמש בדסטיניב תרו תמיד לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. דסטיניב תרו מיועדת למבוגרים.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

יש ליטול את התרופה בהתאם למינון ופרק הזמן שנקבעו על ידי הרופא. בהתאם לתגובתך לטיפול, הרופא יעדכן אותך אם נדרש מינון גבוה יותר או נמוך יותר של דסטיניב תרו או אף הפסקה של הטיפול לפרק זמן קצר. למינונים גבוהים יותר או נמוכים יותר, ייתכן שתצטרך ליטול שילובים של טבליות בחוזקים שונים. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

משך הטיפול

יש ליטול דסטיניב תרו כל יום עד שהרופא ינחה אותך להפסיק. עליך לוודא שאתה נוטל דסטיניב תרו למשך כל הזמן שנרשם עבורך.

יש ליטול את התרופה בזמן קבוע כל יום.

יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אין לכתוש, לחצות או ללעוס את הטבליות (על מנת לשמור על עקביות המינון ולהפחית את הסיכון לחשיפה עורית). אין להמיס את הטבליות (כיוון שבמטופלים שקיבלו טבלייה שהומסה החשיפה נמוכה לעומת מטופלים שבלעו את הטבלייה בשלמותה). אינך יכול להיות בטוח שתקבל את המנה הנכונה אם תכתוש, תחצה, תלעס או תמיס את הטבליות.

ניתן לקחת את התרופה עם אוכל או ללא אוכל. אין ליטול את התרופה עם אשכוליות או מיץ אשכוליות. אם אתה נוטל גם תרופות סותרות חומצה (טיפול בצרבת) כגון תרופות המכילות אלומיניום הידרוקסיד או מגנזיום הידרוקסיד – יש ליטול את סותרי החומצה לא פחות משעתיים לפני או שעתיים אחרי דסטיניב תרו.

הוראות טיפול מיוחדות לדסטיניב תרו:

לא סביר שטבליות של דסטיניב תרו יישברו. אך אם זה קורה, על אנשים אחרים שאינם המטופל להשתמש בכפפות בזמן מגע בדסטיניב תרו.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדסטיניב תרו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מייד לרופא אם מופיעות התופעות הבאות אשר יכולות להיות סימנים של תופעות לוואי חמורות:

- הופעת כאב בחזה, קשיי נשימה, שיעול והתעלפות.
- **דימום בלתי צפוי או שיש לך חבלות** מבלי שנפצעת.
- הופעת דם בקיא, בצואה או בשתן או הופעה של צואה שחורה.
- הופעת **סימני זיהום** כמו חום וצמרמורת חמורות.
- הופעת חום, כאב גרון או פה, שלפוחיות או קילוף של העור ו/או הריריות.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר מ-1 מתוך 10 משתמשים):

- **זיהומים** (כולל זיהומים ממקור חיידקי, ויראלי ופטרייתי).
- **לב וריאות:** קוצר נשימה.
- **בעיות עיכול:** שלשולים, בחילות, הקאות.
- **עור, שיער, עיניים, כללי:** פריחה בעור, חום, נפיחות סביב הפנים, הידיים וכפות הרגליים, כאב ראש, תחושת עייפות או חולשה, דימום.
- **כאב:** כאב בשרירים (בזמן הטיפול או אחרי הפסקת הטיפול), כאב בטן.
- **בדיקות עשויות להראות:** ספירת תאי דם נמוכה, ספירת תאי דם לבנים נמוכה (נויטרופניה), אנמיה, נוזלים סביב הריאות.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות בעד 1 מתוך 10 משתמשים):

- **זיהומים:** דלקת ריאות (pneumonia), זיהום של וירוס ההרפס (כולל ציטומגלו-וירוס - CMV), זיהום בדרכי הנשימה העליונות, זיהום חמור בדם או ברקמות (כולל מקרים לא שכיחים עם תוצאות קטלניות).
- **לב וריאות:** דפיקות לב, הפרעות בקצב הלב, אי ספיקת לב, חולשה בשריר הלב, לחץ דם גבוה, יתר לחץ דם ריאתי, שיעול.
- **בעיות עיכול:** הפרעות בתיאבון, הפרעה בחוש הטעם, התרחבות או נפיחות בבטן, דלקת של המעי הגס, עצירות, צרבת, כיבים בפה, עלייה במשקל, ירידה במשקל, דלקת הקיבה.
- **עור, שיער, עיניים, כללי:** עקצוץ בעור, גירוד, עור יבש, אקנה, דלקת בעור, רעש מתמשך באוזניים, נשירת שיער, הזעה מוגברת, הפרעה בראייה (כולל ראייה מטושטשת וראייה משובשת), עין יבשה, חבורות, דיכאון, נדודי שינה, הסמקה, סחרחורת, חבלות, אנורקסיה, ישנוניות, בצקת כללית.
- **כאב:** כאב במפרקים, חולשת שרירים, כאב בחזה, כאב באזור הידיים וכפות הרגליים, צמרמורות, נוקשות שרירים ומפרקים, התכווצות שרירים.
- **בדיקות עשויות להראות:** נוזלים סביב הלב, נוזלים בריאות, הפרעות בקצב הלב, נויטרופניה פיברילית, דימום במערכת העיכול, רמות חומצה אורית גבוהות בדם.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות בעד 1 מתוך 100 משתמשים):

- **לב וריאות:** התקף לב (כולל תוצאות קטלניות), דלקת הרירית (fibrous sack) המקיפה את הלב, קצב לב לא סדיר, כאב בחזה בשל חוסר אספקת דם ללב (אנגינה), לחץ דם נמוך, היצרות דרכי הנשימה אשר עלולה לגרום לקשיי נשימה, אסתמה, לחץ דם מוגבר בעורקי הריאות, קרישי דם.
- **בעיות עיכול:** דלקת של הבלב, כיב פפטי, דלקת בוושט, בטן נפוחה, קרע בעור של התעלה האנאלית, קושי בבליעה, דלקת של כיס המרה, חסימה של תעלות כיס המרה, החזר קיבתי-ושטי (ריפלוקס) (מצב שבו החומצה ושאר תוכן הקיבה חוזרים אל תוך הגרון).
- **עור, שיער, עיניים, כללי:** תגובה אלרגית כולל צברים אדומים ורגישים על העור (erythema nodosum), חרדה, בלבול, שינויים במצב הרוח, ירידה בדחף המיני, עילפון, רעד, דלקת של העין שגורמת לאדמומיות או לכאב, מחלת עור המתאפיינת בכתמים אדומים, רגישים, מוגדרים היטב המלווים בהתפרצות פתאומית של חום וספירת תאי דם לבנים גבוהה (neutrophilic dermatosis), אובדן שמימה, רגישות לאור, ליקוי ראייה, הפרשה מוגברת של דמעות, שינוי בצבע העור, דלקת ברקמת השומן מתחת לעור, כיב בעור, שלפוחיות בעור, שינוי בציפורניים, שינוי בשיער, תסמונת יד-רגל (hand-foot disorder), אי ספיקת כליות, תכיפות במתן שתן, הגדלת שדיים אצל גברים, הפרעה בווסת, חולשה ואי נוחות כללית, תת פעילות בלוטת התריס, איבוד שיווי משקל בזמן הליכה, נמק העצם (osteonecrosis) – מחלה של זרימת דם מופחתת לעצמות, אשר עלולה לגרום לאובדן ולמות העצם), דלקת מפרקים, נפיחות בעור במקומות שונים בגוף.
- **כאב:** דלקת ורידית העלולה לגרום לאדמומיות, רגישות ונפיחות, דלקת של הגיד.
- **מוח:** אובדן זיכרון.
- **בדיקות עשויות להראות:** תוצאות בדיקת דם לא תקינות וייתכן תפקוד כליות לקוי הנגרם מפניו חומרי הפסולת של הגידול (tumour lysis syndrome), רמות נמוכות של אלבומין בדם, רמות נמוכות של לימפוציטים (סוג של תאי דם לבנים) בדם, רמה גבוהה של כולסטרול בדם, בלוטות לימפה נפוחות, דימום במוח, אי סדירות בפעילות החשמלית של הלב, לב מוגדל, דלקת של הכבד, חלבון בשתן, עלייה באנזים קריאטיין פוספוקינאז (אנזים שנמצא בעיקר בלב, במוח ובשרירי השלד), עלייה בטרופונין (אנזים שנמצא בעיקר ברקמות כגון שריר הלב ושריר השלד), עלייה בגאמא-גלובולין-טרנספראז (אנזים שנמצא בעיקר בכבד), הופעת נוזלים במראה חלבי מסביב לריאות (chylothorax).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות בעד 1 מתוך 1,000 משתמשים):

- **לב וריאות:** הגדלה של חדר הלב הימני, דלקת של שריר הלב, מצבים שונים הנוצרים כתוצאה מחסימה של אספקת דם לשריר הלב (acute coronary syndrome), דום לב (הפסקה של זרימת הדם מהלב), מחלת לב כללית, דלקת של הרקמה המכסה את הלב והריאות, קרישי דם (בוורידים עמוקים), קרישי דם בריאות.
- **בעיות עיכול:** אובדן של חומרי תזונה חיוניים כמו חלבון ממערכת העיכול, חסימת מעיים, פיסטולה בפי הטבעת (פתח לא תקין מפי הטבעת אל העור שמסביב לפי הטבעת), פגיעה בתפקודי כליות, סוכרת.
- **עור, שיער, עיניים, כללי:** עוויתות, דלקת של עצב הראייה העלולה לגרום לאובדן מלא או חלקי של הראייה, גוון כחלחל-סגלגל של העור, פעילות יתר של בלוטת התריס, דלקת בלוטת התריס, אטקסיה (הפרעה בקואורדינציה), קושי בהליכה, הפלה, דלקת של כלי דם בעור, צלקת פיברוטית בעור.
- **מוח:** שבץ, חוסר תפקוד נויורולוגי זמני כתוצאה מזרימת דם לקויה, שיתוק בעצב הפנים, שיטיון (דמנציה).
- **מערכת החיסון:** תגובה אלרגית חמורה.

תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן להעריך מהמידע הקיים):

- דלקת ריאות.
- דימומים בקיבה או במעיים העלולים לגרום למוות.

- הישנות (ריאקטיבציה) של זיהום בנגיף הפטיטיס B, אם היה לך הפטיטיס B בעבר (זיהום בכבד).
- תגובה עם חום, שלפוחיות על העור והתכייבות רקמות ריריות.
- מחלת כליות עם תסמינים הכוללים בצקת ותוצאות בדיקות מעבדה חריגות כגון חלבון בשתן ורמת חלבון נמוכה בדם.
- נזק לכלי דם הידוע כמיקרואנגיופטיה תרומבוטית [thrombotic microangiopathy (TMA)], כולל ירידה בספירת כדוריות דם אדומות, ירידה בטסיות והיווצרות של קרישי דם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

- יש לאחסן מתחת ל-25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, film coating consisting of hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide (E171), triacetin.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

דסטיניב תרו 20 מ"ג:

טבלייה מצופה עגולה, קמורה משני צדדיה, בצבע לבן עד אוף-ווייט (לבן אפרפר) בקוטר של כ-6 מ"מ. הטבלייה מוטבעת עם "D7SB" בצד אחד ו-"20" בצידה השני.

דסטיניב תרו 50 מ"ג:

טבלייה מצופה אובאלית, קמורה משני צדדיה, בצבע לבן עד אוף-ווייט (לבן אפרפר) באורך של כ-11 מ"מ ורוחב של כ-6 מ"מ. הטבלייה מוטבעת עם "D7SB" בצד אחד ו-"50" בצידה השני.

דסטיניב תרו 70 מ"ג:

טבלייה מצופה עגולה, קמורה משני צדדיה, בצבע לבן עד אוף-ווייט (לבן אפרפר) בקוטר של כ-9 מ"מ. הטבלייה מוטבעת עם "D7SB" בצד אחד ו-"70" בצידה השני.

דסטיניב תרו 80 מ"ג:

טבלייה מצופה משולשת, קמורה משני צדדיה, בצבע לבן עד אוף-ווייט (לבן אפרפר) באורך של כ-10 מ"מ וברוחב של כ-11 מ"מ. הטבלייה מוטבעת עם "D7SB" בצד אחד ו-"80" בצידה השני.

דסטיניב תרו 100 מ"ג:

טבלייה מצופה אובאלית, קמורה משני צדדיה, בצבע לבן עד אוף-ווייט (לבן אפרפר) באורך של כ-15 מ"מ וברוחב של כ-7 מ"מ. הטבלייה מוטבעת עם "D7SB" בצד אחד ו-"100" בצידה השני.

דסטיניב תרו 140 מ"ג:

טבלייה מצופה עגולה, קמורה משני צדדיה, בצבע לבן עד אוף-ווייט (לבן אפרפר) בקוטר של כ-12 מ"מ. הטבלייה מוטבעת עם "D7SB" בצד אחד ו-"140" בצידה השני.

דסטיניב תרו 20 מ"ג, 50 מ"ג, 70 מ"ג משווקים באריזות המכילות 60 טבליות.
דסטיניב תרו 80 מ"ג, 100 מ"ג, 140 מ"ג משווקים באריזות המכילות 30 טבליות.
ייתכן שלא כל חוזקי התכשיר משווקים.

בעל הרישום וכתובתו: תרו אינטרנשיונל בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761

שם היצרן וכתובתו:

Synthon Hispania, S.L., C/ Castello, 1,08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain

עלון זה נערך בדצמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספרי רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

דסטיניב תרו 20 מ"ג: 168-32-36363-00

דסטיניב תרו 50 מ"ג: 168-33-36364-00

דסטיניב תרו 70 מ"ג: 168-34-36365-00

דסטיניב תרו 80 מ"ג: 168-35-36366-00

דסטיניב תרו 100 מ"ג: 168-36-36367-00

דסטיניב תרו 140 מ"ג: 168-37-36368-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה מנוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.