

بُسُوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

دفيراسيروكس تيفع 125 ملغ

دفيراسيروكس تيفع 250 ملغ

دفيراسيروكس تيفع 500 ملغ

أقراص ذوابية

كل قرص ذواب يحتوي على:

ديفيراسيروكس 125 ملغ Deferasirox 125 mg

ديفيراسيروكس 250 ملغ Deferasirox 250 mg

ديفيراسيروكس 500 ملغ Deferasirox 500 mg

لمعلومات حول المركبات غير الفعالة والمثيرة للحساسية: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" وكذلك البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وُصف لعلاج مريضك أو لعلاج طفلك/طفلتك. لا تعطه للأخرين. لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مريضك ومرضهم.

1. لِمَ أعدَ هذا الدواء؟

- لعلاج فرط تحميل الحديد المزمن (Iron Overload) الناتج عن نقل الدم، لدى الكبار ولدى الأطفال (من جيل سنتين وما فوق).
- لعلاج فرط تحميل الحديد المزمن غير المرتبط بنقل الدم لدى مرضى التلاسيميا (فقر دم منطقة البحر الأبيض المتوسط) من جيل 10 سنوات وما فوق.

المجموعة العلاجية: من مستخلبات الحديد (Iron chelating agent)

تكون عمليات نقل الدم المتكررة مطلوبة أحياناً لدى مرضى يعانون من أنواع معينة من فقر الدم مثل التلاسيميا، فقر الدم المنجلي ومتلازمة خلل التنسج نخاعي (myelodysplastic syndrome, [MDS]). لكن، عمليات نقل الدم المتكررة قد تسبب تراكم فائض من الحديد. هذا لأن الدم يحتوي على الحديد ولا توجد طريقة طبيعية للتخلص من فائض الحديد الذي يتم الحصول عليه مع عمليات نقل الدم.

لدى مرضى التلاسيميا غير المتعلقين بتسريبات الدم، قد يتطور فائض من الحديد بمرور الزمن خاصةً جراء امتصاص زائد للحديد من الطعام كرد فعل لتعداد منخفض لخلايا الدم.

إن فائض الحديد مع مرور الزمن يمكن أن يسبب ضرراً لأعضاء حيوية مثل الكبد والقلب.

أدوية من نوع iron chelators (مستخلبات الحديد) تستعمل للتخلص من فائض الحديد وتقلل خطورة حدوث ضرر لأعضاء الجسم. ديفيراسيروكس تيفع يسك ويطرده فائض الحديد حيث يُطرح لاحقاً في البراز بشكل أساسي.

2. قِبلَ استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجي) لـ ديفيراسيروكس (Deferasirox) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء التي تظهر في البند 6 "معلومات إضافية". أخبر الطبيب قبل تناول ديفيراسيروكس تيفع إذا كان هذا الأمر ينطبق عليك. إذا كنت تعتقد بأن لديك حساسية، استشر الطبيب.
- كان لديك مرض كلوي متوسط أو شديد.
- كنت تتناول حالياً دواء آخر من نوع Iron chelator (مستخلبات الحديد).

لا يوصى باستخدام ديفيراسيروكس تيفع إذا

- وجدت لديك متلازمة خلل التنسج النخاعي (MDS): انخفاض إنتاج خلايا الدم من قِبل نخاع العظمي) بمرحلة متقدمة أو سرطان مقدم

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

قبل العلاج بـ ديفيراسيروكس تيفع، أخبر الطبيب إذا:

- كان لديك مشكلة في الكبد أو في الكلى.
- كنت تعاني من مشكلة في القلب ناتجة عن فائض الحديد.
- كنت تلاحظ تناقص ملحوظ في التبول (علامة لمشكلة في الكلى).
- كان لديك طفح شديد أو صعوبات في التنفس ودوار أو انتفاخ خاصة في الوجه والحنجرة (علامات لرد فعل تحسسي خطير، انظر أيضاً البند 4 "الأعراض الجانبية").
- كان لديك مزيج من أي من الأعراض التالية: طفح، احمرار في الجلد، حويصلات على الشفتين، العينين أو الفم، تقشر الجلد، سخونة مرتفعة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تضخم العقد الليمفاوية (علامات لرد فعل جلدي خطير، انظر أيضاً البند 4 "الأعراض الجانبية").
- كنت تشعر بمزيج من نعاس، ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، اصفرار أو زيادة اصفرار الجلد والعينين وبول داكن (علامات لمشاكل في الكبد).
- كنت تعيش صعوبات في التفكير، في تذكر المعلومات أو حل المشاكل، تشعر بأنك أقل يقظة أو إدراكاً للمحيط، أو تشعر بأن لديك ميل شديد للنوم يتراقق بقلّة الحيوية (علامات لارتفاع مستوى الأمونيا في الدم، الأمر الذي من شأنه أن يكون ذو علاقة بمشاكل في الكبد أو الكلى، انظر أيضاً البند 4 "الأعراض الجانبية").
- كنت تتقيأ دم و/أو لديك براز أسود.
- كان لديك ألم متكرر في البطن، خاصة بعد تناول الطعام أو تناول ديفيراسيروكس تيفع.
- كان لديك حالات حرقان متكررة.
- كان لديك تعداد منخفض للصفائح الدموية أو خلايا الدم البيضاء في فحوص الدم.
- كان لديك تشوش في الرؤية.
- كان لديك إسهال أو حالات تقيؤ.

في حال كانت إحدى تلك الحالات تطبق عليك، أخبر لطبيبك حالاً.

فئة كبار السن (بعض 65 سنة وما فوق)

يمكن للأشخاص البالغين بعمر 65 سنة وما فوق استعمال نفس الجرعة الدوائية من ديفيراسيروكس تيفع كيفية البالغين. قد يعايش المتعالجون المسنون أعراضاً جانبية أكثر (خاصة إسهال) من المتعالجين الأصغر سناً. يجب أن نكونوا تحت المراقبة الحثيثة من قبل الطبيب لتحديد الأعراض الجانبية التي من شأنها أن تتطلب ملاءمة الجرعة الدوائية.

الأطفال والمراهقون

يمكن إستعمال ديفيراسيروكس تيفع لدى الأطفال والمراهقين من جيل سنتين وما فوق لعلاج فرط تحميل الحديد المزمن (Iron Overload) الناتج عن نقل الدم ومن جيل 10 سنوات وما فوق لعلاج فرط تحميل الحديد المزمن غير المرتبط بنقل الدم لدى مرضى التلاسيميا. سوف يلائم الطبيب الجرعة الدوائية وفقاً لنمو الطفل.

ديفيراسيروكس تيفع غير مخصص للاستعمال لدى أطفال دون جيل سنتين.

الفحوصات والمتابعة

- خلال فترة العلاج عليك اجتناب فحوص الدم والبول بشكل منتظم. هذه الفحوص تراقب كمية الحديد في جسمك (مستوى الفريتين في الدم) للتأكد فيما إذا كان ديفيراسيروكس تيفع يؤثر كما ينبغي.
- تساعد هذه الفحوص أيضاً على متابعة وظائف الكلى (مستوى الكرياتينين في الدم، وجود بروتين في البول) ووظائف الكبد (مستويات خماثر ترانسأميناز في الدم، بيليروبين وفوسفاتاز قلوي). من شأن الطبيب أن يطلب منك إجراء خزعة الكالية، في حال يشك بوجود إصابة ملحوظة في الكلية.
- من الجائز أيضاً أن تجتاز فحوصات MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي) لتحديد كمية الحديد في الكبد. يأخذ الطبيب بعين الاعتبار هذه الفحوصات عندما يقرر أي جرعة دوائية من ديفيراسيروكس تناسبك أكثر وكذلك يستعمل هذه الفحوصات كي يقرر متى يتوجب عليك التوقف عن تناول ديفيراسيروكس تيفع.
- يتوجب عليك اجتناب فحوص للسمع والرؤية قبل بدء العلاج ومرة في السنة خلال العلاج كوسيلة حذر.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيّة والمكملات الغذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

يُمنع دمج تناول ديفيراسيروكس تيفع مع مستحضرات إضافية مستخلبة للحديد.

يُمنع تناول أدوية مضادة للحموضة (أدوية تستعمل لمعالجة الحرقان) التي تحتوي على ألومنيوم، بنفس الوقت من اليوم مع ديفيراسيروكس تيفع.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- سيكلوسبورين (يستعمل لمنع رفض عضو مزروع أو في حالات أخرى، مثلاً التهاب المفاصل الروماتزمي أو ربو الجلد)
- سيمفاستاتين (يستعمل لخفض الكولسترول)
- مسكنات الأم معينة أو أدوية مضادة للالتهاب (مثلاً، أسبيرين، إيبوبروفن، كورتيكوستيروئيدات)
- بيسفوسفونات تؤخذ عن طريق الفم (تستعمل لعلاج مرض تخلخل العظام)
- أدوية مضادة للتخثر (تستعمل لمنع أو لعلاج تشكل الخثرات الدموية)
- وسائط منع حمل هرمونية (مستحضرات لمنع الحمل)
- بيبريديل، إيرتامين (يستعملان لعلاج المشاكل القلبية والشقيقة)
- ريباجلينيذ (يستعمل لعلاج السكري)
- ريفاميسين (يستعمل لعلاج السل)

• فينيتوين، فينوباربیتال، كاربامازيبين (تستعمل لعلاج الصرع)

• ريتونايفير (يستعمل لعلاج عدوى HIV)

• باكليتاكسل (يستعمل لعلاج السرطان)

• تيوفيلين (يستعمل لعلاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو)

• كلوزابين (يستعمل لعلاج الاضطرابات النفسية مثل الفصام)

• تيزانيدين (يستعمل كمرخي للمعضلات)

• كورليستيرامين (يستعمل لخفض مستويات الكولسترول في الدم)

• بوسولفان (يستعمل كعلاج قبل عملية الزرع وذلك بغية إتلاف نخاع العظم الأصلي قبل عملية الزرع)

• ميدازولام (يستعمل للتخفيف من القلق و/أو من صعوبة النوم)

من الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوصات إضافية لمراقبة مستويات بعض الأدوية في دمك.

استعمال الدواء والغذاء

- يجب تناول ديفيراسيروكس تيفع على معدة خاوية والانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل تناول أي طعام، يُفضل بوقت محدد كل يوم.
- يجب إذابة الأقراص في كأس من الماء، عصير البرتقال أو عصير البرتقال.
- لا يجوز تنويب الأقراص في مشروبات فوارة أو في الحليب (انظر أيضاً فيما يلي "كيفية تناول ديفيراسيروكس تيفع").

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء. لا يوصى باستخدام ديفيراسيروكس تيفع خلال فترة الحمل إلا إذا كان ضرورياً بشكل واضح.

إذا كنت تستعملين وسيلة منع حمل هرمونية فعليك استعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل أو وسيلة أخرى (الكوندوم مثلاً)، لأن ديفيراسيروكس تيفع قد يضعف من نجاعة وسائل منع الحمل الهرمونية.

لا يوصى بالإرضاع أثناء العلاج بـ ديفيراسيروكس تيفع.

السياقة واستعمال الماكينات

إذا كنت تشعر بالدوار بعد تناول ديفيراسيروكس تيفع، تُمنع سياقة المركبة أو تشغيل أدوات أو ماكينات حتى يعود شعورك طبيعيًا. بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء

لاكتوز:

تحتوي أقراص ديفيراسيروكس تيفع على اللاكتوز (سكر الحليب). إذا كان لديك عدم تحمل لسكريات معينة، أخبر طبيبك قبل تناول ديفيراسيروكس تيفع.

- كل قرص ذواب من ديفيراسيروكس تيفع 125 ملغ: يحتوي على حوالي 85 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.
- كل قرص ذواب من ديفيراسيروكس تيفع 250 ملغ: يحتوي على حوالي 170 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.
- كل قرص ذواب من ديفيراسيروكس تيفع 500 ملغ: يحتوي على حوالي 341 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.

الصوديوم:

يحتوي الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم في كل قرص وبالتالي يعتبر في الواقع خالياً من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء.

يجب أن يتم العلاج بـ ديفيراسيروكس تيفع تحت إشراف طبيب متمرّس في علاج فائض الحديد.

الجرعة الدوائية المتبعة:

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحدّدان من قِبل الطبيب فقط. ترتبط الجرعة الدوائية من ديفيراسيروكس تيفع بوزن الجسم لدى كافة المتعالجين. سيقوم الطيب بحساب الجرعة الدوائية التي تحتاجها وسيقول لك كم من الأقراص عليك تناولها كل يوم.

الجرعة الدوائية المتبعة اليومية عند بدء العلاج هي عادة:

- للمتعالجين الذين يتلقون تسريبات الدم بشكل منتظم - 20 ملغ لكل كلغ من وزن الجسم. من الجائز أن يوصي الطبيب بجرعة دوائية ابتدائية أعلى أو أقل بالاعتماد على احتياجاتك العلاجية الشخصية.
- للمتعالجين الذين لا يتلقون تسريبات الدم بشكل منتظم - 10 ملغ لكل كلغ من وزن الجسم.
- يمكن للطبيب لاحقاً أن يلائم لك العلاج مع جرعة دوائية أعلى أو أقل، وذلك بحسب استجابتك للعلاج.

الجرعة الدوائية اليومية الفصوى هي:

- 40 ملغ لكل كلغ من وزن الجسم لدى متعالجين يتلقون نقلا للدم بشكل منتظم.
- 20 ملغ لكل كلغ من وزن الجسم لدى متعالجين كبار لا يتلقون نقلا للدم بشكل منتظم.
- 10 ملغ لكل كلغ من وزن الجسم للأطفال حتى جيل 18 سنة الذين لا يتلقون نقلا للدم بشكل منتظم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

فترة العلاج:

يجب الاستمرار في تناول ديفيراسيروكس تيفع كل يوم، لطالما أوصاك الطبيب بفعل ذلك. هذا العلاج هو علاج طويل الأمد، ومن الجائز أن يستمر لأشهر أو سنوات. سيقيم الطبيب بمتابعة حالتك بشكل دائم من أجل التأكد من أن العلاج يؤثر عليك بالشكل المطلوب (انظر أيضاً البند 2: "الفحوص والمتابعة").

إذا توفرت لديك أسئلة بخصوص فترة العلاج، راجع الطبيب.

طريقة التناول:


متى يجب تناول ديفيراسيروكس تيفع؟

يجب تناول ديفيراسيروكس تيفع مرة في اليوم، كل يوم، بنفس الوقت تقريبًا.

يجب تناول الأقراص على معدة خاوية ومن ثم الانتظار على الأقل 30 دقيقة قبل تناول أي طعام.

إن تناول ديفيراسيروكس تيفع في نفس الوقت كل يوم سوف يساعدك على تذكر متى عليك تناول الأقراص.

كيفية تناول ديفيراسيروكس تيفع؟



1



2



3

يجب إدخال القرص/الأقراص داخل كأس من الماء، عصير البرتقال أو عصير البرتقال (الأقراص بشكل تام. السائل في الكأس سيبدو عكراً). (200-100 ملل).

يُمنع إذابة الأقراص في مشروبات فوارة أو في الحليب.

يُمنع صنع، كسر أو سحق الأقراص. يُمنع بلع الأقراص بشكلها الكامل.

يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي، بخصوص أي سؤال يتعلق بكيفية عمل ديفيراسيروكس تيفع أو لماذا وصف من أهلك.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ظلم بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، واحضر عبلة الدواء معك. من الجائز أن يحتاج الأمر علاجاً طبياً طارئاً.

قد تعايش أعراضاً مثل ألم في البطن، إسهال، غثيان وتقيؤ ومشاكل في الكلى أو في الكبد التي يمكن أن تكون جديّة.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، تناول الجرعة الدوائية لحظة تذكرك في نفس اليوم. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الاعتيادي. يُمنع تناول جرعة دوائية مضاعفة في اليوم التالي للتعويض عن القرص/الأقراص المنسي/المنسبة.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، يُمنع التوقّف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

لا تتوقف عن العلاج بـ ديفيراسيروكس تيفع بدون تعليمات صريحة من الطبيب. إذا توقفت عن تناول ديفيراسيروكس تيفع، فإن فائض الحديد لم يعد يطرح من جسمك (انظر أيضاً أعلاه "فترة العلاج").

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من المصلى على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظّارات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ديفيراسيروكس تيفع أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها. غالبية الأعراض الجانبية هي بسيطة حتى معتدلة وعادة تزول بعد عدة أيام حتى عدة أسابيع من العلاج.

أعراض جانبية معينة من شأنها أن تكون خطيرة وتتطلب علاجاً طبياً فوراً. الأعراض الجانبية هذه هي غير شائعة (قد تؤثر على حتى متعالج 1 من كل 100 متعالج) أو نادرة (قد تؤثر على حتى متعالج 1 من بين 1,000 متعالج).

- يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا انطبقت عليك أو على طفلك إحدى الحالات التالية:
- طمح شديد أو صعوبات في التنفس ودوار أو انتفاخ خاصة للوجه والحنجرة (علامات لرد فعل تحسسي شديد)
 - مزيج من أي من الأعراض التالية: طفح، احمرار الجلد، حويصلات في الشفتين، العينين أو الفم، تقشر الجلد، سخونة مرتفعة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تضخم العقد الليمفاوية (علامات لرد فعل جلدي شديد)
 - انخفاض حاد في النبول (علامة لمشكلة في الكلى)
 - مزيج من النعاس، ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، اصفرار أو زيادة اصفرار الجلد أو العينين وبول داكن (علامات لمشاكل في الكبد)
 - صعوبة التفكير، تذكر المعلومات أو حل المشاكل، قلة اليقظة أو الإدراك، أو ميل للنوم يترافق بقلة الحيوية (علامات لارتفاع مستوى الأمونيا في الدم، الذي من شأنه أن يكون ذو علاقة بمشاكل في الكبد أو الكلى وأن يؤدي إلى تغير في وظيفة الدماغ)
 - تقيؤ دموي و/أو براز أسود
 - آلام متكررة في البطن، خاصة بعد الطعام أو تناول ديفيراسيروكس تيفع
 - حالات حرقان متكررة
 - فقدان الرؤية بشكل جزئي
 - ألم شديد في أعلى البطن (التهاب البنكرياس).

أعراض جانبية معينة من شأنها أن تصبح جدية.

الأعراض الجانبية هذه هي غير شائعة.

يجب مراجعة الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا:

- كنت تعاني من تشوش أو ضبابية في الرؤية
- كنت تعاني من ضعف في السمع

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من متعالج واحد من كل 10 متعالجين):

- فحوص غير سليمة ذات علاقة بالأداء الوظيفي للكلى

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى متعالج واحد من كل 10 متعالجين):

- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم في البطن، نفخة، إمساك، صعوبات في الهضم

- طفح
- صداع

- فحوص غير سليمة ذات علاقة بالأداء الوظيفي للكبد
- حكة

- فحوص بول غير سليمة (بروتين في البول)

إذا أثرت عليك إحدى الأعراض المذكورة أعلاه بشكل شديد، راجع الطبيب.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى متعالج واحد من كل 100 متعالج):

- دوار
- سخونة

- ألم في الحنجرة
- انتفاخ في الذراعين أو الرجلين

- تغير في لون الجلد
- قلق

- اضطرابات في النوم
- إرهاق

إذا أثرت عليك إحدى الأعراض المذكورة أعلاه بشكل شديد، راجع الطبيب.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (لا يمكن تقدير الشيوع من المعطيات المتوفرة):

- انخفاض في عدد خلايا الدم التي تشترك في تخثر الدم (قلة الصفائح) في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر دم شديد)، في عدد خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات) أو في عدد كافة أنواع خلايا الدم (قلة الكريات الشاملة)

- تساقط الشعر
- حصى في الكلى

- نتاج منخفض للبول
- تمزق في المعدة أو في جدار الأمعاء الأمر الذي قد يؤدي لحدوث ألم وغثيان

- ألم شديد في أعلى البطن (التهاب البنكرياس).
- مستوى شاذ من الحمض في الدم

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي"

الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن

الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا

تجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب التخزين في درجة حرارة تحت الـ 25°C.

لا يجوز استعمال عليه معطوبة، أو ذات علامات تدل على وجود خراب.

- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الاستعمال. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً:

Lactose monohydrate, crospovidone, microcrystalline cellulose (avicel PH 113), microcrystalline cellulose (avicel PH 112), povidone, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, colloidal silicon dioxide.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

يتم تسويق ديفيراسيروكس تيفع على شكل أقراص ذوّابة ضمن عبوة بحجم 30 قرصاً.

- ديفيراسيروكس تيفع 125 ملغ: قرص مستدير ومسطّح بلون أبيض - بيج، على جانب واحد مطبوع الرقم "77" والرقم "438" مطبوع على الجانب الآخر

- ديفيراسيروكس تيفع 250 ملغ: قرص مستدير ومسطّح بلون أبيض - بيج، على جانب واحد مطبوع الرقم "77" والرقم "439" مطبوع على الجانب الآخر

- ديفيراسيروكس تيفع 500 ملغ: قرص مستدير ومسطّح بلون أبيض - بيج، على جانب واحد مطبوع الرقم "77" والرقم "440" مطبوع على الجانب الآخر

اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ض.، شارع دفوراً هنغينا 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير هذه النشرة في حزيران 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

161-12-34651، 161-13-34650، 161-14-34653

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.