

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

زيبينيكس 200 ملغ
زيبينيكس 800 ملغ

أقراص

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص من زيبينيكس 200 ملغ على إيسليكاربازيبين أسيتات (eslicarbazine acetate) 200 ملغ.
يحتوي كل قرص من زيبينيكس 800 ملغ على إيسليكاربازيبين أسيتات (eslicarbazine acetate) 800 ملغ.

للمواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية في المستحضر انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

يُستعمل زيبينيكس

- كدواء وحيد (علاج أحادي الدواء) لعلاج اختلاج جزئي مع أو بدون اختلاج عام ثانوي، لدى مرضى بالغين مصابين بالصرع الذي تم تشخيصه مؤخرًا.
- سوية مع أدوية أخرى مضادة للصرع (علاج مرافق)، لعلاج مرضى بالغين، مراهقين وأطفال فوق عمر 6 سنوات الذين يعانون من اختلاجات جزئية مع أو بدون اختلاج عام ثانوي.

المجموعة العلاجية: أدوية مضادة للصرع، من مشتقات كاربوكساميد.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعالة إيسليكاربازيبين أسيتات، لمشتقات كاربوكساميد أخرى (مثلًا، كاربامازيبين أو أوكسكاربازيبين، أدوية تستعمل لعلاج الصرع) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- إذا كنت تعاني من نوع معين من اضطراب في نظم القلب (إحصار أنيني-بطيني [atrioventricular (AV) block] من الدرجة الثانية أو الثالثة).

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

يجب التوجه فورًا إلى الطبيب:

- إذا كنت تعاني من تكوّن حويصلات أو تقشر في الجلد و/أو الأنسجة المخاطية، طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، انتفاخ الشفتين، الوجه، الجفون، الحنجرة أو اللسان. قد تكون هذه علامات لرد فعل تحسّسي.
- إذا كنت تعاني من ارتباك، من تفاقم الاختلاجات أو من تدني في الوعي، التي قد تكون علامات لمستويات منخفضة للأملاح في الدم.
- قليل من الأشخاص الذين يتعالجون بأدوية مضادة للصرع قد عايشوا أفكارًا بايذاء أنفسهم أو الانتحار. إذا كانت لديك مثل هذه الأفكار في أي مرحلة أثناء العلاج بـ زيبينيكس، توجه فورًا إلى الطبيب.
- ردود فعل جلدية خطيرة التي قد تشكل خطرًا على الحياة، بما في ذلك متلازمة ستيفينس-جونسون/تقشر الأنسجة المتموتة البشروية التسممي، تفاعل للدواء المترافق مع فرط الحمضات والأعراض الجهازية (DRESS) تم التبليغ عنها بعد بدء التسويق لدى المرضى الذين عولجوا بـ زيبينيكس.
- إذا تطوّر لديك طفح خطير أو أعراض جلدية أخرى (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية")، توقف عن تناول زيبينيكس وتوجه إلى الطبيب أو توجه فورًا لتلقي علاج طبي.

قبل العلاج بـ زيبينيكس، أخبر الطبيب:

- إذا كانت لديك مشاكل في الكلى. من المحتمل أن يحتاج الطبيب إلى ملاءمة الجرعة لديك. زيبينيكس غير موصى به للمتعالجين الذين لديهم مرض كلوي شديد.
- إذا كانت لديك مشاكل في الكبد. زيبينيكس غير موصى به للمتعالجين الذين لديهم مشاكل كبد شديدة.

- إذا كنت تتناول أي دواء الذي من الممكن أن يسبب إلى نتيجة شاذة في تخطيط كهربية القلب (Electrocardiogram) الذي يُسمى إبطاء مقطع PR. إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كانت الأدوية التي تتناولها ممكن أن يكون لها هذا التأثير، تحدث مع الطبيب.
- إذا كنت تعاني من مرض قلب مثل قصور قلبي أو نوبة قلبية، أو كنت تعاني من أي اضطراب في نظم القلب.
- إذا كنت تعاني من اختلاجات التي تبدأ بتفريغ كهربائي واسع الذي يشمل كلا جانبي الدماغ.

تحذيرات إضافية:

- قد يسبب زيبينيكس شعور بالدوار و/أو النعاس، خاصة عند بدء العلاج. يجب عليك أن تكون حذرًا خاصة خلال العلاج بـ زيبينيكس لتجنب الإصابة العرضية، مثل السقوط.
- لدى المتعالجين من أصل صيني من المجموعة الإثنية هان، أو من أصل تايلندي، يمكن تنبؤ خطر حدوث ردود فعل جلدية خطيرة المتعلقة بكاربامازيبين أو بمركبّات شبيهة من الناحية الكيميائية بواسطة فحص عينة دم من هؤلاء المرضى. بإمكان الطبيب التوصية بإجراء فحص دم قبل تناول زيبينيكس بحسب الحاجة.

الأطفال

زيبينيكس ليس معدًا للأطفال من عمر 6 سنوات فما دون ذلك. سلامة ونجاعة زيبينيكس لم يتم إثبات سلامة ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال بعمر 6 سنوات فما دون ذلك.

ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. السبب لذلك هو أن بعضها قد تشوش طريقة عمل زيبينيكس أو قد يشوش زيبينيكس على تأثيرها. خاصة إذا كنت تتناول:
- فينيتوين (لعلاج الصرع) لأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لملاءمة جرعتك.
 - كاربامازيبين (لعلاج الصرع) - لأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لملاءمة جرعتك، والأعراض الجانبية التالية لـ زيبينيكس قد تظهر بشيوع أعلى: رؤية مزدوجة، خلل في التناسق ودوار.
 - وسائل منع حمل هرمونية (مثل حبوب منع الحمل) لأن زيبينيكس قد يقلل من نجاعتها.
 - سيمفاستاتين (لخفض مستويات الكوليسترول) لأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لملاءمة جرعتك.
 - روزيوفاستاتين، دواء يُستعمل لخفض مستويات الكوليسترول.
 - وارفارين - دواء مضاد للتخثر.
 - مضادات الاكتئاب من نوع مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs).
 - يُمنع تناول أوكسكاربازيبين (دواء لعلاج الصرع) سوية مع زيبينيكس، لأنه ليس معروفًا فيما إذا كان آمنًا تناول هذه الأدوية سويًا.
- انظر أدناه البند الفرعي "الحمل والإرضاع" لمعلومات عن وسائل منع الحمل.

الحمل والإرضاع

تأثيرات زيبينيكس على الحمل والجنين غير معروفة، لذلك لا يوصى باستعمال زيبينيكس خلال الحمل. إذا كنت تخططين للحمل، تحدثي إلى الطبيب قبل أن تتوقفي عن استعمال وسائل منع الحمل وقيل أن تصبجي حاملًا. قد يقرر الطبيب تغيير علاجك. هناك معلومات محدودة من استعمال إيسليكاربازيبين أسيتات لدى النساء الحوامل. أظهرت الأبحاث زيادة خطر حدوث عيوب خلقية ومشاكل في النمو العصبي (تطور الدماغ) لدى أطفال النساء اللاتي يتناولن أدوية مضادة للصرع، خاصة عند تناول أكثر من دواء مضاد للصرع في نفس الوقت.

إذا كنت حاملًا أو تعتقدين أنك قد تكونين حامل، توجهي إلى الطبيب فورًا. لست بحاجة للتوقف عن تناول الدواء حتى محادثتك مع الطبيب. قد يؤدي التوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب إلى حدوث اختلاجات، التي قد تكون خطيرة عليك وعلى الجنين. قد يقرر الطبيب تغيير علاجك.

إذا كنت في سن الخصوبة ولا تخططين للحمل، عليك استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج بـ زيبينيكس. قد يؤثر زيبينيكس على كيفية عمل وسائل منع الحمل الهرمونية، مثل حبوب منع الحمل، وتقليل نجاعتها في منع الحمل. لذلك، يوصى باستعمال أنواع أخرى من وسائل منع الحمل الآمنة والناجعة، أثناء تناول زيبينيكس. تحدثي إلى الطبيب حول نوع وسيلة منع الحمل الأنسب للاستعمال أثناء تناول زيبينيكس. إذا تم إيقاف علاج زيبينيكس، عليك الاستمرار في استعمال وسيلة منع حمل ناجعة حتى نهاية الدورة الشهرية الحالية.

إذا كنت تتناولين زيبينيكس خلال الحمل، فإن رضيعك معرض أيضًا لخطر الإصابة بمشاكل نزفية حاليًا بعد الولادة. قد يعطيك الطبيب أنت ورضيعك دواءً لمنع ذلك.

يُمنع الإرضاع أثناء تناول زيبينيكس. من غير المعروف ما إذا كان ينتقل إلى حليب الأم.

السياقة واستعمال الماكينات

قد يؤدي زيبينيكس إلى شعور بالدوار، نعاس وقد يؤثر على الرؤية، خاصة في بداية العلاج. إذا ظهرت إحدى هذه الأعراض لديك، يُمنع السياقة أو استعمال أدوات أو ماكينات.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. الجرعة المُتَّبعة عادة هي:

البالغون

الجرعة في بداية العلاج
400 ملغ مرّة واحدة في اليوم لمدة أسبوع واحد أو أسبوعين، قبل زيادة الجرعة لجرعة صيانة. سيقرر الطبيب إذا كنت ستحصل على هذه الجرعة لمدة أسبوع واحد أو أسبوعين.

جرعة صيانة

جرعة الصيانة المعتادة هي 800 ملغ مرّة واحدة في اليوم. بحسب كيفية استجابتك ل زيبينيكس، من المحتمل أن تتم زيادة الجرعة إلى 1,200 ملغ مرّة واحدة في اليوم. إذا كنت تتناول زيبينيكس كدواء وحيد، من المحتمل أن يفحص الطبيب إمكانية إذا كنت ستجني فائدة من جرعة 1,600 ملغ مرّة واحدة في اليوم.

متعالجون لديهم مشاكل في الكلى

إذا كانت لديك مشاكل في الكلى، ستحصل عادة على جرعة أقل من زيبينيكس. سيحدد الطبيب الجرعة الصحيحة بالنسبة لك. زيبينيكس غير موصى به إذا كنت تعاني من مشاكل شديدة في الكلى.

المسنون (فوق عمر 65 سنة)

إذا كنت مسنًا وتتناول زيبينيكس كدواء وحيد، فإن جرعة 1,600 ملغ غير ملائمة لك.

الأطفال فوق عمر 6 سنوات

الجرعة في بداية العلاج
الجرعة الابتدائية هي 10 ملغ/كغم وزن الجسم، التي تعطى مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع واحد أو أسبوعين، قبل زيادة الجرعة إلى جرعة صيانة.

جرعة صيانة

بحسب الاستجابة ل زيبينيكس، من المحتمل أن تتم زيادة الجرعة ب 10 ملغ/كغم وزن جسم، بفواصل ذات أسبوع واحد أو أسبوعين، حتى 30 ملغ/كغم وزن الجسم. الجرعة القصوى هي 1,200 ملغ التي يتم تناولها مرّة في اليوم.

أطفال بوزن ≤ 60 كغم

الأطفال الذين بوزن 60 كغم وما فوق يحتاجون إلى تناول جرعة مشابهة لجرعة البالغين.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها

طريقة تناول

زيبينيكس معد للإعطاء عن طريق الفم. يجب بلع القرص مع كأس ماء. يمكن تناول أقراص زيبينيكس مع أو بدون طعام. إذا كنت تجد صعوبة في بلع القرص كاملاً، بإمكانك سحق القرص وإضافته إلى كمية قليلة من الماء أو إلى هريس التفاح وتناول الجرعة بأكملها فوراً. يمكن شطر القرص إلى جرعات متساوية.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

إذا تناولت عن طريق الخطأ كمية أكبر مما هو مطلوب من زيبينيكس، من المحتمل أن تكون في خطر أعلى للإصابة باختلاجات كثيرة؛ أو قد تشعر بنظم قلب غير منتظم أو سريع جداً. اتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى فوراً إذا كنت تشعر بأي من الأعراض أعلاه. أحضر معك عبوة الدواء. إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول القرص، عليك تناوله فور تذكرك ذلك والاستمرار كالمعتاد. يُمنع تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيتها.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن تناول الأقراص بصورة فجائية. إذا فعلت ذلك، ستكون معرضًا لخطر أعلى لحدوث اختلاجات أكثر. سيقرر الطبيب كم من الوقت عليك تناول زيبينيكس. إذا قرر الطبيب إيقاف العلاج بـ زيبينيكس، عادة يتم خفض الجرعة تدريجيًا. من المهم إكمال العلاج بموجب توصية الطبيب، وإلا قد تتفاقم الأعراض.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال زيبينيكس أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها. الأعراض الجانبية التالية قد تكون خطيرة جدًا. إذا ظهرت لديك، توقف عن تناول زيبينيكس وأبلغ الطبيب أو توجه فورًا إلى المستشفى، لأنه من المحتمل أن تكون بحاجة إلى علاج طبي طارئ: تكون حويصلات أو تقشر في الجلد و/أو الأنسجة المخاطية، طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، انتفاخ الشفتين، الوجه، الجفون، الحجرة أو اللسان. قد تكون هذه علامات لرد فعل تحسسي.

أعراض جانبية شائعة جدًا (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة)

- شعور بالدوار أو النعاس.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 10-1 مستعملين من بين 100)

- شعور بعدم الثبات أو شعور بالدوار أو التحليق؛
- حالات غثيان أو تقيؤات؛
- صداع؛
- إسهال؛
- ازدواجية الرؤية أو تشوش الرؤية؛
- صعوبة في التركيز؛
- الشعور بقلّة حيوية أو إرهاق؛
- ارتجاف؛
- طفح جلدي؛
- فحوصات دم التي تشير إلى مستويات صوديوم منخفضة في الدم؛
- انخفاض الشهية للطعام؛
- صعوبة في النوم؛
- صعوبة في تناسق الحركات (Ataxia)؛
- زيادة في الوزن.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 10-1 مستعملين من بين 1,000)

- انعدام الرشاقة؛
- حساسية؛
- إمساك؛
- اختلاجات؛
- قصور عمل الغدة الدرقية. الأعراض تشمل انخفاض في مستوى هرمون الغدة الدرقية (لوحظت في فحوصات الدم)، عدم تحمل البرد، لسان كبير، أطراف اليدين أو الشعر دقيقة وقابلة للانكسار وحرارة جسم منخفضة؛
- مشاكل في الكبد (مثل ارتفاع في إنزيمات الكبد)؛
- ضغط دم مرتفع أو ارتفاع خطير في ضغط الدم؛
- ضغط دم منخفض أو هبوط في ضغط الدم عند النهوض للوقوف؛
- فحوصات دم التي تشير إلى مستويات أملاح (بما في ذلك كلوريد) منخفضة في الدم أو انخفاض في تعداد خلايا الدم الحمراء؛
- تجفاف؛
- تغييرات في حركات العينين، تشوش الرؤية أو احمرار في العينين؛
- حالات سقوط؛
- احتراق حراري؛
- خلل في الذاكرة أو نسيان؛
- بكاء، شعور بالاكئاب، عصبية أو ارتباك، عدم الاهتمام أو العاطفة؛
- عدم القدرة على الكلام، الكتابة أو فهم لغة مكتوبة أو كلامية؛
- احتياج؛

- اضطراب الإصغاء والتركيز/فرط الحركة؛
- عصبية؛
- تغييرات في المزاج أو هلوسات؛
- صعوبة في الكلام؛
- رعاف؛
- ألم في الصدر؛
- وخز و/أو خدر بجزء معين من الجسم؛
- شقيقة؛
- شعور بالحرقنة؛
- شعور لمس شاذ؛
- اضطرابات في حاسة الشم؛
- طنين في الأذنين؛
- صعوبة في السمع؛
- انتفاخ في الرجلين والذراعين؛
- حرقان، انزعاج في المعدة، ألم بطن، انتفاخ وانزعاج في البطن أو جفاف في الفم؛
- براز بلون الفحم (غامق)؛
- التهاب في اللثة أو ألم أسنان؛
- تعرق أو جفاف الجلد؛
- حكة؛
- تغييرات في الجلد (مثل جلد أحمر)؛
- تساقط الشعر؛
- عدوى في المسالك البولية؛
- إحساس عام بالوهن، بالمرض أو قشعريرة؛
- تناقص في الوزن؛
- آلام العضلات، ألم في الأطراف، ضعف عضلي؛
- اضطراب في استقلاب العظم؛
- ارتفاع في مستويات بروتينات العظم؛
- تورّد، برد الأطراف؛
- نظم قلب بطيء أو غير منتظم؛
- شعور شديد بالنعاس؛
- الشعور بالتثويش؛
- اضطراب حركي عصبى الذي يؤدي فيها تقلصات العضلات إلى حركات متشنجة ومتكررة أو وضعية شاذة.
- تسمّم دوائي؛
- قلق.

أعراض جانبية نسبية شبيهة غير معروفة (لا يمكن تحديد تواريخها من المعطيات المتوفرة)

- انخفاض في تعداد الصفائح الدموية التي تزيد خطر حدوث نزف أو ورم دموي؛
- ألم حاد في الظهر أو في المعدة (الذي يحدث نتيجة التهاب البنكرياس)؛
- انخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء التي تزيد احتمال حالات العدوى؛
- آفات حمراء شبيهة بالهدف أو بقع مستديرة، وفي أحيان متقاربة مع حويصلات في مركزها على الجذع، تقشر الجلد، تقرحات في الفم، في الحنجرة، الأنف، الأعضاء التناسلية والعينين، عيون حمراء ومنتفخة، ومن المحتمل ظهور مسبق لسخونة و/أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا (متلازمة ستيفنس-جونسون/تقشر الأنسجة المتموتة البشوية التسممي)؛
- بدء أعراض شبيهة بالإنفلونزا، طفح على الوجه، وبعد ذلك طفح منتشر، حرارة جسم مرتفعة، ارتفاع في إنزيمات الكبد، نتائج شاذة في الدم (فرط الحمضات)، غدد ليمفاوية متضخمة ومشاركة لأعضاء جسم أخرى (تفاعل للدواء المترافق مع فرط الحمضات والأعراض الجهازية المعروفة أيضًا بـ DRESS أو متلازمة فرط حساسية للدواء)؛
- رد فعل تحسسي خطير الذي يؤدي إلى انتفاخ في الوجه، الحنجرة، راحتي اليدين، القدمين، الكاحلين أو أسفل الرجلين؛
- شرى (طفح جلدي مصحوب بحكة؛ شرى)؛
- نعاس، ارتباك، تشنجات العضلات أو تفاقم الاختلاجات بشكل ملحوظ (أعراض محتملة لانخفاض مستويات الصوديوم في الدم بسبب إفراز غير طبيعي للهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)).

إن استعمال زيبينيكس له علاقة بنتيجة شاذة في تخطيط كهربية القلب (Electrocardiogram) الذي يسمى إطالة مقطع PR. من المحتمل ظهور أعراض جانبية لها علاقة بهذه النتيجة الشاذة في تخطيط كهربية القلب (مثل إغماء وتباطؤ نظم القلب).

تم الحصول على تبيغات عن اضطرابات في العظم وهذا يشمل قلة العظم (Osteopenia)، هشاشة العظم (Osteoporosis) وكسور تتعلق بأدوية مضادة للصرع ذات تشابه هيكلي مثل كاربامازيبين وأوكسكاربازيبين. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تحصل على علاج مضاد للصرع طويل الأمد، كان لديك سابقة لهشاشة العظام أو إذا كنت تتناول ستيرونيدات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

لا توجد شروط تخزين خاصة. يوصى بحفظه في درجة حرارة الغرفة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا:

Povidone K29/32, croscarmellose sodium, magnesium stearate

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

زيبينيكس 200 ملغ

أقراص زيبينيكس 200 ملغ هي مستطيلة الشكل ذات زوايا مدوّرة ولونها أبيض، على أحد جانبي الأقراص مختم "ESL 200" وعلى الجانب الآخر يظهر خط للشطر بطول 11 ملم. يمكن شطر القرص إلى جرعات متساوية. تحتوي عبوات الكرتون ذات 20 أو 60 قرص على أقراص معبأة في شرائط.

زيبينيكس 800 ملغ

أقراص زيبينيكس 800 ملغ هي مستطيلة الشكل ذات زوايا مدوّرة ولونها أبيض، على أحد جانبي الأقراص مختم "ESL 800" وعلى الجانب الآخر يظهر خط للشطر بطول 19 ملم. يمكن شطر القرص إلى جرعات متساوية. تحتوي عبوات الكرتون ذات 20، 30، 60، 90 أو 180 قرص على أقراص معبأة في شرائط.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

تروميد م.ض.، شارع بني جانون 10، پارك الصناعة بوليچ ص.ب. 8105، نتانيا 4250499

اسم المنتج وعنوانه:

BIAL - Portela & C^a, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal

تمت المصادقة عليها في كانون الثاني 2023

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:
زيبينيكس 200 ملغ – 170-76-37082

زيبينيكس 800 ملغ – 170-77-37083

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.