

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

ستريپيسيلس بلوس

أقراص للمصّ

المواد الفعالة وتركيزها:

يحتوي كل قرص للمص ستريپيسيلس بلوس على:

2,4 ثنائي كلورو بنزويل الكحول 1.2 mg 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol

أميل ميتا كريسول 0.6 mg Amylmetacresol

ليدوكاين هيدروكلوريد 10.0 mg Lidocaine Hydrochloride

لقائمة المواد غير الفعالة، انظر للبند 6. انظر أيضًا للبند "معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. يجب عليك تناول المستحضر حسب التعليمات الواردة في بند الجرعة من هذه النشرة.

الدواء مُخصص للبالغين والأطفال فوق جيل 12 سنة. عليك استعمال الدواء بالشكل الصحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تدهورت علامات المرض (الأعراض) أو أنها لا تتحسن بعد عدة أيام.

1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

للتخفيف السريع من آلام الحلق القوية ولتطهير الحلق.

الفصيلة العلاجية: مطهر.

يحتوي المستحضر على مادتين فعاليتين (2,4 ثنائي كلورو بنزويل الكحول وأميل ميتا كريسول) حيث لهما تأثير مطهر، ويقتلان الجراثيم الضالعة في التهابات الفم والحلق. بالإضافة، يحتوي المستحضر على ليدوكاين - مخدر موضعي - الذي يخفف بسرعة آلام الحلق.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمواد الفعالة أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6).
- عانيت في الماضي من حساسية لمواد تحدير موضعية من فصيلة الأميدات.
- عانيت في الماضي أو تشك في أنك تعاني من ميتهيموغلوبينية الدم.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

قبل العلاج بستريپيسيلس بلوس أخبر الطبيب إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعة.
- أخبرك الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل بعض السكريات (انظر للبند "معلومات مهمة حول قسم من مكونات الدواء")
- كنت تعاني من الربو.
- لم تتحسن علامات المرض (الأعراض) أو كانت مصحوبة بسخونة مرتفعة أو صداع أو أي علامة أخرى غير عادية.

الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء غير مخصص للأطفال دون جيل 12 سنة.

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

لا يوصى باستخدام الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة إلا إذا كنت تحت إشراف طبي.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي كل قرص للمص على:

- 1.52 غرام سكروروز و- 0.98 غرام جلوكوز. يجب استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام الدواء إذا قيل لك أنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة (انظر للبند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء") أو إذا كنت مريضاً بالسكري.

يجب الامتناع عن استخدام الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة مثل الفروكتوز، سوء امتصاص الجلوكوز-جالاكتوز وعدم امتصاص السكروروز- أيزومالتوز.

- أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم، الذي يعتبر "خاليًا من الصوديوم".

- يحتوي المستحضر على مستويات منخفضة جدًا من الجلوتين (نشا القمح). يعتبر المستحضر "خاليًا من الجلوتين". من غير المحتمل أن يسبب المستحضر أي مشاكل لمرضى الاضطراب البطني (سيلياك). لا يحتوي قرص المص الواحد على أكثر من 19.60 ميكروغرام من الجلوتين. لا يجوز تناول هذا المستحضر إذا كنت تعاني من الحساسية للجلوتين (حالة مختلفة عن مرض الاضطراب البطني (سيلياك)).

- يحتوي المستحضر على مركبي نكهة Star Anise Oil و-peppermint oil اللذان يحتويان على

d-limonene, Anisyl alcohol, و- linalool اللذان من شأنهما أن يسببا ردود فعل تحسسية.

- يحتوي أيضا على السولفيت - ثاني أكسيد الكبريت (E220) (الموجود في الجلوكوز السائل) والذي في أوقات متباعدة يسبب ردود فعل تحسسية أو تشنج القصبات.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وكيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة المتبعة بشكل عام للبالغين والأطفال فوق جيل 12 سنة هي:

يجب مص قرص واحد ببطء كل 2-3 ساعات حسب الحاجة.

لا يجوز استهلاك أكثر من 8 أقراص مص في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مُخصص للأطفال تحت جيل 12 سنة.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال 3 أيام، يجب التوجه لطبيب.

مدة العلاج:

للاستخدام قصير الأمد فقط.

يجب تناول الجرعة الأقل وللفترة الأقصر من أجل تخفيف الأعراض.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد، ولا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المُلصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال ستريبيسليس بولس أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب إذا ظهر رد فعل تحسسي مثل طفح في الجلد، انتفاخ تحت الجلد، غثيان، انزعاج في تجويف الفم. الشبوع غير معروف (لا يمكن تحديد مدى شيوعها من المعلومات المتوفرة).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا أصبح أحد الأعراض الجانبية وخيفاً، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية في أعقاب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط <http://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- ظروف التخزين: يخزن بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
- اسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. ستساعدك هذه الخطوات على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Liquid Sucrose, Liquid Glucose, Tartaric Acid, Sodium Saccharin, Levomenthol, Peppermint Oil, Star Anise Oil, Indigo Carmine, Quinoline Yellow.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: تحتوي العلبة على 24 قرصًا للمص. أقراص المص هي دائرية، ذات لون أزرق فاتح.

اسم المنتج وعنوانه: ريكيت بنكيزر هلتكير انترناشونال م.ض. نوتنغهام، إنجلترا
صاحب التسجيل وعنوانه: ريكيت بنكيزر (نير ايست) م.ض، هَنَجَار 6، هود هشارون.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 106.86.28928.00

تم تحريرها في كانون الأول 2022 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.
للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.