

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סטרפסילס® פלוס

לכסניות למציצה

חומרים פעילים וריכוזם:

כל לכסנית סטרפסילס® פלוס מכילה

2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 1.2 mg דיכלורובנזיל אלכוהול

Amylmetacresol 0.6 mg אמילמטהקרוסול

Lidocaine Hydrochloride 10.0 mg לידוקאין הידרוכלוריד

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6. ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.

התרופה מיועדת למבוגרים ולילדים מעל לגיל 12 שנים. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה מהירה בכאבי גרון חזקים ולחיטוי הגרון.

קבוצה תרפויטית: אנטיספטי.

התכשיר מכיל שני חומרים פעילים (2,4 דיכלורובנזיל אלכוהול ואמילמטהקרוסול) בעלי פעולה אנטיספטית, הקוטלים חיידקים המעורבים בזיהומי פה וגרון. בנוסף, התכשיר מכיל לידוקאין – מאלחש מקומי – המקל במהירות על כאבי גרון.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6).
- סבלת בעבר מאלרגיה למאלחשים מקומיים ממשפחת האמידים.
- סבלת בעבר או הנך חושש שהנך סובל ממטהמוגלובינמיה (כחלת).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בסטרפסילס פלוס ספר לרופא אם:

- הינך בהריון או מניקה.
- נאמר לך על ידי הרופא שאתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים (ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה")
- הינך סובל מאסטמה.
- סימני המחלה (סימפטומים) אינם משתפרים או שהם מלווים בחום גבוה, כאב ראש או כל סימן אחר שאינו שגרתי.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

השימוש בתרופה אינו מומלץ אם הנך בהריון או מניקה למעט אם הינך נמצאת תחת השגחה רפואית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל לכסנית מכילה:

- 1.52 גרם סוכרוז ו-0.98 גרם גלוקוז. יש להתייעץ עם הרופא המטפל טרם השימוש בתרופה אם נאמר לך שאתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה") או אם הנך חולה סוכרת.
- יש להימנע משימוש בתרופה אם אתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים כגון פרוקטוז, ספיגה לקויה של גלוקוז-גלאקטוז ואי ספיגה של סוכרוז איזומאלטוז.
- פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן, הנחשב כ-"ללא נתרן".
- התכשיר מכיל רמות נמוכות מאוד של גלוטן (מעמילן חיטה). התכשיר נחשב כ"ללא גלוטן". לא סביר שתכשיר זה יגרום לבעיות כלשהן בחולי צליאק. לכסנית אחת מכילה לא יותר מ-19.60 מיקרוגרם של גלוטן. **אין לקחת תכשיר זה אם הנך סובל מאלרגיה לגלוטן** (מצב השונה ממחלת צליאק).
- התכשיר מכיל מרכיבי טעם Star Anise Oil ו-peppermint oil הכוללים d-limonene, Anisyl alcohol, ו-linalool העלולים לגרום לתגובות אלרגיות.
- מכיל בנוסף סולפיט – גופרית דו חמצנית (E220) (הנמצאת בגלוקוז נוזלי) אשר לעיתים רחוקות עלול לגרום לתגובות אלרגיות חריפות או לעווית הסימפונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים וילדים מעל לגיל 12 שנה הוא:

יש למצוץ לכסנית אחת באיטיות כל 2-3 שעות לפי הצורך.

אין לצרוך יותר מ-8 לכסניות ביממה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנה.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.

משך הטיפול:

לשימוש קצר טווח בלבד.

יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר ולזמן הקצר ביותר על מנת להקל על התסמינים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל ואל תעבור על המנה המומלצת.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים

אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפסילס פלוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא אם מופיעה תגובה אלרגית כגון פריחה, נפיחות מתחת לעור, בחילות, אי נוחות בחלל הפה. שכיחות אינה ידועה (לא ניתן לקבוע את שכיחותן מהמידע הקיים).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור <http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ 25°C .
- שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאינן עוד בשימוש. צעדים אלו יעזרו לך להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Liquid Sucrose, Liquid Glucose, Tartaric Acid, Sodium Saccharin, Levomenthol, Peppermint Oil, Star Anise Oil, Indigo Carmine, Quinoline Yellow.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: אריזת הקרטון מכילה 24 לכסניות. הלכסניות הינן עגולות, בצבע כחול בהיר.

שם היצרן וכתובתו: רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם, אנגליה
שם בעל הרישום וכתובתו: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, רח' הנגר 6, הוד השרון.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 106.86.28928.00

נערך בדצמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.