

## اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم

معلق للإستنشاق للإستعمال بواسطة نيبوليزر

المادة الفعالة وكميتها بوحدة مقدار دوائي

تحتوي كل قنينة صغيرة على:

590 mg liposomal amikacin  
(as sulfate)

590 ملغم ليپوزومال أميكاسين  
(على شكل ملح سولفات)

المقدار الدوائي الوسطي الذي يتم توصيله لكل قنينة صغيرة هو حوالي 312 ملغم أميكاسين.

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم والتصرف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بإيمانع قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها ثانية بتمعن إذا دعت الحاجة.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج إلتهاب الرئتين التلوثي، بالمتقطرة اللاسلكية (NTM) (MAC) لدى كبار ليس لديهم تليف كيسى، حيث أن خيارات العلاج لديهم محدودة.

الفصيلة العلاجية: مضادات حيوية من فصيلة الأمينوچليکوزيدات لعلاج جهازى.

اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم عبارة عن مضاد حيوي الذي يحتوى على المادة الفعالة أميكاسين، من فصيلة المضادات الحيوية المسماة أمينوچليکوزيدات، التي توقف نمو جراثيم معينة تسبب التلوث.

يعطى اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم بالإستنشاق (inhalation).

### 2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة أو لأمينوچليکوزيدات أخرى، للصويا، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر قائمة المركبات غير الفعالة في الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- كنت تستعمل أminoچليکوزيدات أخرى (عبر الفم أو بالحقن).
- الأداء الوظيفي الكلوي لديك منخفض جداً.

### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم، إحكِ للطبيب إذا:

- كنت تستعمل موسّع قصبات هوائية لمشاكل في التنفس، لأنه سيطلب منك إستعماله أولاً، قبل إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم.
- وُجدت لديك مشاكل في الكلى؛ من الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحص كلوي قبل بدء العلاج.
- وُجدت لديك صعوبات في السمع، رنين أو أزيز في الأذنين (طنين) أو مشاكل في التوازن بما في ذلك الشعور بدوخة، عدم تناسق في حركات العضلات أو دوار. من الجائز أن تحتاج إلى إجتياز فحص سمع قبل بدء العلاج أو خلافه، إذا وُجدت لديك أية مشاكل في السمع.
- كنت تعاني من أمراض رئوية أخرى.

- وُجد لديك مرض يؤدي إلى ضعف في العضلات وإرهاق، مثل الوهن العضلي الوبييل.

إحكِ فوراً للطبيب إذا ظهر لديك واحد مما يلي خلال فترة إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم:

- فقدان الوعي، طفح جلدي، سخونة، تفاقم أو مشاكل جديدة في التنفس؛

- مشاكل في الأذنين مثل رنين في الأذنين أو فقدان السمع.

انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية".

### الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال وللمراهقين دون عمر 18 سنة.

لا تتوفر معلومات بخصوص سلامة ونجاعة إستعمال هذا الدواء لدى أطفال ومراهقين دون عمر 18 سنة.

### التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

- أدوية مُدرّة للبول مثل حمض الإيتاكرينك، فوروسيميد أو مانيتول.

- أدوية أخرى التي قد تؤثر على الكلى، السمع، التوازن أو خفض قوة العضلات.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، فيجب الإمتناع عن إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم.

إشتيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء.

إذا أصبحت حاملاً خلال فترة إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم، أخبر الطبيب، وهو بدوره سيقدم لك الإستشارة حول توقفك عن إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم.

لا يعرف فيما إذا كان أميكاسين ينتقل إلى حليب الأم لدى بنى البشر. إذا كنت مرضعة، سيقدم لك طبيب الإستشارة حول توقفك عن الإرضاع أو توقفك عن العلاج بهذا الدواء.

### السيارة وإستعمال الماكينات

قد يؤدي اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم إلى دوار وإلى إضطرابات أخرى في التوازن، مثل دوار (فرتيغو) وإضطرابات في التوازن. يوصى بعدم السيارة أو تشغيل الماكينات خلال فترة إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم.

بعد 6 أشهر من العلاج، سيقدم لك الطبيب الإستشارة حول مواصلتك أو توقفك عن العلاج.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

### مدة العلاج

مدة العلاج القصوى هي 18 شهرًا.

### إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم

إذا كنت تستعمل موسّع للقصبات الهوائية، إستعمله أولاً قبل إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم.

كل قنينة صغيرة مخصصة للإستعمال لمرة واحدة فقط.

استعمل اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم فقط بواسطة لاميرا نيبوليزر هاندست ولا ميرا رأس مرشة المسؤولين لوحدة المراقبة الخاصة بـ لاميرا. انظر الفقرة 7 "تعليمات الإستعمال" -

كيفية إستعمال الدواء سوية مع لاميرا جهاز نيبوليزر.

- لا يجوز إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم مع أي نوع آخر لـ هاندست أو رأس مرشة.

- لا تدخل أدوية أخرى لداخل لاميرا نيبوليزر هاندست.

- لا يجوز شرب السائل الذي في القنينة الصغيرة.

- إقرأ تعليمات الإستعمال الواردة في نهاية هذه النشرة.

كيف ومتى تقوم بتبديل لاميرا نيبوليزر هاندست؟

يجب إستعمال لاميرا نيبوليزر هاندست واحد لدورة علاجية واحدة ذات 28 يوماً. يجب إستبدال رأس المرشة كل أسبوع. تتوفر 4 رؤوس مرشة في كل علبة كتون خاصة بـ اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم.

الرجاء قراءة تعليمات الإستعمال الخاصة بالمنتج للتقي معلومات بخصوص التنظيف والتخزين.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

عليك إستشارة الطبيب فوراً إذا كنت تشك بأنك لربما إستعملت أكثر مما ينبغي من هذا الدواء.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال الدواء

إذا نسيت إستعمال الدواء، فإستعمله بأسرع ما يمكن في نفس اليوم الذي فوت فيه المقدار الدوائي.

لا يجوز إستعمال أكثر من مقدار دوائي واحد في نفس اليوم للتوعيض عن المقدار الدوائي المنسي.

يجب الموازنة على العلاج حسب تعليمات الطبيب.

إذا توقفت عن إستعمال الدواء

عليك إستشارة الطبيب إذا قررت لأي سبب كان التوقف عن إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي

في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا

- كنت تقاسي من فرط حساسية أو من ردود فعل تحسسية شديدة عند إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم (مثلاً لديك إنخفاض في ضغط الدم، فقدان الوعي، طفح شديد في الجلد أو صفير خطير في التنفس وضيق تنفس خطير). إن شيع هذه الأعراض غير معروف.

- كنت تقاسي من تفاقم في مشاكل الإعتيادية في الرئتين أو من شد في الرئتين (طنين) أو صفير في التنفس أو صفير). قد يكون ذلك علامة لإلتهاب حاد في الرئتين الذي يتطلب علاجاً.

ومن الجائز أن يتوجب عليك التوقف عن إستعمال اريكيسيس ليپوزومال 590 ملغم. هذه الأعراض الجانبية الخطيرة هي شائعة حتى شائعة جداً.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعملين من بين 100)

- تلوث يسبب تفاقم حالة رئتيك.

- تزايد البلغم الخارج من الرئتين خلال السعال

- سعال صدرى

- صفير في الحنجرة

- ألم في الحنجرة

- فقدان الصوت

- تلوث فطري في الفم

- ألم في الفم

- تغير في حاسة التذوق

- إلتهاب في الرئتين

- صداع

- دوار

- الشعور بعدم ثبات

- إسهال

- غثيان

- تقيؤ

- جفاف في الفم

- قلة الشهية للطعام

- حكة في الجلد

- صمم

- رنين في الأذنين

- مشاكل في الكلي بما في ذلك خلل في الأداء الوظيفي الكلوي

- ألم في المفاصل

- ألم في العضلات

- طفح

- إرهاق

- إنزعاج في الصدر

- سخونة  
- إنخفاض في الوزن  
- أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000)  
- قلق

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية  
بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## (5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة وعلى ملصقة القنينة الصغيرة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

### شروط التخزين:

حرّن في البراد (8-2 درجات مئوية).

لا يجوز التجميد. يجب التخلص من أي قنينة صغيرة متجمدة.

إذا كان المقدار الدوائي الذي ترغب في إستعماله موجود في البراد، قم بإخراج القنينة الصغيرة من البراد ومكانها من بلوغ درجة حرارة الغرفة قبل أن تستعملها. بدلاً من ذلك، بالإمكان تخزين اريكيسيس ليپوزومال 590 ملخ بدرجة حرارة الغرفة دون 25 درجة مئوية، لكن فقط لفترة قدرها حتى 4 أسابيع. عند التخزين بدرجة حرارة الغرفة، يجب التخلص بعد 4 أسابيع من أي مستحضر لم يتم إستعماله.

هذا الدواء عبارة عن سائل أبيض حلبي داخل قنينة شفافة. لا تستعمل الدواء إذا لاحظت تغير في اللون أو بكتل صغيرة تطفو في القنينة الصغيرة.

لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو إلى القمامات المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

## (6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), cholesterol high purity (HP), sodium chloride, sodium hydroxide and water for injection.

### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

اريكيسيس ليپوزومال 590 ملخ عبارة عن معلق حلبي للإستنشاق بلون أبيض حتى أوف وايت، الذي يتوفّر ضمن قنينة صغيرة زجاجية ذات 10 مل مع سدادة مطاطية وغلاف معدني مع غطاء يمكن إزالته. تحتوي علبة الكرتون على 28 قنينة صغيرة التي تكفي لـ 28 يوماً؛ قنينة صغيرة واحدة لليوم. علبة كرتون واحدة من اريكيسيس ليپوزومال 590 ملخ تحتوي على 4 علب كرتون داخلية، حيث تحتوي كل واحدة منها على 7 قناني صغيرة ورأس مرشة واحد. كذلك تحتوي العلبة على لاميرا نيبوليزر هاندست واحد.

### إسم صاحب الإمتياز وعنوانه:

تروميد م.ض، شارعبني جاؤن 10، پارك الصناعة پولج ص.ب. 8105، نتانيا.

### إسم المنتج وعنوانه:

إنسميد هولندا BV، أوترخت، هولندا.

فُحصت ورخصت هذه النشرة من قبل وزارة الصحة في تاريخ أيار 2022.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

169-59-36844

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

## 7. تعليمات الإستعمال

اريكيسيس ليپوزومال 590 ملخ مخصص للإستنشاق عبر الفم بواسطة لاميرا جهاز نيبوليزر - Lamira nebuliser system.

قبل أن تستعمل لاميرا نيبوليزر الخاص بك، إحرص على قراءة وفهم المعلومات المفصلة في تعليمات الإستعمال الكاملة المرفقة لـ لاميرا جهاز نيبوليزر. هي ستتوفر معلومات شاملة أكثر حول طريقة تركيب، تحضير، إستعمال، تنظيف، وتعقيم النيبوليزر.

أشطف اليدين بالماء والصابون وجففهما جيداً.

قم بتركيب الـ هاندست بما في ذلك وصله بوحدة التحكم كما هو موضح في تعليمات الإستعمال الكاملة.

### تحضير الدواء للإستعمال:

1. يوصى بإخراج القنينة الصغيرة من البراد 45 دقيقة على الأقل قبل الإستعمال لتمكينها من بلوغ درجة حرارة الغرفة. لا يجوز إستعمال أدوية أخرى مع لاميرا نيبوليزر هاندست.

2. خذ قنانية اريكيسيس ليپوزومال 590 ملخ بشدة، حتى يبدو الدواء متجانساً بكامله ومخلطًا جيداً.

3. إرفع الغطاء البرتقالي عن القنينة الصغيرة وضعه جانباً (الرسم 1).



الرسم 1

4. أمسك الحلقة المعدنية التي على القanine الصغيرة وإسحبها بلطف نحو الأسفل إلى أن ينفصل جانب واحد عن القanine الصغيرة (الرسم 2).



الرسم 2

5. إسحب الحلقة المعدنية المحيطة برأس القanine الصغيرة بحركة دائيرية حتى تنفصل تماماً عن القanine الصغيرة (الرسم 3).



الرسم 3

6. ضع الحلقة المعدنية جانباً بعد فصلها. إنزع بحذر السداد المطاطية (الرسم 4).



الرسم 4

7. أسكب محتوى القanine الصغيرة من اريكيسيس ليپوزومال 590 ملخ داخل خزان الدواء الخاص بـ لاميرا نيبوليزر هاندست (الرسم 5).



الرسم 5

8.أغلق خزان الدواء (الرسم 6).



الرسم 6

9. إجلس بوضعية هادئة وبشكل منتصب. يسهل هذا الأمر على الإستنشاق ويساعد الدواء على دخول رئتيك.

10. أدخل الفوهة وإستنشق بشكل بطيء وعميق. ومن ثم، تنفس بشكل عادي بشهيق وزفير عبر الفوهة حتى إتمام العلاج. من المفترض أن يستغرق العلاج حوالي 14 دقيقة لكن يمكن أن يستمر حتى 20 دقيقة. إحرص على مسك الـ هاندست بشكل مستوٍ طول فترة العلاج (الرسم 7).



الرسم 7