

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986
يُسوّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

جابايپنتين تيغع 300 ملغ كبسولات	جابايپنتين تيغع 400 ملغ كبسولات
التركيبية	التركيبية
تحتوي كلّ كبسولة على: <p>جابايپنتين 300 ملغ</p> <p>Gabapentin 300 mg</p>	تحتوي كلّ كبسولة على: <p>جابايپنتين 400 ملغ</p> <p>Gabapentin 400 mg</p>

للتصول على معلومات عن المركبات غير الفعّالة ومسبّبات الأربيّة، انظر البند 2 "معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتّى نهابتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للأخرين. قد يضرّهم الدواء حتّى لو بدا لك أنّ حالتهم الطيّيبة مشابهة.

هذا الدواء مخصّص لعلاج الصرع لدى البالغين والمراهقين الذين سنهم فوق 12 عامًا. هذا الدواء مخصّص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى البالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

1. لأيّ عرض مخصّص هذا الدواء؟

الصرع:

لعلاج إضافي للنوبات الجزئية المصحوبة أو غير المصحوبة بتعميم ثانوي لدى البالغين والمراهقين (من سن الـ 12 فما فوق) المصابين بالصرع.
سيصف لك الطبيب جابايپنتين تيغع للمساهمة في علاج الصرع لديك عندما لا يتيح العلاج الحالي الذي تتلقاه السيطرة التامة على وضعك.

آلام الاعتلال العصبي:

لعلاج آلام الاعتلال العصبي في الاعتلال العصبي السكري أو الاعتلال العصبي التالي للهربس (neuralgia) لدى البالغين.

سيصف لك الطبيب جابايپنتين تيغع لعلاج ألم الاعتلال العصبي (ألم مزمن ينجم عن ضرر عصبي) بعد الإصابة بالهربس النطاقي أو نتيجة للسكري لدى البالغين.

قد توصف أحاسيس الألم بأنّها:

إحساس بالحرق، إحساس بالذّع، ألم خفاق، ألم فجائي، إحساس بالطنع، ألم حاذ، تقلّصات، إحساس بالوخز، انعدام الإحساس (خدر)، الإحساس "بالدبابيس والإبر" وما شابه ذلك.

الفصلية العلاجية: مصادد للاختلاجات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسيّة (أربيّة) للمادّة الفعّالة (جابايپنتين) أو لأيّ من المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء. انظر البند 6.

تحذيرات خاصّة تتعلّق باستعمال الدواء

قبل العلاج جابايپنتين تيغع، أخبر الطبيب إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعاً. انظري "الحمل، الإرضاع والخصوبة" تحت البند 2.
- كنت تعاني من مشاكل في الكليتين. يُحتمل أن يغير الطبيب البرنامج العلاجي.
- كنت تخضع للعلاج بالديال الموي (لطرد الفضلات في أعقاب قصور الكليتين). أخبر الطبيب إذا نشأ لديك ألم وأو ضعف في العضلات.
- نشأت لديك علامات مثل آلام متواصلّة في البطن، غثيان وتقيؤات. توجه فوراً إلى الطبيب لأن هذه قد تكون أعراضاً لالتهاب البنكرياس الحاد.
- كنت تعاني من اضطراب من عدّة أنواع من الاختلاجات التي تشمل النوبات من نوع "الغبية" ("absence").

وُجدت لديك اضطرابات في الجهاز العصبي، اضطرابات في التنفّس، أو إذا كان عمرك فوق الـ 65. قد يصف لك الطبيب نظام تجريع مختلفاً.

تمّ التبليغ عن حالات من الاعتماد على جابايپنتين ومعاقرته في الدراسات التي أُجريت بعد التسويق. أخبر الطبيب إذا كان لديك ماضٍ من الاعتماد أو المعاقرة.

نشأت أفكار انتحارية أو أفكار للإضرار بالنفس بالوقت الذي عدت قليل من المرضى الذين عولجوا بادوية مضادّة للصرع مثل جابايپنتين. توجه فوراً إلى الطبيب إذا وُجدت لديك أفكار كهذه.

معلومات هامّة عن ردود فعل خطيرة محتملة

ينشأ رد فعل تحسسي أو رد فعل جلدي خطير لدى عدد قليل من المرضى الذين يتلقون العلاج جابايپنتين، وقد يتطور هذان إلى مشكلة أكثر خطورة إذا لم يتمّ علاجهما. يجب عليك أن تعرف الأعراض لكي تستطيع أن تميّزها خلال فترة العلاج جابايپنتين تيغع.

اقرأ وصف هذه الأعراض في البند 4: "الأعراض الجانبية" تحت "**يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية بعد تناول الدواء لأنّها قد تكون خطيرة**".

توجّه فوراً إلى الطبيب في حالات ضعف العضلات، الحساسيّة في العضلات أو الألم في العضلات وخاصّةً إذا شعرت بالتزامن مع ذلك بأنك مريض أو أنّ حركاتك مرتفعة. قد تكون هذه علامات على انحلال غير سويّ للعسلد قد يشكّل خطراً على الحياة ويسبّب مشاكل في الكليتين. بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن يطرأ تغيير على لون البول وتكون هناك تغيرات في نتائج فحص الدم (ارتفاع في مستويات كرياتين فسفوكيناز في الدم).

الأدوية الأخرى وجابايپنتين تيغع

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

خاصةً إذا كنت تستعمل الأن أو استعملت مؤخرًا:

- أدوية للاختلاجات، لاضطرابات النوم، للاكتئاب، للقلق أو لأي مشاكل عصبية أو نفسية.
- أدوية من فصيلة الأفيونات مثل المورفين - قد تزيد هذه من تأثير جابايپنتين تيغع. بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب دمج جابايپنتين تيغع مع الأفيونات ميلاً إلى النوم، تعبًا (تهدئة)، انخفاضًا في وتيرة التنفس أو موتًا.

قد يسبب تناول جابايپنتين تيغع بالتزامن مع مضادات الحموضة التي تحتوي على الألومينيوم والمنيزيوم انخفاضًا في امتصاص جابايپنتين تيغع من المعدة. لذلك يوصى بتناول جابايپنتين تيغع بعد ساعتين على الأقلّ من تناول مضادات الحموضة.

من غير المتوقع أن يؤثّر جابايپنتين تيغع على فعاليّة الأدوية الأخرى المضادّة للصرع أو حبوب منع الحمل.

قد يؤثّر جابايپنتين تيغع على نتائج فحوص مخبريّة معيّنة. إذا تعيّن عليك إعطاء فحص بول، فأخبر الطبيب أو الطاقم الطبي عن الأدوية التي تستعملها.

استعمال الدواء والطعام

يُستعمل الدواء مع الطعام أو بدونه.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، إذا كنت تظنّين أنّك قد تكونين حاملاً أو إذا كنتِ تخططين للحمل.

الحمل

لا يجوز استعمال جابايپنتين تيغع خلال فترة الحمل، إلا إذا قال لك الطبيب غير ذلك. يتوجّب على النساء في سنّ الخصوبة استعمال وسائل فعّالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بالدواء.

لم يتمّ إجراء دراسات على استعمال هذا الدواء لدى النساء الحوامل. لكن تمّ التبليغ عن ارتفاع في خطر حدوث ضرر للطفل الأخذ في التطور عند استعمال أدوية أخرى لعلاج الاختلاجات، خاصّةً عند استعمال أكثر من دواء واحد بشكل متزامن لعلاج الاختلاجات. لذلك، وبقدر الإمكان، يجب محاولة استعمال دواء واحد لمنع الاختلاجات خلال فترة الحمل فقط عند استشارة الطبيب.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا حملت خلال فترة العلاج بالدواء، إذا كنتِ تظنّين أنك قد تكونين حاملاً أو كنتِ تخططين للحمل خلال فترة استعمال الدواء.

لا يجوز إيقاف العلاج بهذا الدواء بشكل فجائي لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور الاختلاجات من جديد، والتي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة عليك وعلى طفلك.

الإرضاع

ينتقل جابايپنتين تيغع عبر حليب الأم. بما أن تأثيره على الطفل الرضيع غير معلوم، فيوصى بعدم الإرضاع خلال فترة استعمال جابايپنتين تيغع.

الخصوبة

في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات لم يكن هناك تأثير على الخصوبة.

السياقة واستعمال الماكنتات

استعمال هذا الدواء قد يسبب الدوار، النعاس والتعب.

يجب عليك الامتناع عن السياقة، تشغيل الماكنتات أو القيام بنشاطات أخرى من شأنها أن تكون خطيرة، حتى تعرف كيف يؤثّر الدواء عليك وعلى قدرتك على تنفيذ هذه الأعمال.

معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء

يحتوي الدواء جابايپنتين تيغع بجرعة 300 ملغ على صيغ أصفر رقم 6

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّداً من الجرعة الدوائية ومن كفيّة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكفيّة العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية المتّبعة هي:

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة، كما حدّد من قبل الطبيب المعالج.

سيتمّ عادةً إعطاء الجرعة الدوائية، التي سيحددها لك الطبيب، بشكل تدريجيّ. تتراوح الجرعة الدوائية الابتدائية بين 300 ملغ إلى 900 ملغ في اليوم. بعد ذلك قد يأمرك الطبيب برفع الجرعة الدوائية، إلى أن تصل إلى جرعة دوائية يوميّة قصوى من 3600 ملغ، مقسّمة إلى 3 جرعات منفردة، يعني مرّة واحدة في الصباح، مرّة واحدة في الظهر ومرّة واحدة في المساء.

هذا الدواء مخصّص لعلاج الصرع لدى البالغين، المراهقين والأولاد الذين عمرهم أكثر من 12 عامًا.

هذا الدواء مخصّص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى البالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين أو كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي

قد يصف لك الطبيب جرعة دوائيةً وأو نظام تجريع مختلفين.

إذا كان عمرك أكثر من 65 عامًا

عليك تناول جرعة جابايپنتين تيغع الدوائية المتّبعة إلّا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين. قد يصف لك الطبيب جرعة دوائيةً وأو نظام تجريع مختلفين إذا كنت تعاني من مشاكل في الكليتين.

إذا كان لديك انطباع بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب دائماً بلع الكبسولة بأكملها مع الكثير من الماء.

لا يجوز فتح الكبسولة ونثر محتواها لأنه لم يتم فحص تأثير أشكال الإعطاء هذه.

يوصى بتناول جابايپنتين تيغع بعد ساعتين على الأقلّ من تناول مضادات الحموضة.

يجب الاستمرار في استعمال جابايپنتين تيغع إلى أن يرشدك الطبيب إلى التوقف عن ذلك. **إذا تناولت خطأ جرعة دوائيةً أكبر من اللازم**

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخضرك معك عبوة الدواء.

قد يسبب تناول جرعة دوائيةً مفرطة إلى ازدياد الأعراض الجانبية بما في ذلك فقدان الوعي، الدوار، الرؤية المزدوجة، الكلام (النطق) غير الواضح، النعاس والإسهال.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب فيجب تناول جرعة فور تنذكرك إلّا إذا حان

موعد الجرعة التالية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة بأيّ حال من الأحوال للتعويض عن الجرعة المنسيّة. يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتّى لو طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا تتوقف عن استعمال الدواء إلا بموجب أمر من الطبيب. إذا كان عليك إيقاف العلاج فيجب فعل ذلك بشكل تدريجي طوال أسبوع على الأقلّ. إذا توقّفت عن استعمال الدواء بشكل فجائيّ أو قبل تلقّي إرشاد إلى فعل ذلك من الطبيب فسيزداد خطر حدوث الاختلاجات.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة **في كلّ مرّة تتناول فيها دواء**. ضع النظارات الطيّيبة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية

مثل أيّ دواء، قد يؤدي استعمال جابايپنتين تيغع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستهلكين. لا تتلق قد قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب إذا نشأ لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية بعد تناول الدواء لأنّها قد تكون خطيرة:

- رد فعل تحسّسيّ خطير في الجلد يتطلّب علاجاً فورياً، انتفاخ الشفتين والوجه، طفح جلديّ واحمرار وأو/وتساقط الشعر (قد تكون هذه أعراضاً لردّ فعل تحسّسي خطير).
- ألم متواصل في البطن، غثيان وتقيؤ - لأنّ هذه قد تكون أعراضاً لالتهاب البنكرياس الحادّ.
- مشاكل في التنفّس، وإذا كانت خطيرة فقد تحتاج إلى علاج طارئ لكي تستمرّ في التنفّس بشكل عادي.

قد يسبّب جابايپنتين تيغع رد فعل تحسّسيّاً خطيراً أو يشكّل خطراً على الحياة ومن شأنه أن يؤثّر على الجلد أو على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد أو خلايا الدم. قد يظهر الطفح، أو لا يظهر، كجزء من ردّ الفعل هذا. من المحتمل أن تضطرّ إلى الوقود في المستشفى أو التوقف عن استعمال جابايپنتين تيغع نتيجة لردّ الفعل هذا. راجع الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية:

- طفح جلديّ
- شرى
- حمّى
- تورم أو يتلاشى في الغنّد
- انتفاخ الشفتين واللسان
- اصفرار الجلد أو بياض العينين
- ظهور كدمات شاذة أو نزيف دمويّ شاذّ
- تعب أو ضعف شديدين
- ألم غير متوقّع في العضلات
- تلوّثات متواترة

قد تكون هذه الأعراض علامات أوليّة على ردّ فعل خطير. يجب أن يقوم طبيب بفحصك ويتأخذ قرار بشأن ما إذا كنت تستطيع أن تستمرّ في استعمال الدواء.

إذا كنت تخضع للعلاج بالديال الدموي، فأخبر الطبيب إذا نشأ لديك ألم وأو/ضعف في العضلات.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًّا (تظهر لدى أكثر من شخص 1 من كلّ 10 أشخاص):

- تلوّث فيروسيّ
- شعور بالنعاس، دوار، انعدام التنسيق الحركيّ
- شعور بالتعب، حمّى

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من كلّ 10 أشخاص):

- التهاب الزنتين، تلوّثات في المسالك التنفسية، تلوّثات في المسالك البولية، التهاب الأذنين أو تلوّثات من نوع آخر
- تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء
- قيم (أنوريكسيا)، زيادة في الشهية
- غضب تجاه الآخرين، ارتباك، تغيرات في المزاج، اكتئاب، قلق، عصبية، صعوبة في التفكير
- اختلاجات، حركات لا إرادية، صعوبات في الكلام (النطق)، فقدان الذاكرة، ارتعاش، صعوبات في النوم، صداع، جلد حسّاس، انعدام الإحساس (خدر)، صعوبات في التنسيق الحركي، حركات غير عادية لليدين، تزايد أو تضؤل أو انعدام المنعكسات
- رؤية مشوشة، رؤية مزدوجة

- دوار (فيرتيجو)
- ضعف دم مرتفع، تورّد (احمرار الوجه) أو توسّع الأوعية الدموية
- صعوبات في التنفّس، التهاب القصبات، ألم في الحلق، سعال، جفاف في الأنف
- تقيؤ، غثيان، مشاكل في الأسنان، التهاب اللثة، إسهال، ألم في البطن، عسر الهضم، إمساك، جفاف في الفم أو الحلق، غزرات
- انتفاخ الوجه، كدمات، طفح جلديّ، حكة، حبّ الشباب
- ألم في المفاصل، ألم في العضلات، ألم في الظهر، تشنجات
- ضعف جنسي لدى الرجال
- انتفاخ في الرجلين والذراعين، صعوبات في المشي، ضعف، ألم، شعور بالمرض، أعراض شبيهة بالإنفلونزا
- انخفاض في كمّيّة خلايا الدم البيضاء، ارتفاع الوزن
- إصابة عارضة، كسر، خدش

- أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من كل 100 شخص):**
- عدم الهوء (حالة من التململ المزمّن والحركات غير المقصودة والعدمية الهيدف)
- ردّ فعل تحسّسي مثل الشرى
- انخفاض في الحركة
- نفض سريع
- صعوبة في البلع
- انتفاخ قد يشمل الوجه، الجسم والأطراف
- نتائج شاذة في فحوص الدم تشير إلى وجود مشاكل في الكبد
- مشاكل نفسية
- سقطات
- ارتفاع في مستوى الجلوكوز في الدم (يُشاهد غالبًا لدى متلقي العلاج المصابين بالسكري)

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من كل 1.000 شخص):

- انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم (يُشاهد غالبًا لدى متلقي العلاج المصابين بالسكري)
- فقدان الوعي
- صعوبة في التنفّس، انفاص ضحلة (تنبيط تنفسي)
- أعراض جانبية تمّ التبليغ عنها بعد تسويق الدواء ومدى شيوها غير معروف:**
- انخفاض في مستوى الصفائح الدموية
- أفكار انتحارية
- هلوسات
- حركات جسمانية شاذة مثل اللتواء، حركات لا إرادية وتصلّب
- طنين في الأذنين
- مجموعة من الأعراض الجانبية التي قد تشتمل على غدد ليمفاوية منتفخة، حمّى، طفح جلدي والتهاب في الكبد، والتي تظهر سويةً
- اصفرار الجلد وبياض العينين (يرقان)، التهاب الكبد
- قصور كلوي حاد، سلس البول
- تضخّم نسيج الثدي، تضخّم الثديين
- الأعراض الجانبية الناتجة عن إيقاف فجائيّ للعلاج جبابايپنتين تيغع (قلق، صعوبات في النوم، غثيان، ألم، تعرق، ألم في الصدر
- انحلال الألياف العضليّة (انحلال الربيدات)
- تغير في نتائج فحص الدم (ارتفاع في مستويات كرياتين فسفوكيناز)
- مشاكل في الأداء الوظيفي الجنسي بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الإشباع، تأخير القذف

- مستوى منخفض للصبوديوم في الدم
- تأق (رد فعل تحسسي خطير ويشكّل خطرًا على الحياة، يشتمل على صعوبات في التنفّس، انتفاخ الشفتين، الحلق واللسان، وضعف دم منخفض مما يستلزم علاجًا طارئًا)
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**
- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الإستامرة المتّصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- يجب تخزين الدواء في مكان جافّ فيما دون 25°C.
- امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعّالة أيضًا على:

جابايپنتين تيغع 300 ملغ:

Talc, pregelatinized starch, FD&C red 3, FD&C yellow 6, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

جابايپنتين تيغع 400 ملغ:

Talc, pregelatinized starch, red iron oxide, yellow iron oxide, black iron oxide, titanium dioxide, gelatin, printing ink.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

جابايپنتين تيغع 300 ملغ: كبسولة جيلاتين صلبة، برتقالية اللون، مليئة بمسحوق لونه أبيض-كريمي يحتوي على كتل صغيرة. مطبوع على جسم الكبسولة وعلى غطائها: 93 و-39.

جابايپنتين تيغع 400 ملغ: كبسولة جيلاتين صلبة، بنية اللون، مليئة بمسحوق لونه أبيض-كريميّ يحتوي على كتل صغيرة. مطبوع على جسم الكبسولة وعلى غطائها: 93 و-40.

ليعاً الدواء في شرائط (بليستر) في عبوة تحتوي على 100 كبسولة.

اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:

تيغع إسرائيل م.ض.، شارع دفوره هانيقينه 124، تل أبيب 6944020

تمّ تحرير النشرة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقما تسجيل الدواءين في سجلّ الأدوية السريريّ في وزارة الصحة:

جابايپنتين تيغع 300 ملغ: 194-29956-46

جابايپنتين تيغع 400 ملغ: 219-29937-47

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكل الجنسين.

GABA 300 mg 400 mg PIL MW1022

teva