

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ميتفورمين تيفغ

أقراص

التركيبيه

يحتوي كل قرص على:

ميتفورمين هيدروكلوريد 850 ملغ

(Metformin Hydrochloride 850 mg)

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة انظر الفصل 6 - "معلومات إضافية".

هذه النشرة **إبامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء**. تحتوي الفرء النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

قد وُصِفَ هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تطعه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج السكري من النوع 2، خاصةً لدى متلقي العلاج الذين يعانون من الوزن الزائد، حيث لا يكفي استعماله كعلاج وحيد أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

• لدى البالغين، يتماسل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

• لدى الأولاد من سن الـ 10 والمراهقين، يستعمل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

شُهدَ انخفاض في مضاعفات السكري لدى متلقي العلاج البالغين الذين يعانون من السكري من النوع 2 ومن الوزن الزائد وعولجوا بميتفورمين كخط علاجي أول بعد فشل تعبير التغذية وممارسة الرياضة لوزنهم لاستقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

• لدى البالغين، يتماسل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

• لدى البالغين، يتماسل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

• لدى البالغين، يتماسل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

• لدى البالغين، يتماسل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

• لدى البالغين، يتماسل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

• لدى البالغين، يتماسل ميتفورمين تيفغ بحسب دواعي استعماله كعلاج أساسي أو بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج السكري بالإعطاء عن طريق الفم أو مع الإنسولين.

2. ليجوز استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (ميتفورمين) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).
- وُجدت لديك مشاكل في الكبد.
- كنت تعاني من خلل شديد في وظيفة الكلية.
- كنت تعاني من سكري غير متوازن مصحوب على سبيل المثال ب: فرط السكر الحظيري في الدم (مستويات مرتفعة للجلوكوز في الدم)، غثيان، تقيؤ، إسهال، انخفاض سريوع في الوزن، حمّاض لاكتيكبي (انظر أدناه "خطر نشوء الحمض اللاكتيكبي") أو حمّاض كيتوني.
- الحمّاض الكيتونيّ هو وضعٌ تتراكم فيه المواد المسماة "أحماض الكيتون" في الدم، مما قد يؤدي إلى حالة ما قبل الغيبوبة السكرية. تشتمل الأعراض على: ألم في البطن، تنفس سريع وعميق، ميل إلى النوم أو راحة فواكه شاذة في الفم.
- فقدت جسمك كمية أكبر من اللازم من السوائل (تجفاف)، مثلًا: نتيجةً للإسهال الشديد أو المتواصل أو التقيؤات المتعاقبة. قد يؤدي التجفاف إلى مشاكل في الكليتين، والتي قد تزيد من خطر نشوء الحمض اللاكتيكبي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").
- كنت تعاني من ثلوث خطير مثل ثلوث يوتر على الترتين/ الجهاز التنفسي/ الكليتين. قد تؤدي التلوثات الخطيرة إلى مشاكل في الكليتين، والتي قد تزيد من خطر نشوء الحمض اللاكتيكبي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

• كنت تعاني من قصور القلب الحظيري، أصبت مؤخرًا بنوبة قلبية، كنت تعاني من مشاكل خطيرة في النورة الدموية (مثل الصدمة) أو كنت تعاني من صعوبات في التنفس. قد تؤدي هذه الحالات إلى نقص في توريد الأوكسجين بالأكسجين، مما قد يسبب خطر نشوء الحمض اللاكتيكبي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

• كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول. إذا انطبق عليك واحد أو أكثر من بين الأوضاع الواردة أعلاه، فاستشر الطبيب قبل البدء بالعلاج بهذا الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بميتفورمين تيفغ وخالته أخبر الطبيب إذا:

- كنت على وشك الخضوع لفحص مثل التصوير بالأشعة السينية (رتنجن) أو المسح الذي يتطلب حقن مادة تباين تحتوي على اليود في دمك.
- كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
- يجب عليك التوقف عن استعمال ميتفورمين تيفغ لفترة معينة قبل الخضوع للجراحة وبعدها. سيقرر طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى علاج آخر في هذه الفترة الزمنية. من المهم أن تتفّذ تعليمات الطبيب بحذائرها.

خطر نشوء الحمّاض اللاكتيكبي

قد يسبب ميتفورمين تيفغ عرضًا جانبيًا نادرًا جدًا لكنه أيضًا خطر جدًا، يسمى الحمّاض اللاكتيكبي، خاصةً إذا لم تكن كليتك تُوَدِينُ وظيفتها كما ينبغي. يزداد خطر نشوء حمّاض لاكتيكبي أيضًا في الأوضاع التالية: عندما يكون السكري غير متوازن، ثلوثات خطيرة، صوم متواصل، استهلاك الكحول بشكل مبالغ فيه، تجفاف (انظر التفصيل أدناه)، مشاكل في الكبد وعند وجود أي وضع طبي يقل فيه توريد أعضاء الجسم بالأكسجين (مثل مرض قلبي حاد وخطير).

إذا انطبق عليك واحد أو أكثر من بين الأوضاع الواردة أعلاه، فاستشر الطبيب للحصول على إرشادات إضافية.

يجب التوقف عن استعمال ميتفورمين تيفغ لفترة قصيرة، إذا كنت تعاني من وضع يمكن أن يكون مرتبطًا بالتجفاف (فقدان لمحوظ للسوائل) مثل: تقيؤات كثيرة، إسهال، حمى، تعرّض للحرق أو إذا كنت تستهلك المشروبات بشكل أقل من المعتاد. استشر الطبيب للحصول على إرشادات إضافية.

يجب التوقف عن استعمال ميتفورمين تيفغ والتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى فورًا، إذا شعرت ببعض أعراض الحمّاض اللاكتيكبي، لأن هذا الوضع قد يسبب الغيبوبة. تشتمل أعراض الحمّاض اللاكتيكبي على:

- قيءات
- ألم في البطن
- تقلصات في العضلات

- شعور عام غير جيد مصحوب بتعب شديد
- صعوبات في التنفس
- انخفاض في النبض وفي درجة حرارة الجسم
- الحمّاض اللاكتيكبي عبارة عن حالة طوارئ طبية تستوجب العلاج في المستشفى.

إذا كان عليك الخضوع لعملية جراحية كبيرة، فعليك أن تتوقف عن تناول ميتفورمين تيفغ أثناء الإجراء ولفترةٍ ما بعده. سيقرر طبيبك متى عليك إيقاف العلاج بميتفورمين تيفغ ومتى عليك البدء به من جديد.

• لا يسبب ميتفورمين تيفغ كعلاج أحادي نقص السكر في الدم (مستوى جلوكوز أقل من اللازم في الدم). لكن، إذا كنت تستعمل ميتفورمين تيفغ سوياً مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي من شأنها أن تسبب نقص سكر الدم (مثل سولفونليوريا، إنسولين، ميثيلينيديات)، فهناك خطر لنشوء نقص سكر الدم. إذا شعرت بأعراض نقص سكر الدم مثل: الضعف، الدوار، التعرق المتزايد، النضرب السريع، اضطرابات الرؤية أو الصعوبات التركيز - فإن شرب أو تناول غذاء يحتوي على السكر يساعدان عادةً في هذه الحالة.

الفعوص والمتابعة

• سيجري طبيبك فحوصًا منتظمة لمستويات الجلوكوز في الدم وسيحدد جرعة ميتفورمين تيفغ وفقًا لها. يجب الحرص على التحدث مع الطبيب بشكل روتيني. هذه المراقبة مهمة خاصةً لدى الأولاد، المراهقين والمسنين.

• خلال فترة العلاج بميتفورمين تيفغ سيقيم طبيبك بفحص وظائف كليتيك مرة واحدة في السنة على الأقل أو بوتيرة أكبر إذا كنت مسنًا و/أو إذا ساعات وظيفة كليتيك.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كان عليك تلقّي مادة تباين تحتوي على اليود بالحقن في الدم، مثلًا لغرض التصوير بالأشعة السينية (رتنجن) أو المسح، فعليك التوقف عن استعمال ميتفورمين تيفغ قبل الحقن أو خلاله. سيقرر طبيبك متى عليك إيقاف العلاج بميتفورمين تيفغ ومتى عليك البدء به من جديد.

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد تحتاج إلى مراقبة بتواتر أكبر لمستويات الجلوكوز في الدم ولوظيفة الكليتين، أو أن طبيبك سيلائم لك جرعة ميتفورمين تيفغ الدوائية. أخبر الطبيب أو الصيدلي خاصةً إذا كنت تستعمل:

- أدوية تزيد من كمية البول (مدرات البول).
- أدوية لعلاج الألم والتهاب NSAID) ومثبطات COX-2، مثل: إيبوبروفين، سيليكوكسيب).
- أدوية معينة لعلاج فرط ضغط الدم (مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE، حاصرات مستقبل الأنجيوتنسين II).
- ناهضات مستقبل بيتا-2 مثل: سالبوتامول أو تيربوتالين (لعلاج الربو).
- كورتيكوستيرويدات (لعلاج أوضاع مختلفة، مثل: التهاب الجلد الحظير أو الربو).
- أدوية قد تغير مستوى ميتفورمين في دمك، خاصةً في حالة تدني الوظيفة الكلوية (مثل: فبراياميل، ريفامبيسين، سيميبتيدين، دولوتيجرافير، رانولازين، تريمتوبريم، فانديناتيب، إيسايفكونازول، كبريتونيب، وأولياريب).
- أدوية أخرى لعلاج السكري.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول ميتفورمين تيفغ مع وجبة الطعام أو بعدها مباشرةً، من أجل منع نشوء أعراض جانبية في الجهاز الهضمي.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

امتنع عن الاستهلاك المفرط للكحول خلال فترة العلاج بميتفورمين تيفغ، لأنه قد يطرأ ارتفاع في خطر نشوء الحمّاض اللاكتيكبي (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

الحمل والإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت حاملاً، تطئين أنك حامل أو تخططين للحمل، لكي يقرر ما إذا كنت هناك حاجة لتغيير علاجك أو مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم.

لا يوصى باستعمال ميتفورمين تيفغ إذا كنت مرضعًا أو تخططين للإرضاع.

السياقة واستعمال الماكنت

لا يسبب ميتفورمين تيفغ بمفرده نقص سكر الدم (مستوى جلوكوز منخفض أكثر من اللازم في الدم)، ولذلك لا ينبغي أن يؤثر الدواء على قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكنت. لكن، يجب توخي الحذر إذا كنت تستعمل ميتفورمين تيفغ سوياً مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي من شأنها أن تسبب نقص سكر الدم (مثل: سولفونليوريا، إنسولين، ميثيلينيديات). تشتمل أعراض نقص سكر الدم على ضعف، دوار، تعرق متزايد، نضض سريع، اضطرابات الرؤية أو صعوبات في التركيز. لا تعد السياقة أو تستعمل الماكنت إذا بدأت تشعر بهذه الأعراض.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء. الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. ميتفورمين تيفغ ليس بديلًا لانتهاج نمط حياة صحي. يجب اتباع إرشادات التغذية التي أوصى بها الطبيب، والحرص على ممارسة النشاط البدني المنتظم.

الجرعة الدوائية المعتيية هي:

الأولاد من سن الـ 10 فما فوق والمراهقون:

الجرعة الدوائية الابتدائية عادةً هي 500 ملغ أو 850 ملغ مرة واحدة في اليوم. الجرعة الدوائية اليومية القصوى هي 2,000 ملغ في اليوم مقسمة إلى 2 أو 3 جرعات. يوصى بعلاج الأولاد الذين يتراوح عمرهم بين الـ 12-10 عامًا فقط إذا أُرشدَ الطبيب إلى ذلك بشكل صريح لأن الخبرة في هذه الفئة العمرية محدودة.

البالغون:
الجرعة الدوائية الابتدائية المتبعة عادةً هي 500 ملغ أو 850 ملغ 2-3 مرات في اليوم.
الجرعة الدوائية اليومية القصوى هي 2,550 ملغ في اليوم، مقسمة إلى 3 جرعات.
إذا كنت تعاني من خلل في الوظيفة الكلوية، فقد يصف لك الطبيب جرعة دوائية أقل.

إذا كنت تتلقى العلاج بالإنسولين أيضًا، فسيرشك الطبيب إلى كيفية البدء بالعلاج بميتفورمين تيفغ.

• لا يجوز شطر قرص ميتفورمين تيفغ **850 ملغ**. عندما تكون هناك حاجة إلى جرعة **500 ملغ**، فيجب استعمال الدواء الذي يحتوي على **850 ملغ** من ميتفورمين والذي يمكن شطره (للحصول على جرعة **425 ملغ**)، ومن شأنه أن يشكّل بديلًا **لقرص يحتوي على 500 ملغ**.
• **ينمى تجاوز الجرعة الموصى بها.**
• **كيفية تناول ميتفورمين تيفغ**

يجب تناول ميتفورمين تيفغ مع وجبة الطعام أو بعدها مباشرةً، من أجل منع نشوء أعراض جانبية في الجهاز الهضمي. يجب بلع القرص مع كأس ماء.

- إذا كنت تستعمل جرعة واحدة في اليوم، فتناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).
- إذا كنت تستعمل الدواء مرتين في اليوم، فتناوله في الصباح (مع وجبة الفطور) وفي المساء (مع وجبة العشاء).
- إذا كنت تستعمل الدواء 3 مرات في اليوم، فتناوله في الصباح (مع وجبة الفطور)، في الظهيرة (مع وجبة الغداء) وفي المساء (مع وجبة العشاء).

كيفية التناول

الهرس/ الشطر/ المضغ:

لا يجوز شطر، مضغ أو هرس القرص.

إذا ظننت، بعد مدة من الزمن، أن تأثير ميتفورمين تيفغ أقوى أو أضعف من اللازم، فاستشر الطبيب.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم

إذا تناولت جرعة مفرطة فقد تعاني من حمّاض لاكتيكبي. أعراض الحمّاض اللاكتيكبي ليست محددة مثل: التقيؤات، الألم في البطن مع التقلصات في العضلات، التورع (شعور عام غير جيد) المصحوب بتعب شديد وصعوبات في التنفس. تشتمل الأعراض الإضافية انخفاضًا في النبض وفي درجة حرارة الجسم. إذا نشأت لديك هذه الأعراض، فيجب التوجه فورًا لتلقي العلاج الطبي، لأن الحمّاض اللاكتيكبي قد يسبب الغيبوبة. **توقف فورًا عن تناول ميتفورمين تيفغ وتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.**

إذا نشأت لديك جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا **تسميت تناول الدواء في الوقت المحدد**، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعبويض عن جرعة منسية. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.
لا يجوز تناول الأدوية في العتمة!
راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ميتفورمين تيفغ إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلقَ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

قد يسبب ميتفورمين تيفغ عرضًا جانبيًا نادرًا جدًا (كأنه يظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين الـ 10,000 عرض) أيضًا خطير جدًا يسمى الحمّاض اللاكتيكبي (انظر في الفصل 2 "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء"). إذا حدث **ألم العرض فيجب التوقف عن استعمال ميتفورمين تيفغ والتوجه فورًا إلى الطبيب أو المستشفى،** لأن الحمّاض اللاكتيكبي قد يسبب الغيبوبة.

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة)

• اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل: غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم في البطن وفقدان الشهية. تحدث هذه الأعراض عادةً في بداية العلاج بميتفورمين تيفغ. بالإمكان التخفيف من هذه الأعراض عن طريق تقسيم الجرعة الدوائية على مدار اليوم وكذلك عن طريق تناول الدواء مع وجبة الطعام أو مباشرةً بعدها. إذا استمرت الأعراض، فتوقف عن استعمال ميتفورمين تيفغ واستشر الطبيب.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-1 مستعمل من بين 100)

- تغيرات في حساسة الذوق.
- انخفاض أو مستويات منخفضة لقيّامين B12 في الدم [قد تشتمل الأعراض على تعب شديد، لسان مؤلم وأحمر (التهاب في اللسان - جلوسيتيس)، إحساس بالتمثيل (مثل) أو جلد شاحب أو أصفر]. قد يجري طبيبك عدة فحوص من أجل اكتشاف المسبب للأعراض لأن بعضها قد ينجم أيضًا عن السكري أو عن مشاكل صحية أخرى.

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000)

- حمّاض لاكتيكبي. مضاعفة نادرة جدًا لكنها خطيرة جدًا، خاصةً إذا لم تكن كليتك تُوَدِينُ وظيفتها كما ينبغي. أعراض الحمّاض اللاكتيكبي ليست محددة (انظر في الفصل 2 "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء") وأيضًا في بداية هذا الفصل).
- شذوذ في فحوص وظائف الكبد أو يرقان (التهاب الكبد الذي قد يسبب التعب، فقدان الشهية، نقصان لون مع أو بدون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا نشأت لديك هذه الأعراض، **فيجب التوقف عن استعمال ميتفورمين تيفغ ومراجعة طبيبك.**

- رد فعل جلدي مثل: احمرار في الجلد (حمامى)، حكة أو طفح جلدي متفرق للحكة (شرى).

الأولاد والمراهقون

أظهرت المستويات المحدودة بخصوص الأولاد والمراهقين أن الأعراض الجانبية مشابهة في طبيعتها وخطورتها لتلك التي بُلِّغَ عنها لدى البالغين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق النخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسممًا هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستعفن التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف، فيما دون 25°C.**
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Povidone K-30, hypromellose, titanium dioxide, magnesium stearate, colloidal silicon anhydrous, polyethylene glycol

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه العبوة

قرص بيضوي، مطلي، أبيض اللون. العدد "93" مطبوع على أحد جانبيه القرص و"49" على جانبه الآخر.

يوجد في كل عبوة 30 قرصًا معيًّا في شرائط حويصلات (بليستر).

اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه

تيفغ إسرائيل م.ض، شارع دفور هاتيفيه 124، تل أبيب 694400

تم تحرير هذه النشرة في آب/أغسطس 2022 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 130 2530822

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكرد. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.