

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986**  
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

## أولوميانت 2 ملغ أولوميانت 4 ملغ

### أقراص مطليّة

#### مركب فعّال – باريسيتينيب (baricitinib)

يحتوي كل قرص من أولوميانت 2 ملغ على 2 ملغ باريسيتينيب.  
يحتوي كل قرص من أولوميانت 4 ملغ على 4 ملغ باريسيتينيب.

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: أنظر البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" في الفصل 2 والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.  
هذا الدواء وصف لك. لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

إضافة إلى هذه النشرة، هناك بطاقة معلومات سلامة لمتلقي العلاج، خاصة بمستحضر أولوميانت. تتضمن هذه البطاقة معلومات سلامة هامة، عليك معرفتها قبل بدء العلاج بأولوميانت، وأثنائه. وعليك العمل بحسبها. يجب مراجعة بطاقة معلومات السلامة المعدّة لمتلقي العلاج، ونشرة المستهلك قبل البدء باستعمال المستحضر. احتفظ بالبطاقة لمراجعتها عند الحاجة.

### 1. لم أعدّ هذا الدواء؟

#### التهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid Arthritis)

أولوميانت معدّ لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب مفاصل روماتويدي معتدل حتى شديد، والذين لم يكن العلاج السابق لهم بدواء واحد أو أكثر من مضادات الروماتيزم من مجموعة DMARD فعّالاً بما يكفي أو كان غير محتمل.

يمكن استعمال أولوميانت كمستحضر واحد ووحيد أو بالدمج مع ميثوتريكسات (methotrexate).

يعمل أولوميانت من خلال الحدّ من نشاط الإنزيم الموجود في الجسم، المسمّى "جانوس كيناز" (Janus kinase)، الصالح في سيرورات التهابية. من خلال تقليل نشاط هذا الإنزيم، يساهم أولوميانت في تخفيف الألم، التصلب والتورم في المفاصل، التعب، ويساعد في إبطاء تضرر العظم والغضاريف في المفاصل. من الممكن أن تساعدك تأثيرات الدواء هذه على القيام بالنشاطات اليومية، من خلال تحسين جودة الحياة المتعلقة بالصحة بالنسبة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

#### التهاب الجلد التأتبي (Atopic Dermatitis)

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي المعتدل حتى الحاد، الذين يتعين عليهم تلقي علاج جهازّي.

يعمل أولوميانت من خلال الحدّ من نشاط الإنزيم الموجود في الجسم، المسمّى "جانوس كيناز" (Janus kinase)، الصالح في سيرورات التهابية. من خلال تقليل نشاط هذا الإنزيم، يساهم أولوميانت في تحسين حالة الجلد ويقلل الحكّة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أولوميانت على تحسين جودة النوم (بسبب الحكّة)، وجودة الحياة العامة. تبين أن أولوميانت يحسن أعراض ألم الجلد، القلق والاكتئاب المرتبطة بالتهاب الجلد التأتبي.

التهاب الجلد التأتبي يُعرف أيضا كإكزيما الجلد التأتبية. يمكن استعمال أولوميانت بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج الإكزيما تدهنها على الجلد أو تستعمله كمستحضر وحيد.

### داء الثعلبية (بقعة صلع، Alopecia Areata)

يستعمل أولوميانت لعلاج البالغين المصابين بالثعلبية (بقعة الصلع) الشديدة، وهي مرض ذاتي المناعة يتسم بتساقط الشعر الالتهابي وبدون ندبات، من فروة الرأس، من الوجه وأحيانا من مناطق أخرى في الجسم، والتي من الممكن أن تكون متكررة وقابلة للتطور.

يعمل أولوميانت من خلال الحد من نشاط الإنزيم الموجود في الجسم، المسمى "جانوس كيناز" (Janus kinase)، الضالع في سيرورات النهاية. من خلال تقليل نشاط هذا الإنزيم، يساهم أولوميانت في عودة نمو الشعر على فروة الرأس، الوجه، ومناطق أخرى من الجسم، والتي تتأثر بالمرض.

المجموعة العلاجية: مثبطات مناعة، مثبطات مناعة انتقائية.

## 2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) لباريسيتينيب أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفصل 6).
- كنت حاملاً أو تظنين بأنك قد تكونين حاملاً.

### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل وخلال العلاج بأولوميانت أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من عدوى أو كنت تُصاب بحالات عدوى في أحيان متقاربة. أبلغ الطبيب إذا كانت تحصل لديك أعراض مثل سخونة، جروح، شعور بالتعب المتزايد أكثر من المعتاد أو مشاكل أسنان نظراً لأن هذه قد تكون علامات عدوى. قد يقلل أولوميانت من قدرة جسمك على مقاومة حالات العدوى وقد يؤدي إلى تفاقم عدوى موجودة أو قد يزيد من احتمال أن تصاب بعدوى جديدة.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض السل. من المحتمل أن تحتاج إلى فحوصات لاستبعاد مرض السل قبل إعطاء أولوميانت. أبلغ الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مثل سُعال مزعج، سخونة، تعرق ليلي وانخفاض في الوزن خلال العلاج بأولوميانت، لأن هذه قد تكون أعراض مرض السل.
- عانيت من عدوى الهريس النطاقي (herpes zoster)، لأن أولوميانت قد يُتيح تكرار العدوى. أبلغ الطبيب إذا كان لديك طفح جلدي مصحوب بألم وبثور خلال العلاج بأولوميانت، لأن هذه قد تكون علامات الهريس النطاقي.
- تعاني أو عانيت في الماضي من التهاب الكبد (Hepatitis) B أو C.
- من المفروض أن تحصل على تطعيم. يجب عليك الامتناع عن الحصول على مكونات تطعيم (حية) معينة خلال استعمال أولوميانت.
- كنت تعاني من سرطان، لأن الطبيب قد يحتاج أن يُقرر فيما إذا كان بإمكانك بعد الحصول على أولوميانت.
- كنت تعاني من خلل في أداء عمل الكبد.
- عانيت في السابق من تخثرات دم في أوردة الساقين (خثار في الأوردة العميقة) أو في الرئتين (انسداد رئوي). أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من ساق متورمة وتسبب لك الألم، ألم في الصدر أو ضيق تنفس، لأن هذه قد تكون علامات تخثر دم في الأوردة.
- عانيت في الماضي من الرداب القولوني (diverticulosis) - نوع من التهاب القولون، أو من قروح في المعدة أو في الأمعاء (انظر الفصل 4).

إذا لاحظت أحد الأعراض الحادة التالية عليك إبلاغ الطبيب حالا:

- ضغط في الصدر
- صغير أثناء التنفس
- دوخة حادة أو شعور بالدوار

- تورم الشفتين، اللسان أو الحنجرة
- شرى (حكة أو طفح جلدي)
- ألم حاد في البطن مصحوب بشكل خاص بحمي، حالات غثيان وتقيؤ.

### الأطفال والمراهقون

يُمنع إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين تحت جيل 18 عاما وذلك لعدم وجود معلومات كافية بالنسبة للاستعمال في هذه الفئة العمرية.

### فحوصات ومتابعة

قد تحتاج إلى إجراء فحوصات دم قبل البدء بتناول أولوميانت، أو خلال تناوله، لفحص فيما إذا كنت تعاني من تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر دم)، من تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات أو قلة الليمفاويات - Neutropenia or lymphopenia)، من مستوى دهون (كوليسترول) مرتفع في الدم أو من مستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد، وذلك من أجل التأكد بأن العلاج بأولوميانت لا يُسبب مشاكل.

### التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا سيما إذا كنت تتناول:

- بروبنيسيد (probenecid) (لعلاج النقرس)، لأن هذا الدواء ممكن أن يزيد مستويات أولوميانت في دمك. إذا كنت تتناول بروبنيسيد، فالجرعة الموصى بها من أولوميانت هي 2 ملغ، مرّة واحدة في اليوم. يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.
- دواء ضد التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يُعطى عن طريق حقنة
- أدوية تُعطى بالحقن وتثبط جهاز المناعة، تشتمل على علاجات بيولوجية مركزة (أجسام مضادة)
- أدوية تستعمل للسيطرة على رد الفعل المناعي للجسم، مثل أزثيوبرين (azathioprine)، تاكروليموس (tacrolimus) أو سيكلوسبورين (cyclosporin)
- أدوية أخرى تنتمي لفئة مثبطات الإنزيم جانوس كيناز (Janus kinase)
- أدوية قد تزيد خطر حدوث الرداب القلوني مثل أدوية مضادة للالتهاب غير ستيرويدية (NSAIDs)، تستعمل غالباً لعلاج الآلام و/أو حالات التهاب العضلات أو المفاصل) و/أو الأفيونيات (تستعمل لعلاج الألم الحاد)، و/أو كورتيكوستيرويدات (تستعمل غالباً لعلاج حالات الالتهاب) (انظر الفصل 4).

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي للاستشارة قبل تناول هذا الدواء.

يجب عليك استعمال وسيلة منع حمل ناجعة من أجل منع حصول حمل خلال العلاج بأولوميانت ولمدة أسبوع واحد على الأقل بعد إعطاء الجرعة الأخيرة من أولوميانت. يجب عليك تبليغ الطبيب إذا كنت حاملاً لأنه يُمنع استعمال أولوميانت خلال الحمل.

يُمنع استعمال أولوميانت خلال الإرضاع لأنه ليس معروفاً فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل إلى الحليب. يجب عليك أنت والطبيب اتخاذ القرار فيما إذا كنت سترضعين أم ستستعملين أولوميانت. يُمنع الإرضاع واستعمال أولوميانت في الوقت ذاته.

### السياقة واستعمال الماكينات

لا يؤثر أولوميانت على القدرة على السياقة واستعمال الماكينات.

### معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

#### يحتوي أولوميانت على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل قرص، أي يعتبر عملياً "خالياً من الصوديوم".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.

يجب بدء العلاج تحت إشراف طبيب صاحب خبرة في تشخيص حالتك الطبية وعلاجها. يجب تناول هذا الدواء دائماً تماماً حسب التعليمات التي أعطيت لك من قبل الطبيب أو الصيدلي. افحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددتهما الطبيب فقط.

#### التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب الجلد التأتبي وداء الثعلبية (بقعة صلح)

الجرعة المتبعة غالباً هي 4 ملغ، مرة واحدة في اليوم. قد يصف لك الطبيب جرعة منخفضة أكثر مقدارها 2 ملغ مرة واحدة في اليوم، لا سيما إذا كان عمرك أكثر من 75 عاماً أو إذا كنت معرضاً لخطر متزايد للإصابة بحالات عدوى. إذا كان الدواء يعمل جيداً، قد يقرر الطبيب أنه يمكن خفض الجرعة.

إذا كنت تعاني من انخفاض أداء الكلى، فإن الجرعة المتبعة من أولوميانت هي 2 ملغ مرة واحدة في اليوم.

#### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

أولوميانت معدّ للاستعمال الفموي. يجب عليك بلع القرص مع ماء. بإمكانك تناول الأقراص مع أو بدون طعام. لمساعدتك على تذكر تناول أولوميانت، من المستحسن تناولها بنفس الساعة كل يوم.

يُمنع سحق أو شطر أقراص أولوميانت. الأقراص ليست معدة للتقسيم لجرعات أصغر. إذا حاولت شطر القرص، قد لا تحصل على كل الجرعة التي وصفها لك الطبيب. لا تتوفر معلومات حول استعمال الدواء عبر الأنبوب الأنفي-المعدي.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى مما يجب أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك. من المحتمل أن تعاني من بعض الأعراض الجانبية الموصوفة في الفصل 4.

#### إذا نسيت تناول الدواء

- إذا فوتت جرعة، يجب عليك تناولها فور تذكر ذلك.
- إذا نسيت الجرعة طيلة النهار بأكمله، يجب ترك الجرعة التي نسيتها وتناول جرعة واحدة فقط كالمعتاد في اليوم التالي.
- يُمنع تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن القرص الذي نسيت تناوله.

يجب الاستمرار في العلاج بحسب توصية الطبيب.

#### إذا توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن تناول أولوميانت، إلا إذا أعطاك الطبيب تعليمات بالتوقف عن تناوله.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.  
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة لاستعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أولوميانت أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

#### أعراض جانبية خطيرة

- عدوى مثل الهربس النطاقي والتهاب الرتئين، قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص:
- أبلغ الطبيب أو توجه للحصول على مساعدة طبية فوراً إذا حصلت لديك الأعراض المفصلة فيما يلي، التي قد تكون أعراض:
- الهربس النطاقي (Herpes Zoster): طفح جلدي مع بثور مصحوبة بألم وسخونة (نادر جداً في التهاب الجلد التأتبي وغير شائع في داء الثعلبية)
- التهاب الرتئين: سعال متواصل، حمى، ضيق تنفس وتعب (غير شائع في التهاب الجلد التأتبي وداء الثعلبية)

الالتهاب الرئوي الشديد والهربس النطاقي الشديد هما من الأعراض الجانبية غير الشائعة.

#### أعراض جانبية إضافية

- أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):
- حالات عدوى في الحلق والأنف
- مستويات مرتفعة من الدهون في الدم (كوليسترول) والتي تظهر عن طريق فحص الدم
- أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):
- تقرحات برد (الهربس البسيط - Herpes simplex)
- عدوى تُسبب اضطراب في المعدة أو إسهال (gastroenteritis)
- عدوى في المسالك البولية
- عدد مرتفع من صفائح الدم (خلايا مشاركة في تخثر الدم)، يظهر بواسطة فحص دم (غير شائع في التهاب الجلد التأتبي وداء الثعلبية)
- صداع
- حالات غثيان (غير شائع في التهاب الجلد التأتبي)
- ألم في البطن (غير شائع في داء الثعلبية)
- مستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد تظهر بواسطة فحص دم (غير شائع في التهاب الجلد التأتبي)
- طفح
- حب الشباب (غير شائع في التهاب المفاصل الروماتويدي)
- ارتفاع مستوى الأنزيم كرياتين كيناز، الذي يظهر في فحص الدم (غير شائع في التهاب المفاصل الروماتويدي)
- التهاب (انتفاخ) جريبات الشعر، وخصوصاً في منطقة فروة الرأس التي يحصل فيها نمو الشعر المتجدد (تمت مشاهدته في حالات داء الثعلبية).

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):

- عدد منخفض من خلايا الدم البيضاء (العدلات - Neutrophils)، يظهر بواسطة فحص الدم

- مستويات مرتفعة من الدهون (ثلاثي الجليسريد - triglycerides)، تظهر بواسطة فحص الدم
- مستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد، تظهر بواسطة فحص الدم (شائعة في داء الثعلبية)
- زيادة في الوزن
- تورم الوجه
- شرى
- خثرات دموية في الأوعية الدموية في الرئتين
- خثرات دموية في الأوردة في الساقين أو الحوض، تدعى الخثار الوريدي العميق (DVT)
- الرداب القولوني (داء التوج، diverticulitis) - التهاب مؤلم في جيوب صغيرة في نسيج المعى.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

### التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيف يُخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على الشريط (البليستر) وعلى العلبّة الخارجية. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

### شروط التخزين

- يجب الخزن في درجة حرارة تحت الـ 30°C.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. اسأل الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء، أيضاً:

microcrystalline cellulose, mannitol, croscarmellose sodium

(أنظر الفصل 2 "يحتوي أولوميانت على الصوديوم")، magnesium stearate,

Film coating, color mixture pink 85G140008 (2 mg)/ 85G140009 (4 mg):

- polyvinyl alcohol
- titanium dioxide
- macrogol
- talc
- lecithin
- iron oxide red

### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أولوميانت 2 ملغ أقراص مطليّة بفيلم هي أقراص مطولة بلون زهري فاتح، 9 x 7.5 ملم، مع كتابة "Lilly" من جهة، و "2" من الجهة الثانية.

أولوميانت 4 ملغ أقراص مطليّة بفيلم هي أقراص مستديرة بلون زهري، 8.5 ملم، مع كتابة "Lilly" من جهة، و "4" من الجهة الثانية.

أقراص المقدارين مدوّرة وذات فجوات من الجهتين بهدف تسهيل إمساكك بها.

أقراص أولوميانت 2 ملغ و 4 ملغ متوفرة بأشرطة (عبوات بليستر) من 14، 28، 35، 56، 84 و- 98 قرصاً في أشرطة تقويمية (مشار عليها بحسب الأيام) و- 1 x 28 و- 1 x 84 قرصاً في أشرطة منقوية لجرعات فردية. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: إيلي ليلي إسرائيل م.ض.، شارع هشيراف 4، ص.ب. 4246، رعنانا 4366411.

اسم المنتج وعنوانه: ليلي S.A.، ألكويندس، مدريد، إسبانيا.

تم تحريرها في كانون الأول 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة:

أولوميانت 2 ملغ: 161-15-35738-00

أولوميانت 4 ملغ: 161-16-35739-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

الرجاء إزالة هذا القسم من النشرة للمستهلك والاحتفاظ به معك.

<p><b>حالات العدوى:</b></p> <p>قد يؤدي أولوميانت إلى تفاقم حالة عدوى موجودة أو أن يزيد الاحتمال أن تحصل لديك عدوى جديدة أو أن يزيد احتمال التنشيط الفيروسي. أبلغ الطبيب فوراً إذا حصلت لديك أعراض عدوى، مثل:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سخونة، جروح، شعور بالتعب المتزايد مقارنة بالحالة الاعتيادية أو مشاكل بالأسنان.</li> <li>• سعال لا يختفي، تعرّق ليليّ وانخفاض في الوزن. هذه قد تكون أعراض مرض السل (مرض رئوي معدّي).</li> <li>• طفح جلدي مصحوب بألم وبثور. قد يكون هذا العرض علامة لعدوى الهريس النطاقي.</li> </ul> <p><b>دهنيات في الدم:</b></p> <p>قد يؤدي استعمال أولوميانت إلى ارتفاع مستوى الدهون في الدم. قد يفحص طبيبك مستويات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول، خلال العلاج بأولوميانت.</p> <p><b>خثرات دموية في الأوردة:</b></p> <p>قبل بدء العلاج بأولوميانت وخلالها، أخبر الطبيب إذا عانيت في الماضي من خثرات دموية في أوردة الساقين (خثرات دموية في الأوردة العميقة)، أو في الرئتين (انصمام رئوي).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من تورم وألم، احمرار أو شعور بالحرارة في الساق، ألم في الصدر أو ضيق تنفس، لأن هذه العلامات قد تشير إلى خثرات دموية في الأوردة.</li> </ul> <p><b>الحمل</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يُمنع تناول أولوميانت إذا كنت حاملاً أو تشكين بأنك قد تكونين حاملاً.</li> <li>• استعملي وسيلة منع حمل ناجعة خلال العلاج بأولوميانت (ولمدة أسبوع واحد بعد ذلك، إذا توقفت عن العلاج).</li> <li>• أبلغِي الطبيب فوراً إذا حملت (أو إذا كنت ترغيبين بأن تحملي).</li> </ul>	<p><b>معلومات لمتلقي العلاج حول أولوميانت (باريسيتينب).</b></p> <p>يحتوي هذا المستند على معلومات هامة، يجب عليك أن تكون عالماً بها قبل الاستعمال وخلال استعمال أولوميانت.</p> <p>يُستعمل أولوميانت</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل حتى الحاد، والذين لم يكن العلاج السابق لديهم بدواء واحد أو أكثر من مضادات الروماتيزم من مجموعة DMARD فعّالاً إلى حد كافٍ أو أنه لم يكن محتملاً. يمكن استعمال أولوميانت كمستحضر وحيد أو بالدمج مع ميثوتريكسات (methotrexate).</li> <li>• لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي المعتدل حتى الحاد، المعروف أيضاً بإكزيما الجلد التأتبية. يمكن استعمال أولوميانت بالدمج مع أدوية أخرى لعلاج الإكزيما، تدهنها على الجلد أو يمكن أن تستعمله كمستحضر وحيد.</li> <li>• لعلاج البالغين المصابين بداء الثعلبة (بقعة الصلع) الشديدة.</li> </ul> <p>احتفظ بهذه المعلومات معك ومررها لأفراد الطاقم الطبيّ الآخرين المشاركين في علاجك.</p> <p><b>اسمك:</b></p> <hr/> <p><b>اسم الطبيب (الذي وصف أولوميانت):</b></p> <hr/> <p><b>رقم هاتف الطبيب:</b></p> <hr/>
--	---