

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

## **САВИОР**

### **Крем**

#### **Состав**

Цетримид 0.5% w/w (Cetrimide 0.5% w/w)

Хлоргексидина Гидрохлорид 0.1% w/w

(Chlorhexidine Hydrochloride 0.1% w/w)

Для информации о неактивных компонентах и аллергенах см. раздел 2 - "Важная информация о некоторых ингредиентах препарата" и раздел 6 - "Дополнительная информация".

**Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата.**

Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Применяйте препарат в соответствии с указаниями в разделе дозировки данной инструкции. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу в случае, если признаки заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются.

#### **1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?**

Применяется как средство первой помощи для внешней дезинфекции при небольших повреждениях, ранениях и ожогах.

#### **Фармакологическая группа:**

Дезинфицирующие средства (антисептики)

Хлоргексидин – это антисептик с широким спектром активности против микроорганизмов, включая бактерии, грибки и вирусы.

Цетримид обладает антисептическими свойствами.

#### **2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА**

##### **☒ Не применяйте препарат, если:**

- Не применяйте данный препарат, если известно о повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата, особенно к хлоргексидину, способному вызвать аллергическую реакцию. Цетостеариловый спирт может вызвать местную кожную реакцию.
- Не применяйте данный препарат в области рта и глаз.
- Не применяйте препарат в среднем ухе.

##### **Особые предостережения относительно применения препарата Савиор:**

- Если Вы чувствительны к какому-либо продукту питания или какому-либо лекарственному препарату, сообщите об этом врачу до начала применения препарата.
- Не применяйте данный препарат часто или в течение продолжительного периода времени, не посоветовавшись с врачом.
- В тех случаях, когда развивается припухлость в области раны, или рана сопровождается повышением температуры тела, посоветуйтесь с врачом.

##### **☒ Взаимодействие препаратов:**

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Избегайте использования мыла и других анионных реагентов.

Отбеливающие вещества, содержащие гипохлорид, могут привести к образованию коричневых пятен на текстильных изделиях, ранее бывших в контакте с препаратом Савиор.

##### **☒ Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:**

Цетостеариловый спирт может вызвать аллергическую реакцию.

#### **3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?**

Уточните у врача или фармацевта, если Вы не уверены относительно дозировки и режима лечения препаратом..

##### **Способ применения:**

Только для наружного применения. Не глотать!

Нанести крем тонким слоем на поврежденный участок. Избегайте контакта препарата с глазами. В случае попадания крема в глаза, тщательно промойте их водой.