

**רטרוביר לאינפוזיה תוך ורידית****תמיונה לאינפוזיה תוך ורידית**

כל בקבוקן מכיל:

זידובודין 200 mg/20 ml זידובודין 200 mg/20 ml

כל 1 מ"ל מכיל מיסה מיליל 10 מ"ג זידובודין.

בתרשימים החמורים הבלטיים וארגניים בתשריר וראה סערף 2 – "מידע חשב על חלק מהמרחיבים של התוודה" וסערף 6 – "מידע עoxic".

קרא בערךן ערך עולש עד סופו בטרם תשמש בתורופה. עלון זה יכול לעמוד תעשייה או אל הרוקה.

תורהפה גונשאה עבורה, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפיין אך נראתה לך כי מצבם הרופאי דומה.

Ret IV PT v2A 20148

374

**1. למה מיועדת התורהפה?**

רטרוביר לאינפוזיה תוך ורידית משמש לטיפול קרר טווח במצבים חמומיים של זיהום בגין הכלול החיסוני האנושי (HIV) בחולים עם ססמתו הכלול החיסוני הרכש (AIDS) ובחולמים עם AIDS או סיסמיים מוגבלים של חסרים פוניים של רטוורבר. טיפול מוגנת בי-רטרוביר מיעד לשדים הרות ונשאות של HIV (אחר השבעה 14 של הגוף) על מנת לנגן הדבקה תוך רחמתה של העובר וכן למנעה ראשונית של זיהום HIV בתינוק שנולד.

יש לשימוש ברטרוביר לאינפוזיה תוך ורידית רק כאשר הטיפול הפמי אנו שרבי (למעט במהלך צירום ולידה).

קובץ תרופיטיות:

החומר העיקרי לרטרוביר הוא זידובודין. רטרוביר שייכת לקבוצה תרופות אנטירוטויריאליות, המכונות אנלוגים נוקלאוזידים מעכבי רוטוס טרנקרפטאיס (NRTIs).

רטרוביר מושם מעתה, אך עם חוסר הכללה החיסונית את כמות הנגיף גונפר שוררת אוורור בהרבה נזוכה. רטרוביר גם מעלה את ספלתת תא CD4 המוגן של תא דם לבנים.

רטרוביר מושם מעתה, אך עם תרופות נוספות (טיפל מושלב), לטיפול במוגבלים ובילדים. על מנת לשולט בשלול הכלול החיסוני האנושי (HIV) לויעזר את ההמרתת המוליה. עליך להקפיד ליטול את כל התרופות שלך.

אם אתה בהרין, יתכן שהרופא שלך ירצה שתיקרי רטרוביר, על מנת לנגן את התרבות נזוכה בגין HIV. לאחר הדבקה בגוף HIV.

זיהום של HIV מתפשט במגע מיין עם אדם שיש לו את הזיהום, או בהעברה של דם נגוג (לדוגמה, כאשר חולקים מוחטים להזקה).

**2. לפני השימוש בתורופה**

אין להشمיש בתרופה אם:

- אתה גאניש (אלרי) להורם הפעיל (זידובודין) וכך אחד ממרכיביהם הנוטפים אשר מכילה התורהפה (קמפורט בסעף 6).
- יש לך ספרתת תא CD4 המוגן מזוכת (ניטרופניה).
- או ספירת תא CD4 מזוכת (אג'נימה).

רטרוביר לילדיים:

- אין לתהן רטרוביר לחלק מהילדים הסובלים מביעות כבד, כולל:
- מקרים מסוימים של יתר בילירובין בدم (עליה בຄמויות של חומר בדם הנראה בילירובין אשר עשוי להפוך את מראה העור לצהוב).
- בעיות אחרות הגורמות לרמת גבואה של איזימי כבד בדם.

אזהרות מירוחדות הנוגעות לשימוש בתורופה:

חלק מהางשים הילוקרים רטרוביר או טיפל מושלב ב-HIV נתווים בסיכון גבוה יותר לתופעות לוואי חמורות. עליך להזכיר מועל לסוכנים נוספים:

- אם או פעם היהת לך מלחת כבד (כולל דלקת כבד מסוג B או C).
- אם שודך משקל משמעותי (במיוחד אם את אישת).

← שוחרם העור על צהוב. יתכן שתצטרכך בדיקות מוקדמות, כולל בדיקות דם, בין היתר על מנת לנצל את התוודה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעף 4.

שים לב לתסמינים חמוביים של חום או טיפל מושלב ב-HIV בעיות אחרות, העולות לוירוע חמורה. עליך לדעת על סימני וסמיומים חמוביים שיש להיזכר בזיהור מיפויים רטרוביר.

אנא ראה את המידע בסעיף 4 של עلون זה. אם יש לך שאלות כלשהם לגבי זיהור מיפויים או רטרוביר, כתשלחו אליו מיד וזה או על הEMAIL שינומן:

← התויעץ עם הרופא.

אינטראקציות/תגובה בין תרופות אם אתה לוקחת או מושם תרופות לא-רומס ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקה:

- אין לך תרופה אלה עם רטרוביר:
- סטאג'זון המשמש לטיפל בגין HIV
- רייבורין או זירוקט וגנוקלוביר לטיפול בזיהומיים ויראליים

תרופות מסוימות עלולות להעלות את הסיכון להפעת תופעות לוואי או לך השפעות הלואיזייו חמוריות יותר.

אללה כלולות:

- סודיום ואלפראט, המשמש לטיפל באפליפסיה
- איזיקובור, גאנז'יבור או אינטראפנון, המשמש לטיפול בזיהומיים אחרים
- דיספון, המשמש למניעת דלקת ריאות ולטיפול בזיהומיים עור
- פטורייטים, כגון קנדידה, המשמש לטיפול בזיהומי טפיליים, כגון אמפוריצין או קו-טרימוקסאזול, המשמש לטיפול בזיהומיים בזיהומיים אנטיב�טיים ותיידרים
- פרובוציד, המשמש לטיפול בשיזידון ובמלות דומות, וזאת באמצעות אנטיביוטיקות מסוימות כדי להגביר את עולמות מותן של נגוטין וטראנוק. תרופה זו מחייבת תחליף להרואין
- מותדין, המשמש לטיפול בזיהומי טפיליים, כגון אנטיביוטיק או דוקסוסוביין, המשמש לטיפול בטרטן.

← ספר לרופא אשר שם תהנו נטל את מטהו.

תורופה המגיבה עם רטרוביר:

- פנטואצ'ין, המשמש לטיפל באפליפסיה.
- ספר לרופא אשר אמר לך נטל תרופה או רטרוביר.

← של רופא ציריך לטnar או אחר בזון שאתה לוחק רטרוביר.

הירין וגונגה:

אם אתה בהרין או מניקה, חושבת שייתכן שאתה בהרין, או אם אתה מתכוון להרין, תרופה פונקציונלית של רטרוביר או אינטראפנון.

← תייעוץ עם הרופא או רטרוביר.

הנקה:

הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם HIV, מכיוון שאין לה HIV עלול לעורר אל התווך בחבלם. אם תסכך נסוך קנה יותר להרין זיהום HIV לעורר שלך.

רטרוביר תסכך דמותו של רטרוביר בטרוביר, יוכלה גם היא לעורר תרין חבל האם שלך.

אם אתה מניקה, או רטיבור או רטרוביר, עליך להזכיר עולמות נטן את התופחות תליך. בילידיים אשר אמורות להגנה מפני הדבקה נקיין זיהום HIV גבר על הסיכון של תופעות הלואיזי.

**3. כיצד תשתמש בתורופה?**

במלר הטיפול ב-HIV יכול להוועת עליה מרשם וברמות השמנים והוסוכר דם. זה קשור לכך שטיפול מושלב ב-HIV.

תופעות לוואי מוגנות על ידי אנטיביוטיק תרין ורידית מ-1 אנטיביוטיק:

- מוגרים ומוגברים מעל גיל 12+
- מינון הרטוביר שתකבל היהת מושלב כבד (המינון מ-1 אנטיביוטיק).

המודול הווא 1 מ"ג לכל ק"ג משקל גופך כל ארבע שעות.

← סופר על רטיבור או רטרוביר אם אתה לא יכול לטלטוק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

שלו שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.

טיפול עם זידובודין (רטרוביר) גורם לעיתים קרבוטות לאובדן שונן הרגלים והסוכרים טיפול מ-1 אנטיביוטיק.