

## تربيتين راز 250 ملء

كبسولات صلبة

المادة الفعالة:

تحتوي كل قرص 250 ملء من تريبيتين ديبيروكلوريد (Dihydrochloride Trientine)، كمية المساوية لـ 166.67 ملء قاعدة تريبيتين. لفاف النشرة الماء غير الفعال - ظهر بند 6، "معلومات إضافية" في هذه النشرة. أقرأ النشرة قبل تناولها بامتنان قبل استخدام الدواء. تجنب هذه النشرة معلومات ملخصة عن الدواء، إذا كانت لديك أسلحة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وُصِّف هذا الدواء من أجل علاجك، لا تطهه لآخرين. فهو قد يسبب لهم الضرر حتى لو بذلك أن جاهزهم الصحية مشابهة.

### 1. لأى غرض مخصوص الدواء؟

يحتوي تريبيتين راز 250 ملء على المادة الفعالة تريبيتين. هذا الدواء مخصوص لعلاجمرض ويسون لدى البالغين، المراهقين والأطفال من جيل 5 سنوات وما فوق، مع عدمتحمل للعلاج بـ D-بىپسیلامين.

يشتري تريبيتين راز 250 ملء على المادة الفعالة تريبيتين.

بعمله ينفع في حالة وراثية هي لا يستطيع الجسم نقل النحاس حول الجسم بالطريقة

الطبانية أو إرث النحاس بالطريقة الطبيعية عن طريق الإفراز من الكبد إلى الأمعاء، يعني أن الكيمايات الصغيرة من النحاس من الطعام والشراب تراكم مستويات شاذة ويمكن أن تؤدي للتضرر الكبد ومشاكل في الجهاز العصبي.

كيف يعمل تريبيتين راز 250 ملء

يعمل هذا الدواء بشكل أساس على طريق النحاس في النحاس في الجسم، ما يسمح بعد ذلك بإزالة النحاس في البالغين، وبذلك يساعد على خفض مستويات النحاس. قد يتضمن أيضًا بالنحاس في القناة الهضمية وبالتالي يقلل من الكيمايات التي يتم امتصاصها للجسم.

يقوم الدواء بالتحكم بكميات النحاس في الجسم بواسطة الارتباط به، بهذه الطريقة يمكن

للنحاس الخروج من الجسم.

الفصيلة العلاجية:

منتجات أخرى للجهاز الهضمي والتتمثيل الغذائي، مختلف منتجات الجهاز الهضمي والتنفس الداخلي.

### 2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء:  
• إذا كنت تستهلك ملخصة عن الأدوية التي يحتويها هذا الدواء (اظهر بند 6، "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة المتعلقة باستعمال الدواء:  
إذا كنت تتناول ملء طبلتك أو المرضعة قبل تناول تريبيتين راز 250 ملء.  
إذا كنت تتناول دواء آخر الذي يحتوي على تريبيتين، قد يقوم طبلتك بتغيير الجرعة اليومية الخاصة بك بعد الكبسولات أو تغير تناول الدواء اليومية عند التحول للعلاج بـ تريبيتين راز 250 ملء.

قد تتفاقم الأعراض لديك بعد بدء العلاج. إذا حصل ذلك، فيتوجب عليك طلب طبلتك.

سي Sugoxin طبلتك بشكل منتظم والبول لديك من أجلتأكد إنك تلتقي الجرعة الدوائية الملامنة من تريبيتين راز 250 ملء من أجل السيطرة على الأعراض المخصوصة للنحاس كما ينصح.

عليك اختيار طبلتك إذا كنت تعاني أعراضًا جانبية، أي كانت لأن ذلك قد يدل على أن هناك حاجة لزيادة أو خفض جرعة تريبيتين الخاصة بك.

قد يقلل هذا الدواء أيضًا من مستويات الحديد في دمك وقد يعطيك طبلتك وصفة طبية لمكملات الحديد (اظهر بند "التدخلات/تقاعلات بين الأدوية" أدناه).

إذا كانت لديك مشكل في الكبد أو الكلى، سفوف تتحقق طبلتك بانتظام من أن جرعة العلاج مناسبة وأنها لا تؤثر على وظائف الكلى أو الكبد لديك.

لا ينصح مزيج تريبيتين مع أدوية أخرى التي تحتوي على الزنك.

تم الإبلاغ عن ردود فعل شبيهة-الذئبة (قد تشمل الأعراض طفح جلدي مستمر، حمى، آلام مفاصل وعُقب) لدى بعض المعالجين الذين انتقاوا للعلاج بواسطة تريبيتين بعد العلاج بـ د-بىپسیلامين. ومع ذلك، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان رد الفعل ناتجًا عن استعمال تريبيتين أو عن العلاج السابق بـ D-بىپسیلامين.

**الأطفال والمرأهقون:** يقوم طبلتك بإجراء فحوصات بوتيرة مرتفعة أكثر من أجل ضمان الحفاظ على مستويات النحاس عند مستوى مناسب لأجل نمو وتطور عقلي سليم.

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أطلب طبلتك أو الصيدلي بذلك.

خاصة إذا كنت تأخذ مكملات الحديد أو أدوية تساعد على الهضم (أدوية التي تقتل الأنزيمات بعد الأكل). إذا كنت تتناول هذه الأدوية فقد تحتاج إلى تناول تريبيتين راز

## 4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال تريبيتين راز 250 ملء أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن تصيبك أي منها. في بعض الأحيان، العلاج تريبيتين قد يسبب التهاب في المعدة الدقيق أو القولون. إذا كنت تعاني أحد الأعراض الجانبية التالية توافق مع طبلتك بشكل فوري.

تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية:

شائع (قد يؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص)

غير شائع (قد يؤثر على حتى 1 من بين 100 أشخاص)

طفح في الجلد

حكة

شيوخ غير معروف (لا يمكن تقدير مدى الشيوخ بالاعتماد على المعيقات القائمة)

- اضطرابات في المعدة وعزم الماء، بما في ذلك آلام شديدة في البطن (التهاب الأمعاء عشر)

- التهاب القناة الهضمية الذي قد يؤدي على سبيل المثال للألم في البطن، إسهال متكرر ودم في البراز (التهاب القولون)

- انخفاض بعد خاتمة العلاج عقب مستوى منخفض من الحديد في الدم (فتر دم عقب تناول حبة قرص الحديد)

- الشرى (طفح أو لفح الفراص)

إذا كنت تعاني من مرض ويسون، فائد بحاجة لإخبار طبلتك إذا كنت تعاني من تدهور في جهاز الأعصاب (على سبيل المثال ارتعاش، انعدام التنسق، كلام غير مفهوم، تحسب العضلات، تفاقم التشنجات العضلية).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبلتك.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية عن وزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن الأعراض غير علني" الذي يوجه للموزع الإلكتروني للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسخيم هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول الأيدي الأطفال وأدوات ورشة ونظائرهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التسمم بدون أمر واضح من قبل الطبيب.

يجب تخزينه تحت 25 درجة مئوية.

احفظ القناعية مغلقة بأحكام من أجل الحماية من الرطوبة.

شروط التخزين بعد الشراء:

يمكن استعمال تريبيتين حتى 100 يوم من الشراء عندما يتم تخزينه في درجة حرارة 2-8 درجات مئوية.

يمكن استعمال تريبيتين حتى 60 يوم من الشراء عندما يتم تخزينه في درجة حرارة 15-30 درجة مئوية.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو التفرياليات المتزيلة. أسلال الصيدلي عن قيمة التخلص من الأدوية التي لم تتدفق الاستعمال. هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية:

إضافةً لل المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

محتوى الكبسولة: stearic acid, anhydrous colloidal silica.

Gelatin, Titanium Dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), sodium lauryl sulphate, red iron oxide (E172), printing ink: shellac, black iron oxide (E172), propylene glycol, potassium hydroxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

كميسة جلايتون صلبة مملوئة بمسحوق أبيض بلون أبيض حتى أصفر فاتح. غطاء الكبسولة: HDPE بلون أبيض غير شفاف مع ملقط PP من منظومة حماية ضد الفتح من قبل الأطفال. حجم العبوة: 100 كبسولة.

رقم تسجيل الدواء: 170-23-36784-99

المنتفع: أميكور فارماستوتيكالس، الهند.

صاحب التسجيل: راز روكوخت م.ض..، شارع همتخت 6، كديما، إسرائيل.

تم تنقيح هذه النشرة في كانون الأول 2022 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

RAZP0372-00

250 ملء في وقت مختلف من اليوم، لأن تريبيتين راز 250 ملء قد يكون أقل فاعلية.

إذا كنت تتناول مكملات الحديد، تأكد من مرور ساعتين على الأقل بين تناول تريبيتين راز 250 ملء وتناول مكملات الحديد.

استعمال الدواء والغذاء:

ابطئ الكبسولات بكاملها مع الماء على معدة فارغة، قبل الوجبة بساعة على الأقل أو بعد ساعتين من الوجبة وفارق ساعة واحدة على الأقل عن أي دواء آخر، طعام أو حليب.

الحمل، الرضاع والخصوبة:

كنت حامل أو تخطط للحمل، استشيري طبلتك قبل تناول هذا الدواء. يمكنك مناقشة طبلتك حول الفوائد المحتملة للعلاج مشكل أثناء الأذى في الانتباخ، أي اختلالات ممتحنة التي قد تكون موجودة مع استمرار العلاج. سينصحك طبلتك بخصوص العلاج والجرعة الأنسب لكذلك.

إذا كنت حاملاً وتتناولين تريبيتين راز 250 ملء، فسوف تكونين تحت المتابعة طوال فترة الحمل لمرأة أي تأثيرات على الرضيع أو تغيرات في مستويات النحاس في دمك.

(ceruloplasmin) عند ولادة رضيعك، سيتم مراقبة مستويات النحاس والسيرولوپلاسمين في دمك، في هذه الأثناء.

لا يعرف إذا كان تريبيتين راز 250 ملء يمكن أن ينتقل لطفل الأم. من المهم اخبار طبلتك إذا كنت ترضعين طفلك أو تخططين للقيام بذلك. سيساعدك طبلتك عندها على اتخاذ القرار بخصوص وقف الرضاع أو التوقف عن تناول تريبيتين راز 250 ملء، مع أي علاج وأي جرعة هي الأنسب في حالتك.

السيادة واستعمال الآلات:

من غير المتوقع أن يؤثر تريبيتين راز 250 ملء على قدرتك على السيادة، استعمال الأدوات أو تشغيل الآلات.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء:

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملء) في الكبسولة، أي أنه عمليًا أقل من الصوديوم.

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائمًا استعمال تريبيتين وفقًا لتعليمات الطبيب. علىك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا تم تناولك مكملات بخصوص الحرارة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحدده من قبل الطبيب فقط. الجرعة المتبعة يشكل عام هي:

البالغون وكل الأجيال بما في ذلك المسنين

الجرعة اليومية الإجمالية الموصى بها هي بين 4 حتى 8 كبسولات لليوم (أجمالي 0.67-1.34 غرام من قاعدة تريبيتين)، التناول عن طريق الفم، تقسم الجرعة الإجمالية اليومية هذه إلى 2 حتى 4 جرعات أصغر التي يتم أخذها خلال اليوم. سيخبرك طبلتك بعد تناول الكبسولات التي عليك إعطائها طبلتك بانتظام.

مع هذه العلاج، قد يغير الطبيب المعالج الجرعة المطلوبة بالاعتماد على رد الفعل للعلاج.

### طريقة التناول

ابطئ الكبسولات بكاملها مع الماء على معدة فارغة، قبل الوجبة بساعة على الأقل أو بعد ساعتين من الوجبة وفارق ساعة واحدة على الأقل عن أي دواء آخر، طعام أو حليب.

إذا كنت تأخذ مكملات الحديد، تأكد من عدم تناوله قبل طبلتك أو الصيدلي.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة زائدة أو إذا بقي طبلتك بانتظام من دون تناول العبرة من قبل طبلتك أو يواجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وخذ عبودة الدواء معك.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت بالخطأ طبلتك، إذا أخذت أدوية أخرى مما كنت تعاني منها، تأكد من عدم تناول طبلتك.

إذا كنت تأخذ مكملات الحديد، تأكد من عدم تناول طبلتك أو الصيدلي.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة زائدة أو إذا بقي طبلتك بانتظام من دون تناول العبرة من قبل طبلتك أو يواجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وخذ عبودة الدواء معك.

إذا أسيئت تناول الدواء، إذا أخذت أدوية أخرى مما كنت تعاني منها، تأكد من عدم تناول طبلتك.

إذا أسيئت تناول جرعة واحدة أو أكثر، تناول جرعة أخرى في أسرع وقت ممكن ثم تناول طبلتك.

إذا أسيئت تناول جرعة طبلتك، لا تأخذ جرعة مصاعنة لتعويض الجرعة المنفسنة.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو حسنت حالتك الطبية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في نظام الأظافر في نظام الأظافر، يجب تناول جرعة من الملح والجزرة في كل مرة.

تناول طبلتك فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت طبلتك أي أسلطة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر طبلتك أو الصيدلي.

تداعيات/تقاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أطلب طبلتك أو الصيدلي بذلك.

خاصة إذا كنت تأخذ مكملات الحديد أو أدوية تساعد على الهضم (أدوية التي تقتل الأنزيمات بعد الأكل). إذا كنت تتناول هذه الأدوية فقد تحتاج إلى تناول تريبيتين راز