



**הוראות שימוש בתרופה  
אויריסדי 0.75 מ"ג/מ"ל אבקה להכנת תמייסה לשתייה  
ריסדיפלאם**

---

**تعليمات استعمال الدواء  
إيفريسيدي 0.75 ملг/مл مسحوق لتحضير محلول للشرب  
ريسديپلام**

---

**Instructions for Use  
Evrysdi 0.75 mg/mL powder for reconstitution  
of oral solution  
Risdiplam**

Be sure to carefully read and understand the **Instructions for Use** before you start using Evrysdi. These instructions show you how to prepare and give Evrysdi through an oral syringe, gastrostomy tube (G-tube), or nasogastric tube (NG-tube).

If you have any questions about how to take Evrysdi, contact your doctor or pharmacist.

You should receive Evrysdi from the pharmacy as a liquid in a bottle. The pharmacist will prepare the oral solution. If the medicine in the bottle is in powder form, do **not** take Evrysdi and contact your pharmacist.

يجب قراءة وفهم تعليمات الاستعمال ونشرة المستهلك بتمعن، وذلك قبل البدء باستعمال إيفريسيدي. تتضمن هذه التعليمات معلومات حول كيف يجب تحضير إيفريسيدي وإعطائه عبر محقنة فموية، أنبوب معدى معوي (أنبوب G) أو عبر أنبوب أنفي معدى (أنبوب NG).

إذا كانت لديك أية أسئلة حول طريقة تناول إيفريسيدي، يجب التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

عليك أن تحصل على إيفريسيدي من الصيدلية وهو على شكل سائل في قنينة. الصيدلي هو الذي يحضر محلول السائل للشرب. إذا كان الدواء في القنينة على شكل مسحوق، لا يجوز تناول إيفريسيدي ويجب التوجه إلى الصيدلي.

יש לקרוא בעיון ולהבין את הוראות השימוש ואת העלון לצריך לפני התחלת השימוש באווריסדי. בהוראות אלו ישנו מידע כיצד יש להכין ולתת אווריסדי באמצעות מזרק פומי, גסטרוסטום (צינור G) או דרך זונדה (צינור נאוזוגסטרי; צינור NG).

אם יש לך שאלות כלשון הקשורות לאופן בו יש ליטול אווריסדי, יש לפנות לרופא או לרוקח.

עליך לקבל אווריסדי מבית המרפקת בצורה נזילה בבקבוק. התמיסה לשתייה תוכן על-ידי הרוקח. אם התרפיה בבקבוק הינה במצב אבוקה אין ליטול אווריסדי ויש לפנות לרוקח.

## Important information about Evrysdi

- Ask your pharmacist or doctor to show you which oral syringe you should use and how to measure your prescribed daily dose.
- Always use the re-usable oral syringes supplied with Evrysdi to measure your prescribed daily dose.
- Two oral syringes of each size are provided in every pack in case one gets lost or damaged. Contact your pharmacist or doctor if both oral syringes are lost or damaged.
- See '**How to select the correct oral syringe for your dose of Evrysdi**'. Ask your pharmacist if you have questions on how to select the right oral syringe.

## معلومات مهمة عن إيفريسيدي

- يجب أن تطلب من الصيدلي أو الطبيب أن يعرض عليك المحقنة الفموية التي يتعين عليك استعمالها، وكيف عليك قياس الجرعة اليومية التي تم وصفها لك.
- يجب أن تستعمل دائمًا محققن فموية متعددة الاستعمال تكون مزودة مع إيفريسيدي لقياس الجرعة اليومية التي تم وصفها لك.
- تتضمن كل عبوة محقنتين فمويتين من كلا الحجمين، للاستعمال في حال ضياع أو تضرر إحدى المحققن. اتصل بالصيدلي أو الطبيب في حال ضياع أو تضرر كلا المحققنتين.
- انظر "**كيف تختار المحقنة الفموية الملائمة للجرعة التي تم وصفها لك**". اسأل الصيدلي إذا كانت لديك أسئلة حول اختيار المحقنة الفموية الملائمة.


## מידע חשוב אודות אווריסדי

- יש לבקש מהרופא או הרופא להראות לך באיזה מזרק פומי עלייך להשתמש וכיידן למדוד את המנה היומית שנרשמה לך.
- תמיד יש להשתמש בمزרקים הפומיים הרב פעמיים המשופקים יחד עם אווריסדי למדידת המנה היומית שנרשמה לך.
- בכל אריזה מסופק 2 מזרקים פומיים מכל גודל, לרוב אחד המזרקים יead או ינתק. צור קשר עם הרוקח או הרופא במקרה שני המזרקים אבדו או ניזוקו.
- ראה "**כיצד יש לבחור את המזרק הפומי המתאים למינון שנרשם עבורך**". שאל את הרוקח אם יש לך שאלות בנוגע לבחירת המזרק הפומי המתאים.

- If the bottle adapter is not in the bottle, **do not** use Evrysdi and contact your pharmacist.
- The oral solution may be stored at room temperature (below 40°C) for no more than a total of 120 hours (5 days). Monitor the total time outside the refrigerator (below 40°C). **Do not** use Evrysdi after the '**Discard after**' date written on the bottle label or if the bottle has been stored at room temperature (below 40°C) for more than a total of 120 hours (5 days).
- If the '**Discard after**' date is not written on the bottle, consult the pharmacist.
- Discard the medicine if the bottle has been stored for any period of time at **above** 40°C.
- لا يجوز استعمال إيفريسيدي إذا كان ملائم القينية غير متوفّر في القينية، لهذا عليك التوجّه إلى الصيدلي.
- يمكن تخزين محلول الشرب بدرجة حرارة الغرفة (تحت 40°C) لفترة زمنية لا تتجاوز 120 ساعة (5 أيام). يجب مراقبة الوقت الإجمالي خارج الثلاجة (تحت 40°C). لا يجوز استعمال إيفريسيدي بعد التاريخ المذكور إلى جانب "يجب التخلص بعد" المذكور على لاصقة القينية، أو إذا تم تخزين قينية محلول بدرجة حرارة الغرفة (تحت 40°C) لمدة زمنية إجمالية تتجاوز 120 ساعة (5 أيام).
- إذا لم يذكر تاريخ "يجب التخلص بعد" على القينية يجب التوجّه إلى الصيدلي.
- يجب التخلص من الدواء إذا تم تخزين القينية لفترة ما بدرجة حرارة فوق 40°C.
- لا يجوز خلط إيفريسيدي مع تركيبات تغذية للأطفال أو مع الحليب.
- אין להשתמש באוריסדי אם מתאים הבקבוק אינם נמצא בבקבוק ויש לפנות לרוקח.
- ניתן לאחסן את התמיסה לשתייה בטמפרטורת החדר ( מתחת ל 40°C ) למשך זמן שלא עולה על 120 שעות ( 5 ימים ). יש לעקוב אחר הזמן הכלול מחוץ למקרר ( מתחת ל 40°C ). אין להשתמש באוריסדי לאחר תאריך 'השלך לאחר' המצוין על תווית הבקבוק, או אם בקבוק התמיסה אוחסן בטמפרטורת החדר ( מתחת ל 40°C ) למשך פרק זמן כולל העולה על 120 שעות ( 5 ימים ).
- אם תאריך 'השלך לאחר' אינו מצוין על הבקבוק יש לפנות לרוקח.
- יש להשילר את התרופה אם הבקבוק אוחסן במשך תקופה כלשהי בטמפרטורה **מעל** 40°C.

- **Do not** mix Evrysdi with formula milk or milk.
- **Do not** use Evrysdi if the bottle or the oral syringes are damaged.
- **Avoid** getting Evrysdi on your skin. If Evrysdi gets on your skin, wash the area with soap and water.
- If you spill Evrysdi, dry the area with a dry paper towel and then clean with soap and water. Throw away the paper towel in the waste and wash your hands well with soap and water.
- If there is not enough Evrysdi left in the bottle for your prescribed dose, discard the bottle with remaining Evrysdi and used oral syringes; use a new bottle of Evrysdi to take your full prescribed dose. **Do not** mix Evrysdi from a new bottle with Evrysdi from the bottle you are currently using.

- لا يجوز استعمال إيفريسيدي إذا كانت القنينة أو المحقق الفموية متضررة.
- يجب الامتناع عن أن يلامس إيفريسيدي الجلد. في حال لامس إيفريسيدي الجلد، يجب غسل المنطقة بالصابون والماء.
- إذا انسكب إيفريسيدي، يجب تجفيف المنطقة بمنشفة ورقية جافة، ثم تنظيفها بالماء والصابون. يجب التخلص من المنشفة الورقية في سلة النفايات وشطف اليدين جيداً بالماء والصابون.
- إذا لم تبق في القنينة كمية كافية من إيفريسيدي للجرعة التي تم وصفها لك، يجب التخلص من القنينة التي تتضمن الكمية المتبقية من إيفريسيدي مع المحقق الفموية المستعملة؛ يجب استعمال قنينة إيفريسيدي جديدة لتناول الجرعة الكاملة التي تم وصفها لك. لا يجوز خلط إيفريسيدي المتوفر في قنينة جديدة مع إيفريسيدي في قنينة قيد الاستعمال حالياً.
- אין לערוב אווריסדי עם תרכובות מזון לתינוקות או עם חלב.
- אין להשתמש באווריסדי אם הבקבוק או המזרקם הפומיים פגומים.
- יש להימנע מגע של אווריסדי עם העור, יש במקרה של מגע של אווריסדי עם העור, יש לרוחץ את האזור עם סבון ומים.
- אם אווריסדי נשפכת, יש ליבש את האזור באמצעות מגבת ניר יבשה ולאחר מכן לנוקת עם מים וסבון. יש לזרוק את מגבת הניר לפח ולשטוף את הידיים היטב במים וסבון.
- אם לא נותרה בבקבוק כמות מספקת של אווריסדי עברו המנה הרשומה לך, יש להשליך את הבקבוק בו נותרה אווריסדי יחד עם המזרקם הפומי המשומשים; יש להשתמש בבקבוק אווריסדי חדש לנטילת המנה המלאה שנרשמה לך. אין לערוב אווריסדי מבקבוק חדש עם אווריסדי 4 מבקבוק בו אתה משתמשCut.



איור א / الرسم أ

**Each EVRYSDI pack contains (See Figure A):**

- ❶ 1 Evrysdi bottle with bottle adapter and cap
- ❷ 2 re-usable 6 mL oral syringes
- ❸ 2 re-usable 12 mL oral syringes

تحتوي كل عبوة إيفريسيدي على  
(انظر/ي الرسم "أ"):

- ❶ 1 قنينة إيفريسيدي مع ملائم  
قنينة وغطاء
- ❷ 2 محافن فموية متعددة  
الاستعمال حجم كل منها 6 مل  
بنפח 6 م"ل
- ❸ 2 محافن فموية متعددة  
الاستعمال حجم كل منها  
12 مل


**כל אריזה של אורייסדי מכילה  
(ראה/ ايور א):**

- ❶ 1 بكبוק אורייסדי  
עם מתאם בקבוק ומכסה
- ❷ 2 מזרקים פומיים רב פעמיים  
بنפח 6 מ"ל
- ❸ 2 מזרקים פומיים רב פעמיים  
بنפח 12 מ"ل

**Overview of re-usable oral syringes  
(see Figure B)**

لمحة عامة عن المحقن الفموية متعددة الاستعمال  
(انظر الرسم "ب")

סקירה כללית של מזרקים פומיים רב  
פעמים (ראה/ ايور ب)



ايور ب / الرسم ب / Figure B

כיצד יש לאחסן אווריסדי

ראה סעיף "תנאי אחסון" בעלון  
לצרוך לקבלת מידע מלא.


### א) הכנת המנה שנרשמה לך ומשיכתה למזרק

כיצד יש לבחור את המזרק  
הפומי המתאים למינון שנרשם  
עבורי

- אם המינון היומי של אווריסדי  
 שנרשם לך או לילדך הינו בין  
 1 מ"ל ל-6 מ"ל, יש להשתמש  
 בمزרק פומי בנפח של 6 מ"ל  
 (תוית אפורה). היועץ ברופא  
 או ברוקח לגבי עיגול המנה  
 היומית שלך או של יליך ל-0.1-  
 0.2 מ"ל הקרוב ביותר.

## How to store Evrysdi

See the section 'Storage conditions' in the patient information leaflet for full information.



איור ג / الرسم ج / Figure C

## كيفية تخزين إيفريسيدي

انظر البند "شروط التخزين" في  
النشرة للمستهلك للحصول على  
معلومات كاملة.


### أ) تحضير الجرعة التي تم وصفها لك وسحبها إلى داخل المحقنة

كيف تختار المحقنة الفموية  
المالئة للجرعة التي تم وصفها لك

## How to select the correct oral syringe for your dose

- If the daily dose of Evrysdi  
 you or your child were  
 prescribed is between 1 mL  
 and 6 mL, use a 6-mL oral  
 syringe (grey label). Ask  
 your doctor or pharmacist  
 about rounding your or your  
 child's daily dose to the  
 nearest 0.1 mL.

- If the daily dose of Evrysdi you or your child were prescribed is over 6 mL, use a 12-mL oral syringe (brown label). Ask your doctor or pharmacist about rounding your or your child's daily dose to the nearest 0.2 mL.
- إذا كانت جرعة إيفريسيدي اليومية التي تم وصفها لك أو لابنك أعلى من 6 مل، عليك استعمال محقنة فموية بحجم 12 مل (لاصقة بنية). استشر الطبيب أو الصيدلي لتقريب الجرعة اليومية التي تم وصفها لك أو لابنك إلى المقدار الأقرب من 0.2 مل.
- אם המינון היומי של אווריסדי שנרשם לך או לילדך הינו גבוה מ-6 מ"ל, יש להשתמש במצרק פומי בנפח של 12 מ"ל (תווית חומה). היועץ ברופא או ברוקח לגבי עיגול המנה היומית שלך או של ילך ל-0.2 מ"ל הקרוב ביותר.



איור ד / الرسم د

## How to withdraw your dose of Evrysdi

### Step A1

Remove the cap by pushing it down and then twisting it to the left (counter-clockwise) (See Figure D).

Do not throw away the cap.

## كيفية تحضير جرعة إيفريسيدي

### المرحلة "أ"

يجب إزالة الغطاء عبر دفعه نحو الأسفل وتحريكه يساراً (عكس اتجاه عقارب الساعة) (الرسم "د").


يُمنع التخلص من الغطاء.

## כיצד להכין את המנה של אווריסדי

### שלב א1

יש להסיר את המכסה על ידי  
דחיפתו מטה וסיבוב שמאלה (נגד  
\_CLOCKWISE) (ראה איור ד).

אין להשליך את המכסה.



איור ה / الرسم هـ

### Step A2


Push the plunger of the oral syringe all the way in to remove any air in the syringe (See Figure E).

### المرحلة "أ2"

يجب دفع مكبس المحقنة الفموية حتى النهاية باتجاه أسفل المحقنة للتخلص من الهواء في المحقنة (الرسم "هـ").

### שלב א2

יש לדחוף את בוכנת המזרק הפומי עד הסוף לתחתית המזרק לסילוק כל האוויר במזרק (ראה איור ה).



איור ו / الرسم و /

### Step A3


Place the bottle of Evrysdi on a flat surface. Keeping the bottle upright, insert the syringe tip into the bottle adapter (see Figure F).

### المرحلة "أ3"

يجب وضع قنينة إيفريسيدي على مسطح مستو. يجب إدخال طرف المحقنة في ملائم القنينة، مع الحرص على أن تكون القنينة عمودية (انظر الرسم "و").

### שלב א3

יש להניח את הבקבוק של אווריסדי על משטח שטוח. יש להחדיר את קצה המזרק למתאים הבקבוק, תוך שמירה על הבקבוק במנח אנכי (ראה איור ו).



איור ז / الرسم ز

#### Step A4

Carefully turn the bottle upside down with the syringe tip firmly inserted into the bottle adapter (Figure G)

#### المرحلة "أ" 4

يجب قلب القنينة بحذر بينما يكون طرف المحقنة مثبتاً جيداً في ملائم القنينة (انظر الرسم "ز").

#### שלב A4

יש להפוך ב זהירות את הבקבוק בעוד קצה המזרק מוחזק היטב בתוך מתאם הבקבוק (ראה איור ז).

## שלב 5

יש למשוך לאט את בוכנת המזרק אחוריית עד לקבלת מלאה נפח המנה של אווריסדי שנקבעה לך. על החלק העליון של מעצור הבוכנה השחור להיות בכו ישר עם סימון ה-מ"ל על גבי המזרק הפומי המראה את המנה היומית שנקבעה בעבר (ראה איור ח). לאחר שאיבת המינון הנכון, יש להחזיק את הבוכנה במקום על מנת למנוע תזוזה של הבוכנה.

## المرحلة "أ" 5


يجب سحب مكبس المحقنة ببطء نحو الخلف وذلك حتى الحصول على كل مقدار جرعة إيفريسيدي التي تم وصفها لك.

يجب أن يكون القسم العلوي من مانع حركة المكبس الأسود بخط مستقيم مع علامة الـ ملل على المحقنة الفموية التي تشير إلى الجرعة اليومية التي تم وصفها لك (انظر الرسم "ح").


بعد سحب الجرعة الصحيحة، يجب الإمساك بالمكبس في مكانه لمنع تحركه.

## Step A5

Slowly pull back on the plunger to withdraw the complete volume of your dose of Evrysdi. The top of the black plunger stopper must line up with the mL marking on the oral syringe that shows your daily dose (See Figure H). After you have drawn up the correct dose, **hold the plunger in place to keep it from moving.**



איור ח / الرسم ح



איור ט / الرسم ط / I

**Step A6**  
**Continue to hold the plunger in place to stop it moving.** Leave the oral syringe in the bottle adapter and turn the bottle to an upright position. Place the bottle onto a flat surface. Remove the oral syringe from the bottle adapter by gently pulling straight up on the oral syringe (See Figure I).

### المرحلة "أ" 6

يجب متابعة الإمساك بالمكبس في مكانه لمنع تحركه. يجب إبقاء المحقنة الفموية في ملائم القنينة وقلب القنينة بحيث تكون عمودية. يجب وضع القنينة على مسطح مستو. يجب إزالة المحقنة الفموية عن ملائم القنينة عبر سحبها بلطف نحو الأعلى (انظر الرسم "ط").

**שלב א6**  
יש להמשיך להחזיק את הבוכנה במקום על מנת למנוע תזוזה של הבוכנה. יש להשאיר את המזרק הפומי בתווך מתאים הבקבוק ולהפוך את הבקבוק למנח אנכי. יש להניח את הבקבוק על משטח שטוח. יש להסיר את המזרק הפומי ממתאים הבקבוק על ידי משיכה עדינה כלפי מעלה של המזרק הפומי (ראה איור ט).

## שלב A7


יש לאחוד בمزרק הפומי כאשר קצה המזרק פונה כלפי מעלה. יש לבדוק את האוריסדי שבמזרק הפומי. אם יש בעות אוויר גדלות בתוך המזרק הפומי (ראה איור י) או אם שابت מינון לא נכון של אוריסדי, יש להחזיר היטב את קצה המזרק לתוך מתאם הבקבוק, כאשר הבקבוק במנח אנכי. יש לדוחוף את הבוכנה מטה כר שאוריסדי תזרום חזרה לבקבוק, ולהזור על שלבים 4 עד 7. יש ליטול או לתת אוריסדי מיד לאחר שאיבת התרופה אל תוך המזרק הפומי. אם התרופה לא ניטלה בתוך 5 דקות, יש להשליך את אוריסדי מהמזרק הפומי.

## المرحلة "أ" 7


يجب الإمساك بطرف المحقنة الفموية بينما تكون المحقنة متوجهة نحو الأعلى. يجب فحص إيفريسيدي في المحقنة الفموية. إذا كانت هناك فقاعات هواء كبيرة في المحقنة الفموية (انظر الرسم "ي") أو إذا سحبت جرعة غير صحيحة من إيفريسيدي، يجب إدخال طرف المحقنة جيداً في ملائم القنينة، بينما تكون القنينة عمودية. يجب دفع المكبس نحو الأسفل بحيث يدخل إيفريسيدي إلى القنينة ثانية، ثم عليك تكرار المراحل "أ" 4 حتى "أ" 7. يجب تناول أو إعطاء إيفريسيدي فوراً بعد سحب الدواء إلى المحقنة الفموية. إذا لم يتم تناول الدواء خلال 5 دقائق، يجب التخلص من إيفريسيدي في المحقنة الفموية.

## Step A7

Hold the oral syringe with the syringe tip pointing up. Check the Evrysdi in the oral syringe. If there are large air bubbles in the oral syringe (See Figure J) or if you have drawn up the wrong dose of Evrysdi, insert the syringe tip firmly into the bottle adapter keeping the bottle upright. Push the plunger all the way down so that the Evrysdi flows back into the bottle, and repeat Steps A4 to A7. **Take or give Evrysdi immediately after it is drawn up into the oral syringe.** If the medicine is not taken within 5 minutes, discard Evrysdi from the oral syringe.



איור י / الرسم ي / J



איור י"א / الرسم ك

### Step A8

Put the cap back on the bottle. Turn the cap to the right (clockwise) to tightly close the bottle (See Figure K). Do not remove the bottle adapter. Return the bottle to the refrigerator, keeping the bottle upright.

### المرحلة "أ" 8

أغلق غطاء القنينة. أدر الغطاء يميناً (باتجاه عقارب الساعة) لإغلاق القنينة جيداً (انظر الرسم "ك").  
يُمنع إخراج الملائم من القنينة. يجب إعادة القنينة إلى الثلاجة والاحتفاظ بها بشكل عمودي كل الوقت.

### שלב 8

יש לסגור את מכסה הבקבוק.  
סובב את המכסה ימינה (עם כיוון השעון) כדי לסגור היטב את הבקבוק (ראה איור י"א). אין להוציא את המתאים מהבקבוק.  
יש להחזיר את הבקבוק למקרר כאשר אנכי (מצב עומד).

If you or your child are taking your dose of Evrysdi by mouth, follow the instructions in **"B) How to take a dose of Evrysdi by mouth"**.

If you or your child are taking your dose of Evrysdi through a gastrostomy tube, follow the instructions in **"C) How to give a dose of Evrysdi through a gastrostomy tube (G-tube)"**.

If you or your child are taking your dose of Evrysdi through a nasogastric tube, follow the instructions in **“D) How to give a dose of Evrysdi through a nasogastric tube (NG-tube)”**.

Evrysdi's oral syringes are specifically designed to be compatible with the ENFit® system. If your feeding tube is not ENFit® compatible, you may need an ENFit® transition connector to connect the Evrysdi syringe to your feeding tube (G-tube or NG-tube).

17

إذا كنت أنت أو ابنك تتناولون جرعة إيفريسيدي عبر الفم، يجب اتباع التعليمات في البند "ب) كيف يجب تناول جرعة إيفريسيدي عبر الفم".

إذا كنت أنت أو ابنك تتناولان جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب معدى معموي، يجب اتباع التعليمات في الـ "ج" كيف يجب إعطاء جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب معدى معموي (G-tube)." (G-tube)

إذا كنت أنت أو ابنك تتناولان جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب أنفي معدى (nasogastric tube)، يجب اتباع التعليمات في البند "د) كيف يجب إعطاء جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب أنفي معدى (أنبوب أنفي معدى (NG-tube)." .

صممت محافن ايقريسدي الفموية خصيصا بحيث تكون ملائمة لمنظومة ENFit®. إذا لم يكن أنبوب التغذية الخاص بك ملائماً لـ ENFit®, فقد تحتاج إلى موصل لـ ENFit®, لوصل إبرة ايقريسدي بأنبوب التغذية الخاص بك (NG- G-tube) أو (tube).

אם אתה או יולדך נוטלים את המנה של אורייסדי דרך הפה, יש לעקב אחר ההוראות בסעיף "ב") כיצד יש ליטול מנה של אורייסדי דרך הפה".

אם אתה או ילך נוטלים את המנה של אווריסדי דרך גסטרוסטום, יש לעקוב אחר ההוראות בסעיף "ג" כיצד יש לחת מנה של אווריסדי דרך גסטרוסטום ("G-tube").

אם אתה או יולדך נוטלים את המנה של אווריסדי דרך זונדה (צינור נאוזגסטרי), יש לעקבות אחר ההוראות בסעיף "ד" כיצד יש לחתת מנה של אווריסדי דרך זונדה (צינור נאוזגסטרי NG-tube").

המזרקים הפומיים של אווריסדי תוכננו במיוחד כדי להיות תואמים למערכת ENFit®. אם צינור ההזנה שלך אינו תואם ENFit®, יתכן שתצטרך לחבר מעבר ENFit® על מנת לחבר את המזרק של אווריסדי לצינור ההזנה שלך (NG-tube או G-tube).



איור י"ב / الرسم ل / Figure L

## B) How to take a dose of Evrysdi by mouth

Sit upright when taking a dose of Evrysdi by mouth.

### Step B1

Place the oral syringe into the mouth **with the tip along either cheek**.

**Slowly** push the plunger all the way down to give the full dose of Evrysdi (See Figure L).

**Giving Evrysdi into the back of the throat or too fast may cause choking.**

## ב) كيف يجب تناول جرعة إيفريسيدي عبر الفم

يجب الحفاظ على الجلوس المنتصب  
أثناء تناول جرعة إيفريسيدي  
عبر الفم.

### المرحلة "ב"

يجب إمساك المحقنة الفموية في الفم بينما يكون طرفها قريبا من أحد الخدين.

ادفع ببطء المكبس حتى الطرف الأسفل من المحقنة لإعطاء جرعة كاملة من إيفريسيدي (انظر الرسم L").

قد يسبب إعطاء إيفريسيدي في الحنجرة أو بسرعة كبيرة الاختناق.

## ב) כיצד יש ליטול מנה של אוווריסדי דרך הפה


יש לשבת זקוף בעת נטילת מנה של אוווריסדי דרך הפה.

### שלב ב1

יש להחזיק את המזרק הפה/  
בתוכה הפה כאשר הקצה מוצמד  
לאחת משתי הלח"ים.

דוחף באיטיות את הבוכנה עד  
הקצה התיכון של המזרק על מנת  
لتת את מלאו המנה של אוווריסדי  
(ראה איור י"ב).

מתן אוווריסדי לתוך הגרון או  
במהירות רבה מדי עלול לגרום  
לחנק.



איור י"ג / الرسم م

### Step B2

Check that there is no Evrysdi left in the oral syringe  
(See Figure M).

### المرحلة "ب" 2

يجب التأكد من أنه لم يبق إيفريسيدي في المحقنة الفموية  
(انظر الرسم "م").

### שלב ב 2

יש לבדוק כי לא נותרה אווריסדי  
בתוך המזרק הפומי  
(ראה איור י"ג).



איור י"ד / الرسم ن / Figure N

### Step B3

**Drink some** water right after taking the dose of Evrysdi to make sure that the entire dose is swallowed (See Figure N).

**Go to Step E for cleaning of the syringe.**

### المرحلة "ب" 3

يجب شرب القليل من الماء بعد تناول جرعة إيفريسيدي فوراً، وذلك للتأكد من ابتلاع جرعة الدواء بالكامل (انظر الرسم "ن").

انتقل إلى المرحلة "هـ" لتنظيف المحقنة.

### שלב ב 3

יש לשתות מעט מים מיד לאחרINETILAT HAMNAH SHAL OVRISDI, UL MANT LOODA CI NBLUA MNAT HATRوفה BSHLMOTHA (RAAH AIYOR YD).

עבור לשלב ה' לניקוי המזרק.

## ג) כיצד יש לתת מנתה של אווריסדי דרך גסטרוסטום

אם אתה נותן אווריסדי דרך גסטרוסטום, יש לבקש מהרופא או האחות הדרכה כיצד יש לבדוק את הגסטרוסטום לפני מתן אווריסדי.

### שלב ג' 1

יש להחדיר את קצה המזרק הפומי לצינור הגסטרוסטום. דחוף באיטיות את הבוכנה עד הקצה התיכון של המזרק על מנת לתת את מלאה המנה של אווריסדי (ראה איור ט'א).

## ج) كيف يجب إعطاء جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب معدى معوي

إذا كنت تعطي جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب معدى معوي، يجب أن تطلب من الطبيب أو الممرضة أن يقدما لك ارشادا حول كيفية فحص الأنابيب المعدية المعوية قبل إعطاء إيفريسيدي.

### المرحلة "ج" 1


يجب إدخال طرف المحقنة الفموية في الأنابيب المعدية المعوية. ادفع ببطء المكبس حتى الطرف الأسفل من المحقنة لإعطاء جرعة كاملة من إيفريسيدي (انظر الرسم "س").

## C) How to give a dose of Evrysdi through a gastrostomy tube

If you are giving Evrysdi through a gastrostomy tube, ask your doctor or nurse to show you how to inspect the gastrostomy tube before giving Evrysdi.

### Step C1

Place the oral syringe tip into the gastrostomy tube. Slowly push the plunger all the way down to give the full dose of Evrysdi (See Figure O).




איור ט'א / الرسم س / Figure O

**שלב ג' 2**

יש לבדוק כי לא נותרה אווריסדי  
בתוך המזרק (ראה איור ט"ז).

**المرحلة "ج" 2**


يجب التأكيد من أنه لم يتبق إيفريسيدي  
في المحقنة  
(انظر الرسم "ع").



איור ט"ז / الرسم ع

**Step C2**

Check that there is no Evrysdi left in the oral syringe (see Figure P).



איור י"ז / الرسم ف / Figure Q

### Step C3

Flush the gastrostomy tube with 10 to 20 mL of water right after giving the dose of Evrysdi (See Figure Q).

**Go to Step E for cleaning of the syringe.**

### المرحلة "ج" 3

يجب شطف الأنابيب المعدية المعوي بالماء بـ 10 إلى 20 مللي متر أوريسي (رها آير ي"ز). بعد إعطاء إيفريسيدي فوراً (انظر الرسم "ف").

انتقل إلى المرحلة "هـ" لتنظيف المحققة.

### שלב ג 3

יש לשטוף את צינור הגסטרווסטום עם 10 עד 20 מ"ל מים מיד לאחר מתן אוורייסדי (ראה אייר י"ז).

עבור לשלב ה' לניקוי המזרק.



איור י"ח / الرسم ص / Figure R

#### D) How to give a dose of Evrysdi through a nasogastric tube (NG tube)

If you are giving Evrysdi through a nasogastric tube, ask your doctor or nurse to show you how to inspect the nasogastric tube before giving Evrysdi.

##### Step D1

Place the oral syringe tip into the nasogastric tube. Slowly press the plunger all the way down to give the full dose of Evrysdi (See Figure R).

#### د) كيف يجب إعطاء جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب أنفي معدى (أنبوب NG)

إذا كنت تعطي جرعة إيفريسيدي عبر أنبوب الأنفي المعدى، يجب أن تطلب من الطبيب أو الممرضة أن يقدما لك أرشادا حول كيفية فحص الأنبوب الأنفي المعدى قبل إعطاء إيفريسيدي.

##### المرحلة "د" ١

يجب إدخال طرف المحقنة الفموية في الأنبوب الأنفي المعدى. ادفع ببطء المكبس نحو الأسفل وحتى النهاية للتأكد من إعطاء جرعة كاملة من إيفريسيدي (انظر الرسم "ص").

#### ד) כיצד יש לתת מנתה של אווריסדי דרך זונדה (צינור נאוזוגסטרי; צינור NG)

אם אתה נותן אווריסדי דרך זונדה, יש לבקש מהרופא או האחות הדריכה כיצד יש לבדוק את הזונדה לפני מתן אווריסדי.

##### שלב ד'

יש להחדיר את קצה המזרק הפומי לצינור הזונדה. דחוף באיטיות את הבוכנה מטה עד הסוף על מנת לתת את מלאה המנתה של אווריסדי (ראה איור י"ח).

**שלב ד**


יש לבדוק כי לא נותרה אווריסדי בתוך המזרק הפה (ראה איור "ט").

**المرحلة "د"**

يجب التأكد من أنه لم يتبق إيفريسيدي في المحقنة الفموية (انظر الرسم "ق").

**Step D2**

Check that there is no Evrysdi left in the oral syringe (see Figure S).



איור "ט" / الرسم ق /  
Figure S / drawing C



איור כ / الرسم ر / Figure T

### Step D3

Flush the nasogastric tube with 10 to 20 mL of water right after giving the dose of Evrysdi (See Figure T).

Go to Step E for cleaning of the syringe.

### المرحلة "د" 3

يجب شطف الأنابيب الأنفي المعدني بالماء بـ 10 حتى 20 مل بعد إعطاء ايفريسدي فوراً (انظر الرسم "ر").

انتقل إلى المرحلة "هـ" لتنظيف المحققة.

### שלב ד

יש לשטוף את צינור הזונדה עם 10 עד 20 מ"ל מים מיד לאחר מתן אווריסדי (ראה איור כ).

עבור לשלב ה' לניקוי המזרק.

**ה) כיצד לנקיות את המזרק  
הפומי לאחר השימוש**

**שלב 1**

יש להסיר את הבוכנה מהמזרק  
הפומי על ידי משיכת הבוכנה  
מהמזרק, עד שהבוכנה יוצאה  
מהמזרק.

יש לשטוף היטב את שפופרת  
המזרק הפומי מתחת זרם מים  
נקים (ראה איור כ"א).

**المرحلة "هـ" 2**

يجب شطف المكبس جيداً بماء  
متدفق ونظيف (انظر الرسم "ت").

**שלב 2**

يشطוף المكبس جيداً بماء  
متدفق ونظيف (انظر الرسم "ت").

**E) How to clean the oral  
syringe after use**

**Step E1**

Remove the plunger from  
the oral syringe by pulling  
the plunger right out of the  
syringe.


Rinse the oral syringe barrel  
well under clean running  
water (See Figure U).

**هـ) كيف تتنظيف المحقنة الفموية  
بعد الاستعمال**


**المرحلة "هـ" 1**

يجب إزالة مكبس المحقنة الفموية  
عبر سحب المكبس من المحقنة،  
حتى يخرج المكبس من المحقنة.  
يجب شطف أنبوبة المحقنة الفموية


جيداً بماء متدفق ونظيف (انظر  
الرسم "ش").



איור כ"א / الرسم ش / Figure U



איור כ"ב / الرسم ت / Figure V



איור כ"ג / الرسم ث / Figure W

### Step E3

Check that the oral syringe barrel and plunger are clean. Place the oral syringe barrel and plunger on a clean surface in a safe place to dry (See Figure W).

Wash your hands with soap and water.

After drying the barrel and plunger, reassemble the plunger into the oral syringe barrel and store the syringe with your medicine.

### المرحلة "هـ" 3

يجب التأكد من أن أنبوبة المحقنة الفموية والمكبس نظيفان.

يجب السماح لأنبوبة المحقنة الفموية والمكبس أن يجفَا على مسطح نظيف في مكان آمن (انظر الرسم "ث").  
يجب غسل اليدين بالماء والصابون.

بعد تجفيف أنبوبة المحقنة الفموية والمكبس، يجب تثبيت المكبس مجدداً في أنبوبة المحقنة الفموية، وتخزين المحقنة مع الدواء.

### שלב 3

יש לבדוק ששפופרת המזרק הפהוני והבוכנה נקיים.

יש להניח את שפופרת המזרק הפהוני ואת הבוכנה ליבוש על משטח נקי בمكان בטוח (ראה איור כ"ג).

יש לשטוף את הידיים עם מים וובן.

לאחר ייבוש שפופרת המזרק הפהוני והבוכנה, יש להרכיב מחדש את הבוכנה אל תוך שפופרת המזרק הפהוני ולאחסן את המזרק עם התרופה.

