

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات 1986)

يُسوّى هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

دايبيجاتران تيفع 110 ملغ

كيسولات

المدة الفعّالة:

تحتوي كل كبسولة من **دايبيجاتران تيفع 110 ملغ** على:

110 ملغ دايبيجاتران إيتيكسيلات (كيميولات)

للحصول على معلومات عن المركّب في الفعّالة انظر البند 6 - «معلومات إضافية».

أقرأ النشرة باعتماد حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطه للأخرين. قد يضرهم هذا الدواء حتى لو بدأ لك مرضهم مثله.

تحقق من معلومات لمنقلى العلاج:

بمطابقة هذه البطاقة على معلومات وأقنية هامة، يجب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج
دايبيجاتران تيفع وخلال فترة الاستعمال
دايبيجاتران تيفع تحتوي البطاقة على معلومات مخصصة لمنقلى العلاج وكذلك للمهام الطبي، وهي تزود منكلى العلاج بالإرشاد حول كيفية التأكّيل إلى الحد الأدنى من خطر حدوث النزيف الدموي الناتج عن العلاج
بأي من المستحضرات المضادة للتخثر.

كذلك، تحتوي البطاقة على التفاصيل الشخصية لمنقلى العلاج وعلى معلومات للمهام الطبي عن الدواء
دايبيجاتران تيفع. اعرض هذه البطاقة على كل من يشارك في علاجك من أفراد الطاقم الطبي.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

يستخدم دايبيجاتران تيفع على المادة الفعّالة دايبيجاتران إيتيكسيلات، التي تنتمي لفصيلة الأدوية المسماة "مضادات التخثر". دايبيجاتران تيفع مخصص للباليين:

1. لمنع الإصابة لتكوّن خثرات دموية في الأوردة بعد جراحات العظام الإيقراطية لاستئبدال الكلي لمفصل الركبة أو الاستئبدال الكلي لمفصل الورك.

2. لمنع السكتة الدماغية والإصمام الجهازي لدى المرضى الباليين الذين يعانون من دقات قلبية غير منتظمة (رجفان أذيني) غير منسوبة إلى مرض صمامي.

3. لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (الخثار الوريدي العميق (DVT)) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (الإصمام الرئوي (PE)) ولتعمع معودة الخثرات الدموية في هذه الأوعية الدموية.

الفصيلة العلاجية: مضادات التخثر.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (اللائع على قائمة المركبات الفعّالة، انظر البند 6).
- كنت تعاني من خال شديد في وظيفة الكلية.
- كنت تعاني من نزيف دموي نشط.
- كنت تعاني من مرض ما في أحد أعضاء الجسم، والذي قد يزيد من خطر نشوء نزيف خطير (مثلاً قرحة المعدة، الإسهال أو النزيف الدماعي أو إذا خضعت مؤخرًا لجراحة في مامك أو في عينيك).
- كنت معرضًا لخطر متزايد لنشوء نزيف دموي نتيجة لمسبب خلقي (ولادي)، الاستعمال الأوية الأخرى أو مرض غير معلوم.
- كنت تستعمل أدوية أخرى مضادة للتخثر، مثل: وارفارين (warfarin) المعروف بلسم كورماين، ريفاروكسابان (rivaroxaban) ، إبيكسابان (apixaban) أو هيبيرين، إلا بعد حدوث تحقّق من العلاج المضاد للتخثر، عند إدخال الأبوب قسطرة وريدي أو شرياني في جسمك وتلقّفك من خلاله هيبيرين من أجل إيقاظه من التخثر، أو أثناء تنظيم نظم قلبك عن طريق إجراء طبي يسمى الاستئبدال القسطري، في إحدى الغرف الأذينية.
- كنت تعاني من خال ملحوظ في وظيفة الكبد أو من مرض كبدي قد يتسبكان خطرًا على الحياة.
- كنت تستعمل كيتوكزانول أو إيتراكوزانول كعلاج عن طريق الفم، وهما دواءان مخصصان لعلاج التهابات الفطري.
- كنت تستعمل سيكلوسبورين عن طريق الفم، وهو دواء يُستعمل لمنع رفض العضو المزروع.
- كنت تستعمل درونيدارون، وهو دواء يُستعمل لعلاج اضطرابات نظم القلب.
- كنت تستعمل مستحضرا مرطّبًا من نمج جليكيرايفير وبيبيرستيفير، وهو دواء مضاد للفطريات يعطى لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من النوع C (هيبويتيس C).
- تزرع ضمام اصطناعي في قلبك، والذي يتطلب تمييمًا دائمًا للدم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال دايبيجاتران تيفع. قد تتصطب إلى اشتراء عبيك أيضًا خلال فترة العلاج
دايبيجاتران تيفع. إذا أحسست بأعراض أو إذا اضطرت للتلصوع جراحة:

- وجود آفات، حالات طبية أو علاجات دوائية (مثل: مضادات التهاب الالتهابويروبية، مثلاً نوروفين أو أنفيل، مضادات الصفائح الدموية، مثلاً الأسبرين، مضادات الالتهاب والقلق من فصيلة SSRI أو SNRI) قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر حدوث نزيف، وذلك بخصاص تمييمًا بواسطة الطبيب للتحقّق مقابل الفائدة. ينطبق هذا بشكل إجمالي على منقلى العلاج الذي سنّه فوق الـ 75 أو لديه خال في الوظيفة الكلوية، أو منقلى العلاج الذي يستعمل بشكل متزامن أدوية مثل: فيرياميل (فرطضمد الفم)، أمبودارون (اضطرابات نظم القلب) أو تيكاغريلور (لتقليل خطر الأحداث القلبية أو عائية) أو المروج مما سبق ذكره. سيوصي الطبيب بالعلاج بدايبيجاتران تيفع فقط إذا كانت الفائدة تفوق خطر حدوث نزيف دموي.

قبل العلاج بدايبيجاتران تيفع أخير الطبيب:

إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من أمراض وحالات طبية، تحديداً تلك الأوردة في القائمة أدناه:

- إذا كان لديك مؤخرًا نزيف دموي.
- إذا خضعت لأخذ خزعة (ببوسيدي) في الشهر الأخير.
- إذا كنت تعاني من إصابة خطيرة تعرضت لها مؤخرًا (مثل كسر في العظم، إصابة في الراس أو أي إصابة تتسبب علاجًا جراحيا).
- إذا كنت تعاني من التهاب في المرءة أو في المعدة.
- إذا كنت تعاني من ارتجاع حمدي مرئبي أو من مشكلة تتميز بدخول عصارة من المعدة إلى المرءة.
- إذا كنت تستعمل أدوية تزيد من خطر حدوث نزيف (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية" أدناه).
- إذا كنت تستعمل أدوية مضادة للالتهاب مثل: ديكلوفيناك، إيبوبروفين،بيروكسيكام.
- إذا كنت تعاني من ثوث في القلب (التهاب الشغاف الجرثومي).
- إذا كنت تعلم أن لديك تدن في الوظيفة الكلوية أو إذا كنت تعاني من الخجفات (تشتمل الأعراض على العطش والاختفاض في التبول، وقد يتسبب البول لونا غامقًا (مرکزًا)).
- إذا كان عمرك فوق 75 عامًا.
- إذا كان وزك 50 كيلو غرامًا أو أقل.
- إذا أصبت بنوبة قلبية أو شُخص لديك خطر متزايد لإصابة بنوبة قلبية.
- إذا كنت تعاني من مرض كبدي يسبب تغيرات في فحوص الدم، فإنه لا يوصى باستعمال دايبيجاتران تيفع.

يجب توخي عناية الحذر عند تناول دايبيجاتران تيفع:

- إذا كان الخوض جراحة.
- إذا هذه الحالة تستعطر إلى إيقاف استعمال دايبيجاتران تيفع بشكل مؤقت لحدود خطر تناول دموي متزايد خلال الجراحة. وبعدها، يجب فحص الدم من المهد جدًا لتناول دايبيجاتران تيفع قبل وبعد الجراحة، بالخصبي في الأوقات التي حددها لك الطبيب المعالج.
- إذا أصمنت الجراحة أبدأ لنزيف قسطرة (مطّرات) أو حقنًا داخل عموك القفري (مثلاً لغرض التخدير فوق الجافية أو الشوكي (النخاعي) أو لتسكين الألم).
- من المهد جدًا تناول دايبيجاتران تيفع قبل وبعد الجراحة، بالخصبي في الأوقات التي حددها لك الطبيب المعالج.
- أخبر طبيبك فورًا إذا كان لديك إحساس بالتمثيل أو الضعف في الرجلين، أو مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد انتهائها التخدير، لأنك قد تحتاج إلى علاج فوري.
- إذا وقعت أو أصبت خلال فترة العلاج، خاصة إذا أصبت في الراس، فتوجه رجاءً لتلقي العلاج الطبي المستعمل. يُتمثل أن تكون هناك حاجة لفحصك من قبل طبيب، لأنك قد تكون معرضًا لخطر متزايد لحدوث نزيف دموي.
- إذا كان معلوماً لك أنك تعاني من مرض يسمى متلازمة أضداد الفوسفوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي إلى تزايد في خطر تكوّن خثرات دموية)، فأخبر الطبيب بذلك ليقرّر ما إذا كانت هناك حاجة للمراقبون.

الأولاد والمراهقين

لا يوصى بهذا الدواء للأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عامًا.

التفاعلات بين الأدوية

أدوية تتسبب في **وصفة طبيه وإضافت غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك**. خاصة، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل الأدوية التالية (من الجدير بالذكر أن القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى المواد الفعّالة في الأدوية. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية، فاستشر رجاء الطبيب أو الصيدلي).

أدوية تقلل فرط التخثر في الدم (مثل: وارفارين، فيفدروكومون، سيكلوسبورين، أمبودارون، هيبيرين، كلوبيدغريل، تيكاغريلور، بروساجريل، ريفاروكسابان، حمض الأسيتيلساليسيليك).

أدوية تقلل التوترات الفطرية (مثل: كيتوكزانول، إيتراكوزانول)، إلا إذا أعطى لها ضمن نظر طبي.

أدوية لعلاج اضطرابات نظم القلب (مثل: أمبودارون، درونيدارون، كوينيدين، فيرياميل).

إذا كنت تستعمل أدوية تحتوي على أمبودارون، كوينيدين أو فيرياميل، فاستشر طبيبك فورًا إذا تناول جرعة أقل من دايبيجاتران تيفع. انظر بند 3 - "كيف تستعمل الدواء؟"

أدوية لمنع رفض العضو المزروع (مثل: تاكروليموس، سيكلوسبورين).

مستحضّر مرطب من نمج جليكيرايفير وبيبيرستيفير، وهو دواء مضاد للفطريات يعطى لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من النوع C (هيباتيتيس C).

- مسكنات الآلام وأدوية مضادة للالتهاب (مثل: حمض الأسيتيل ساليسيليك، إيبوبروفين، ديكلوفيناك).
- أدوية تحتوي على نبتة العرن (St. John's Wort) المستعملة لعلاج الاكتئاب.
- أدوية مضادة للاكتئب من فصيلة مثبّطات استرداد السيروتونين/ نورادرينالين الانتقائية (SSRI أو SNRI)
- مضادات حيوية من نوع كلاريثروميسين أو كلاريثروميسين
- أدوية لعلاج الإيدز (مثل: رانوفيترون).
- أدوية معينة لعلاج الصرع (مثل كاربامازيبين، فينيتوين)

استعمال الدواء والظلمع

يمكن تناول الدواء دون ارتباط بؤاقت وجبات الطعام. يجب بلع الكبسولة بكاملها مع كلس ماء من أجل ضمان وصولها إلى المعدة. لا يجوز كسر، مضغ أو إفراغ محتوى الكبسولة من أجل منع تزايد خطر حدوث نزيف دموي.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

تأثير دايبيجاتران تيفع على الحمل وعلى الجنين غير معلوم. لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حاملا، إلا إذا أوصاك الطبيب بذلك وقرّر أن ذلك آمن. إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فيجب الامتناع عن إحداث حمل خلال فترة العلاج بدايبيجاتران تيفع. لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بدايبيجاتران تيفع.

السيفالة واستعمال الماكثات

لا توجد لدايبيجاتران تيفع تأثيرات معلومة على السيفالة أو على استعمال الماكثات.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال هذا الدواء دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية بلع الدواء. الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. **يمنع تجاؤز الجرعة الموصى بها.**

الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:

لمنع تكوّن خثرات دموية بعد جراحات العظام لاستئبدال مفصل الركبة أو لاستئبدال مفصل الورك

(الجرعة الدوائية الموصى بها هي **220 ملغ مرة واحدة في اليوم** (كيسولات من 110 ملغ)).

إذا كنت تعاني من تدن في **الاد الوظيفي الكلوي** يصل إلى أكثر من نصف الإداء السليم، أو إذا كنت **تتبع أكثر من 75 عامًا من العمر**، فإن الجرعة الموصى بها من دايبيجاتران تيفع هي **150 ملغ مرة واحدة في اليوم.**

إذا كنت تستعمل **أدوية تحتوي على فيرياميل، وكنت تعاني أيضًا من تدن في الإداء الوظيفي الكلوي** يصل إلى أكثر من نصف الإداء السليم، فيناك حاجة إلى تقليل الجرعة إلى **75 ملغ** دايبيجاتران تيفع، لأن خطر حدوث نزيف دموي لديك قد يزداد.

بالنسبة للعمليات الجراحية من النوعين التاليين، لا يجوز البدء بالعلاج بدايبيجاتران تيفع إذا كان هناك نزيف دموي نشط من موضع العملية. إذا لم يكن بالإمكان البدء بالعلاج حتى اليوم التالي للعملية الجراحية، فيجب البدء بالعلاج بكيسولتين مرة واحدة في اليوم.

بعد جراحة استئبدال مفصل الركبة

يجب عليك البدء بالعلاج بدايبيجاتران تيفع خلال 4-1 ساعات بعد الجراحة، وذلك بتناول كبسولة واحدة. بعد ذلك، عليك تناول كيسولتين مرة واحدة في اليوم إلى أن تتوفّر فترة **10 أيام**.

بعد جراحة استئبدال مفصل الورك

يجب عليك البدء بالعلاج بدايبيجاتران تيفع خلال 4-1 ساعات بعد الجراحة، وذلك بتناول كبسولة واحدة. بعد ذلك، عليك تناول كيسولتين مرة واحدة في اليوم إلى أن تتوفّر فترة **28-35 يوما**.

لمنع استناد الأوعية الدموية في الدماغ (سكتة دماغية) أو في الجسم لدى المرضى الذين يعانون من دقات قلبية غير منتظمة ولعلاج الخثرات الدموية المتكوّنة في أوردة الرجلين في الـ **الرئتين** ولتعمع معاوتها

الجرعة اليومية الموصى بها هي **300 ملغ** (يجب تناول **كبسولة من 150 ملغ مرتين في اليوم**)

إذا كنت **تتبع من العمر 80 عامًا فما فوق**، فإن جرعة دايبيجاتران تيفع اليومية الموصى بها هي **220 ملغ** (يجب تناول **كبسولة من 110 ملغ مرتين في اليوم**).

إذا كنت تستعمل **أدوية تحتوي على فيرياميل**، فقد يقرّر الطبيب تقليل جرعة دايبيجاتران تيفع اليومية إلى **220 ملغ** في هذه الحالة يجب تناول **كبسولة من 110 ملغ مرتين في اليوم**، لأن خطر حدوث نزيف دموي لديك قد يزداد.

إذا كنت معرضًا ل**خطورة محتملة عالية لنشوء نزيف دموي**، فقد يقرّر الطبيب أن يصف لك جرعة يومية من **220 ملغ** في هذه الحالة يجب تناول **كبسولة من 110 ملغ مرتين في اليوم**، لأن خطر حدوث نزيف دموي لديك قد يزداد.

بإمكانك الاستمرار في تناول دايبيجاتران تيفع أثناء تنظيم نظم قلبك بواسطة إجراء طبي يسمى تقويم نظم القلب الكهربائي. يجب استعمال دايبيجاتران تيفع وفق تعليمات الطبيب.

إذا تم إدخال ملحق طبي (عدامة) إلى وعاء دموي لديك لإيقاظه متوخًا في إجراء طبي يسمى التدخل التاجي عن طريق الجلد، فيمكنك تلقي العلاج بدايبيجاتران تيفع بعد أن يقرّر الطبيب أنه قد تمت السيطرة على خطر حدوث نزيف دموي لديك قد يزداد.

إذا كنت معرضًا ل**خطورة محتملة عالية لنشوء نزيف دموي**، فقد يقرّر الطبيب أن يصف لك جرعة يومية من **220 ملغ** في هذه الحالة يجب تناول **كبسولة من 110 ملغ مرتين في اليوم**، لأن خطر حدوث نزيف دموي لديك قد يزداد.

بإمكانك الاستمرار في تناول دايبيجاتران تيفع أثناء تنظيم نظم قلبك بواسطة إجراء طبي يسمى تقويم نظم القلب الكهربائي. يجب استعمال دايبيجاتران تيفع وفق تعليمات الطبيب.

إذا تم إدخال ملحق طبي (عدامة) إلى وعاء دموي لديك لإيقاظه متوخًا في إجراء طبي يسمى التدخل التاجي عن طريق الجلد، فيمكنك تلقي العلاج بدايبيجاتران تيفع بعد أن يقرّر الطبيب أنه قد تمت السيطرة على خطر حدوث نزيف دموي لديك قد يزداد.

يجب بلع الكبسولة بكاملها مع كلس ماء دون ارتباط بوجبات الطعام. لا يجوز كسر، مضغ أو إفراغ محتوى الكبسولة من أجل منع تزايد خطر حدوث نزيف دموي.

تحذير العلاج بمضاد التخثر:

لا يجوز تغيير علاجك بمضاد التخثر دون أمر واضح من طبيبك المعالج.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من المأمور:

تناول جرعة مفرطة من دايبيجاتران تيفع قد يزيد من خطر حدوث نزيف دموي. إذا تناولت جرعة مفرطة، فيجب إعلام طبيبك بشكل فوري. تتوفّر خيارات علاجية خاصة لهذه الحالة.

إذا نسيت تناول الدواء:

لمنع تكوّن خثرات دموية بعد جراحة استئبدال مفصل الركبة أو الورك يجب تناول الجرعة القادمة من دايبيجاتران تيفع في يوم الغد في الساعة الاعتيادية.

لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة مفصبة.

لمنع استناد الأوعية الدموية في الدماغ (سكتة دماغية) أو في الجسم لدى المرضى الذين يعانون من دقات قلبية غير منتظمة غير منسوبة إلى مرض صمامي، لعلاج الخثرات الدموية المتكوّنة في أوردة الرجلين أو في **الرئتين** ولتعمع معاودة الخثرات الدموية في هذه الأوعية الدموية

يجب تناول الجرعة فور تذكرك، لكن فقط إذا تبيّقت 6 ساعات على الأقل حتى موعد الجرعة القادمة. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة مفصبة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

يجب تناول دايبيجاتران تيفع كما وصف الطبيب بالخصبي. لا يجوز التوقف عن تناول دايبيجاتران تيفع دون استشارة طبيبك، لأن خطر تطوّر خثرة دموية قد يكون عاليًا إذا توقفت عن العلاج أيرك من اللازم.

لا يجوز تناول الأدوية في العصاة راجع الملصق وتأكّد من **الجرعة التي كل مرة تتناول فيها دواء. ضاع القطرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.** إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال دايبيجاتران تيفع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. إذا لم تكن الأعراض الجانبية عابرة، أو إذا كانت مزعجة أو لا تقامقت، فيجب استشارة الطبيب. لا تلتق عن فرأة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب مراجعة الطبيب بشكل فوري في الحالات التالية:

يؤثر دايبيجاتران تيفع على مختل الدم، حيث إن معظم الأعراض الجانبية مرتبطة بعلامات مثل **الأورام الدموية** (تجمع الدم خارج الأوعية الدموية) أو **النزيف** الدموي. يمكن أن تظهر حالات نزيف دموي بليغة، وهي تشكّل الأعراض الجانبية الأكثر خطورة، ويعضن النظر عن موقع ظهور النزيف فهي قد تؤدي إلى إيقاع، قد تشكّل خطرًا على الحياة بل وتسبب الوفاة. في بعض الحالات يكون هذا النزيف الدموي غير متطابق للحميان.

إذا كنت تعاني من نزيف دموي لا يتوقف عن تلقاه نفسه، أو إذا شعرت بعلامات تدل على نزيف شديد (مثل: قيح عتدي، تعب، حمروب، دوام، صداع أو انتفاخ في مفرس، فقد استشارة الطبيب فورًا. من المحتمل أن يقرّر الطبيب إيقافك تحت المراقبة أو تغيير الدواء.

إذا نشأ لديك رد فعل تحسسي خطير يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو دوام.

قد تصنّفب الأعراض الجانبية المحتملة الواردة فيما يلي بحسب تواتر ظهورها:

عندما يستعمل الدواء لمنع تكوّن خثرات دموية بعد جراحة استئبدال مفصل الركبة أو الورك

أعراض جانبية شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

انخفاض في كمية الهيموجلوبين في الدم وطولف غير سليمة للكبد في الفحوص المخبرية

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1,000):

نزيف دموي من الأنف، في المعدة أو في الأمعاء، نزيف دموي من المهبل/القضيب، من المسالك البولية (بما في ذلك دم في البول يصعبه بالولن الوردي أو البني)، نزيف دموي من داخل المفصل، نزيف دموي جراء أصلية أو بعدها، أو نزيف دموي بعد الجراحة

تكوّن أورام دموية أو كدمات جلدية (علامات زرقاء على الجلد) بعد الجراحة

مدخني في البراز يتم الكشف عنه في فحص مخبري انخفاض في عدد أو في نسبة كريات الدم الحمراء

رد فعل تحسسي

تقيؤات، غثيان

تبرز متواتر أو براز سائل

جرح مع إفرازات (إفراز سائل من جرح العملية الجراحية)

ارتقاع في إزيمات الكبد

اصفرار الجلد أو بياض العينين، الناتج عن مشاكل في الكبد أو في الدم

أعراض جانبية نادرة (تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10,000):

نزيف دموي، نزيف دموي دماغي، نزيف دموي من شق جراحي، من موضع حقن أو من موقع إدخال أنبوب قسطرة للوردي

مفرز أو بلغم دموي

انخفاض في عدد صفائح الدم

انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء بعد الجراحة

رد فعل تحسسي خطير يسبب صعوبات في التنفس أو دوامًا

رد فعل تحسسي خطير يسبب انتفاخ الوجه أو الحلق

قطع جلدي مثير للحكة من نتوءات حمراء غامقة، تنجم عن رد فعل تحسسي

تغير فجائي في الجلد يؤثر على لونه وعلى مظهره

قرحة في المعدة أو في الأمعاء (بما في ذلك قرحة في المرءة)

التهاب المرءة والمعدة

ارتجاع (ارتداد) عصارات المعدة إلى المرءة

آلم في البطن أو المعدة، عسر الهضم، صعوبة في البلع

جرح مع إفرازات، جرح مع إفرازات عمليّة جراحية

أعراض جانبية مدى شئوعها غير معروف (أعراض لا يتم تحديدها مدى شئوعها بعد).

صعوبات في التنفس أو أزيز

انخفاض عدد أو حتى نقص كريات الدم البيضاء (التي تساهم في محاربة التلوثات)

صلع (الويديسا)

عندما يستعمل الدواء لمنع استناد الأوعية الدموية في الدماغ (سكتة دماغية) أو في الجسم لدى المرضى الذين يعانون من دقات قلبية غير منتظمة غير منسوبة إلى مرض صمامي

أعراض جانبية شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

نزيف دموي من الأنف، في المعدة أو في الأمعاء، نزيف دموي من المهبل/القضيب، من المسالك البولية (بما في ذلك دم في البول يصعبه بالولن الوردي أو البني)، نزيف دموي من البواسير، من فتحة الشرج، نزيف دموي تحت الجلد

انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء

آلم في البطن أو المعدة، عسر الهضم

تبرز متواتر أو براز سائل

غثيان

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):

نزيف دموي، نزيف دموي قد يحدث من البواسير

انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء

تكوّن أورام دموية

سعال دموي أو بلغم دموي

انخفاض في عدد صفائح الدم

انخفاض في كمية الهيموجلوبين في الدم

رد فعل تحسسي، كحة

تغير فجائي في الجلد يؤثر على لونه وعلى مظهره

قرحة في المعدة أو في الأمعاء (بما في ذلك قرحة في المرءة)

التهاب المرءة والمعدة

ارتجاع (ارتداد) عصارات المعدة إلى المرءة

غثيان، قيؤ، آلم في البطن أو المعدة

تبرز متواتر أو براز سائل

وطولف غير سليمة للكبد في الفحوص المخبرية

أعراض جانبية نادرة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):

نزيف دموي قد يحدث داخل المفصل، نزيف دموي من شق جراحي، من موضع حقن أو من موقع إدخال أنبوب قسطرة للوردي أو دوامًا

مفرز أو بلغم دموي

انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء

تكوّن أورام دموية

سعال دموي أو بلغم دموي

انخفاض في عدد صفائح الدم

انخفاض في نسبة كريات الدم الحمراء

أعراض جانبية مدى شئوعها غير معروف (أعراض لا يتم تحديدها مدى شئوعها بعد).

صعوبات في التنفس أو أزيز

انخفاض عدد أو حتى نقص كريات الدم البيضاء (التي تساهم في محاربة التلوثات)

صلع (الويديسا)

في تجربة سريرية، كانت نسبة النوبات القلبية لدى منقلى العلاج الذين يستعملون دايبيجاتران أعلى من نسبتها لدى الذين يتلقون العلاج الكورماين (وارفارين)، بينما كان العدد الكلي لأحداث القلبية

مختصًا. لم يتشاهد توافر تن في نسبة النوبات القلبية لدى المرضى الذين عرولوا بمادة الفعّالة دايبيجاتران إزاء المرضى الذين عرولوا بألف (الدواء الوهمي - بلاسيبو).

إذا ظهر ضرس على وجهك، إذا تلفقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكّر في هذه النشرة، فطليص استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

الإبمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عنب العلاج لدى" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة باللغة عن أعراض جانبية، أو عن طريق النسخ إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov>

5. يجب تحذير الدواء؟

</