

סטרפסילס® ללא סוכר תות סטרפסילס® ללא סוכר לימון

לכסנויות למציצה

החומרים הפעילים וריכוזם:

כל לכסנית מכילה:

1.2 מ"ג 2,4-דיכלורובנזיל אלכוהול

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2mg

0.6 מ"ג אמילמתקרוסול

Amylmetacresol 0.6mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6. ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.

התרופה מיועדת למבוגרים וילידים מעל גיל 6, מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

סטרפסילס ללא סוכר תות/לימון משמש להקלה על כאבי גרון אצל מבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים.

קבוצה תרפויטית:

אנטיספטי.

התכשיר מכיל שני חומרים פעילים בעלי פעולה אנטיספטית, חומרים אלו משמשים להקלה בתסמינים של זיהומי הפה והגרון הקוטלים חיידקים המעורבים בזיהומי הפה והגרון. מציצת הלכסנית מאפשרת לחומרים הפעילים לפעול באזור הכואב וכן לסכך ולהרגיע אותו. דבר זה מסייע להקלת הכאב ואי הנוחות בזיהומי פה וגרון.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם

- | |
|--|
| - אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. (ראה רשימה מלאה של המרכיבים הבלתי פעילים בסעיף 6). |
|--|

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בסטרפסילס ללא סוכר תות/לימון, ספר לרופא אם

- אתה סובל מבעיות אחרות בגרון

יש להיוועץ מיידית עם הרופא אם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

ילדים ומתבגרים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

יש להיוועץ ברופא טרם השימוש בתכשיר זה אם את חושבת שאת בהריון, את בהריון או מניקה.
יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- התרופה מכילה איזומלטיטול ומלטיטול - אשר עשויה להיות להם השפעה משלשלת קלה. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך חוסר סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתכשיר זה. הערך הקלורי הינו 2.3 קילוקלוריות / גרם.
- התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן במנה – הנחשב כ-'ללא נתרן'.
סטרפסילס ללא סוכר תות מכיל בנוסף:
- פרופילן גליקול (7.30 מ"ג בלכסנית) (מצוי במרכיב טעם תות)
- בנזיל אלכוהול (מצוי במרכיב טעם תות) אשר עלול לגרום לתגובות אלרגיה.
- **סטרפסילס ללא סוכר לימון** מכיל בנוסף:
- בנזיל אלכוהול, ציטראל, ציטרונל, די-לימון, גרניול ולינלול (מצויים במרכיב טעם לימון) העלולים לגרום לתגובות אלרגיה.

אין להשתמש בתכשיר אם יש לך חוסר סבילות לפרוקטוז.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
יש להוציא לכסנית אחת מהבסליסטר (אריזת האלומיניום), למקמה בתוך הפה ולאפשר לה להתמוסס באיטיות. יש להכניס את הבליסטר חזרה לקרטון האריזה.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים: לכסניה אחת למציצה כל 2-3 שעות. אין להשתמש ביותר מ-12 לכסניות ביממה (24 שעות).
אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל שש שנים. יש לזכור כי ילדים קטנים עלולים להיחנק מהלכסנית.

משך הטיפול

לשימוש קצר טווח בלבד.
יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר ולזמן הקצר ביותר על מנת להקל על התסמינים.
עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.
אופן השימוש: יש למצוץ הלכסנית לאט, על מנת שתתמוסס לאט בפה. אין ללעוס או לשבור את הלכסניה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עשוי לחוש אי נוחות בבטן. אל תמשיך להשתמש בתכשיר והיוועץ ברופא או ברוקח. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפסילס ללא סוכר תות/לימון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם - מופיעה רגישות-יתר כגון: גרד, תחושת צריבה ו/או אי נוחות בפה, קשיי נשימה, נפיחות של הפנים, צוואר, לשון או הגרון, פריחה (תגובות אלרגיות חריפות).
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח של תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור :

<http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ (25°C)
- אין להשליך תרופות לשירותים או לאשפה הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בהן צורך, על מנת להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

סטרפסילס ללא סוכר תות:

Isomalt, Maltitol Liquid, Tartaric Acid, Flav P strawberry Flavor 052312B, Sodium Saccharin, Pink Antho P-WS (E163)

סטרפסילס ללא סוכר לימון:

Isomalt, Maltitol liquid, Tartaric Acid, Flav P Lemon Flavour 74940-74, Sodium Saccharin.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

סטרפסילס ללא סוכר תות - לכסנית עגולה בצבע ורוד, עם סמל המותג מוטבע על שני הצדדים.

סטרפסילס ללא סוכר לימון: לכסנית עגולה בצבע לבן עד צהבהב, עם סמל המותג מוטבע על שני הצדדים.

גודל האריזה: התרופה מסופקת באריזת קרטון המכילה בליסטר עם 16 או 24 לכסניות למציצה. ייתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.

שם בעל הרישום וכתובתו: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, רח' הנגר 6, הוד השרון 4527704. דוא"ל: ConsumerHealth_IL@reckitt.com

שם היצרן וכתובתו: רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם, אנגליה.

נערך בפברואר 2023.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

סטרפסילס ללא סוכר תות: 112-45-29476-00

סטרפסילס ללא סוכר לימון: 052-52-24917-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
