

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة

مستحضرات - 1986

سوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

روپافین محلول للشرب 1 ملء / مل

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل ملء محلول على:

روپاتادين 1 ملء (كـ فومارات)

[Rupatadine 1 mg (as fumarate)]

• المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 6 في النشرة. أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسطلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك / حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

يستعمل روپافین محلول للشرب 1 ملء / مل لعلاج أمراض: • إنفلونزا الأنف التحسسي (بما في ذلك إنفلونزا الأنف التحسسي المطول) لدى أطفال بأعمار 2-11 سنة.

• شرى (Urticaria) لدى أطفال بأعمار 1-11 سنة.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الهيستامين من الجيل الثاني.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• وجدت لديك أو لدى طفلك حساسية (الergic) للمادة الفعالة (روپاتادين) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 في النشرة).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بالدواء إحدى الطيب إذا:

• كنت تعاني أنت أو طفلك من قصور كلوى أو كبد، إستشر الطبيب. لا يوصي في الوقت الحاضر بإستعمال روپافين لدى متعالجين يعانون من خلل في وظائف الكلى أو الكبد.

• كنت تعاني أنت أو طفلك من نسب منخفضة من البوتاسيوم في الدم أو من نمط شاذ لضربات القلب (مثل إطالة مقطع QTc في التخطيط الکهربائي للقلب، اضطرابات في نظم القلب مثل نظم بطئ القلب، إيقاف حاد لاضلعة القلب) الأمر الذي من شأنه أن يظهر في أمراض قلبية معينة، إستشر الطبيب.

الأطفال والمهاترون:

هذا الدواء غير مخصوص لأطفال دون عمر السنتين، أو لأطفال وزنه أقل من 10 كلغ.

التدخلات / التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أنت أو طفلك، أو إذا تناولتما مؤخر، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى الطيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت أنت أو طفلك تتناولون:

• أدوية تحتوي على إيتراکونازول، كيتوكونازول، فوريكونازول، يوساكونازول، فلوكونازول (أدوية لعلاج التلوريات الفطرية)، كلاريترومبisin، إبريترومبisin (أدوية لعلاج التلوريات الجرثومية)؛ مثبطات بروتياز لـ HIV، نيفازودون (دواء لعلاج الإكتاب)، ديليتازيم (دواء لعلاج إرتفاع ضغط الدم

والذبحة الصدرية) - لا يجوز تناول هذه الأدوية خلال فترة العلاج بـ روپافين.

- سيكلوسپورين، تاکرولیموس، سیروبلیموس، ایچیروبلیموس، (أدوية من مجموعة مثبطات الجهاز المناعي)، سیسپرید؛
- أدوية مثبطة للجهاز العصبي المركزي، أدوية من فصيلة الاستانتانات مثل سیسپاستانين (دواء لعلاج إرتفاع الكوليسترول في الدم) أو میدازولام (دواء يستعمل للترين لفترة قصيرة)؛

إستشر الطبيب قبل تناول روپافين.

إستعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.
لا يجوز تناول روپافين بمشاركة عصير الچرب فروت لأن ذلك من شأنه أن يرفع نسبة الدواء في الجسم.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

روپافين بالمقادير الدوائية 10 ملء لا يزيد من الشعور بالنعاس الناجم عن الكحول.

الحمل، الإرضاخ والخصوبة:

لا يجوز إستعمال الدواء خلال فترة الحمل والإرضاخ، إلا إذا توفرت تعليمات صريحة من الطبيب.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

السيادة واستعمال الماكولات:

لم يكن هناك تأثير لـ روپافين بمقادير دوائية قدره 10 ملء على القدرة على السيادة أو استعمال الماكولات في التجربة السريرية التي تمإجراؤها. مع ذلك، يجب توخي الحذر قبل السيادة أو استعمال الماكولات، حتى يتم تحديد إستجابتك الشخصية لـ روپافين.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

• يحتوي هذا الدواء على سكرور، وبالتالي قد يلحق الضرر بالأسنان. إذا شخص لديك أولى لدى طفلك عدم لسكرات معينة، فعليك إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

• يحتوي هذا الدواء على ميتيبل پاراهيدروکسی بنزووات، الذي قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي (من الجائز حدوث رد فعل تحسسي متاخر).

• كل ملء من هذا الدواء يحتوي على 200 ملء بروپيلين چلیکول.

إذا كان طفلك دون 5 سنوات، إستشر الطبيب أو الصيدلي قبل أن تعطيه الدواء، خاصة إذا كان يتناول أدوية أخرى تحتوي على بروپيلين چلیکول أو كحول.

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاخة فلا تستعمل الدواء إلا إذا أوصاك الطبيب بذلك. يامكان الطبيب إجراء فحوص إضافية خلال فترة تناولك الدواء.

إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من مرض كاوي أو كبدي، فلا يجوز تناول هذا الدواء إلا بموجب توصية من الطبيب. من شأن طبيب أن يجري فحوص إضافية خلال فترة العلاج.

• يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملء) لكل 1 مل، وهو فعلياً "خال من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقادير الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي لدى أطفال وزنهم 25 كلغ أو أكثر: 5 مل (5 مل روپاتادين) روپافين محلول للشرب مرة في اليوم، مع أو بدون طعام.

المقدار الدوائي لدى أطفال وزنهم 10 كلغ أو أكثر وأقل من 25 كلغ: 2.5 مل (2.5 مل روپاتادين) روپافين محلول للشرب مرة في اليوم، مع أو بدون طعام.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج - وفقاً لتعليمات الطبيب.

طريقةتناول: محلول لللبل.

تعليمات الاستعمال:

- لفتح القنينة إضغط على الغطاء وقم بتدويره عكس إتجاه عقارب الساعة.

- خذ المحقنة، أخلها إلى السادة المثقوبة ومن ثم إقلب القنينة بحيث تكون فوتها نحو الأسفل.

- إملأ المحقنة بالمقدار الدوائي وفقاً لتعليمات الطبيب.

- يجب تناول الدواء مباشرة من محقنة المقدار الدوائي.

- إغسل المحقنة بعد الإستعمال.

إذا تناولت أنت أو طفلك بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فليبيك التوجة مباشرة للطبيب أو للصيدلي.

إذا تناولت أنت أو طفلك مقداراً دوائياً مفرطاً، توجه مباشرة إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علية الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف، تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وأشتهر الطبيب.

يجب الموازنة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، إشتهر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال روپا芬ين قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهبش من قائمة الأعراض الجانبية.

من الحالات لا تعاني أي منها.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص): صداع وميل للنوم.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص): احتقان، التهاب الأنف والبلعوم، إلتهاب الطرق التنفسية العلوية، كثرة الحمضات، قلة العدلات، دوار، غثيان، إكزيما، تعرق ليلي وإدراك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>
بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة كامادا م.ض. بواسطة البريد الإلكتروني:

pharmacovigilance@kamada.com

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال / أو الرضع وذلك لتفادي إصاياتهم بالتسنم. لا تسبب التقيؤ بدون تعلميات صريحه من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة والقنينة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.