

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (المستحضرات) لعام 1986
يسوق هذا الدواء تبعاً لوصفة طبيب فقط

فنتا 12، فنتا 25، فنتا 50، فنتا 75، فنتا 100

لاصقات جديّة

المادّة الفعّالة:

تحتوي كلّ لاصقة فنتا 12 على 2.063 ملغ من فنتانيل (Fentanyl) وتحرّر 12.5 مكغ في الساعة.
تحتوي كلّ لاصقة فنتا 25 على 4.125 ملغ من فنتانيل (Fentanyl) وتحرّر 25 مكغ في الساعة.
تحتوي كلّ لاصقة فنتا 50 على 8.25 ملغ من فنتانيل (Fentanyl) وتحرّر 50 مكغ في الساعة.
تحتوي كلّ لاصقة فنتا 75 على 12.375 ملغ من فنتانيل (Fentanyl) وتحرّر 75 مكغ في الساعة.
تحتوي كلّ لاصقة فنتا 100 على 16.5 ملغ من فنتانيل (Fentanyl) وتحرّر 100 مكغ في الساعة.
لقراءة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6.

- تحتوي اللاصقات على مسكن قويّ للألام (مادّة أفيونيّة).
- يجب التحقّق من إزالة اللاصقة القديمة قبل وضع لاصقة جديدة.
- ممنوع قطع اللاصقات.
- ممنوع تعريض اللاصقات لمصدر حرارة (مثل قربة الماء الساخن).
- إذا نشأت لديك الحمى فيجب إخبار الطبيب بذلك حالاً.
- يجب الحرص على اتّباع إرشادات الاستخدام والتجريح واستبدال اللاصقة كلّ 3 أيّام (72 ساعة).
- إذا نشأ لديك التنفّس السطحيّ والضعيف فيجب إزالة اللاصقة ومراجعة جهة طبّيّة حالاً للحصول على المساعدة.

اقرأ النشرة بامعان حتّى نهايتها قبل استخدامك للدواء.

تتضمّن هذه النشرة معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا خطرت ببالك أسئلة أخرى، فراجع الطبيب أو الصيدليّ.
لقد وُصف هذا الدواء لعلاج حالتك. لا تعطه للآخرين. ذلك لأنّه قد يؤذيهم حتّى إذا بدا لك أنّ حالتهم الطبّيّة مشابهة.

من شأن الأدوية من فصيلة الأفيونيّات أن تسبّب الإدمان تحديداً عند استخدامها لفترة طويلة، كما أنّها قد تؤديّ إلى إساءة الاستخدام والتجريح المفرط. وقد يتجلّى ردّ الفعل على التجريح المفرط بتباطؤ التنفّس ويمكنه أن يكون فتاكاً.
تحقّق من معرفتك لاسم الدواء وكن على علم بالجرعة التي تتناولها ووتيرة تناولها وفترة العلاج والأعراض الجانيّة والمخاطر الكامنة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن خطر الاعتماد والإدمان في الرابط التالي:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf

إنّ تناول هذا الدواء بالتزامن مع الأدوية من فصيلة البنيزوديازيبينات أو أدوية أخرى تثبّط الجهاز العصبيّ المركزيّ (بما في ذلك المخدّرات) أو الكحول قد يسبّب الشعور بالميل الشديد إلى النوم، وصعوبات التنفّس (التثبّط التنفّسيّ) والغيبوبة والوفاة.

1. لأيّ غرض خصّص هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصّص لتسكين الألام المزمنة الشديدة التي تستلزم استخدام الأفيونات.

فنتا مخصّص للمرضى الذين يستخدمون العلاج بالأفيونات بالفعل.

الفصيلة العلاجيّة: مسكّنات الألام الأفيونيّة.

2. قبل استخدام هذا الدواء

يُمنع استخدام هذا الدواء إذا:

- كنت حساساً (متحسساً) للمادّة الفعّالة (فنتانيل) أو لأيّ واحد من المركبات الأخرى التي تحتوي عليها اللاصقات (لمعاينة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6).
 - كنت تعاني من الألام التي تدوم لفترة قصيرة فقط (الألام الحادّة) مثل الألام المفاجئة أو الألام في أعقاب عمليّة جراحية.
 - كنت تعاني من صعوبات التنفّس، بما فيها التنفّس البطيء أو السطحيّ (التثبّط التنفّسيّ).
 - إذا كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبّطات إنزيم الأوكسيدياز الأحاديّ الأمين (MAOIs) (على سبيل المثال، لعلاج الاكتئاب) أو إذا تناولت دواءً من هذا النوع خلال الأسبوعين الأخيرين. انظر أيضاً "التفاعلات الدوائيّة" لاحقاً في هذه النشرة.
 - يُمنع استخدام هذا الدواء إذا كنتِ مرضعاً - انظري "الحمل والإرضاع" لاحقاً في هذه النشرة.
 - يُمنع الاستخدام لعلاج الأطفال دون عمر سنتين - انظر "الاستخدام لدى الأطفال" لاحقاً في هذه النشرة.
- في حال كنت غير متأكّد ممّا إذا كانت هذه الحالات تنطبق عليك، استشر الطبيب.

التحذيرات الخاصة المتعلقة باستخدام الدواء:

- قد تسبب لاصقات فنتا أعراضًا جانبيةً مهددةً للحياة لدى الأشخاص الذين لا يستخدمون بالفعل الأدوية الأفيونية الموصوفة لهم بانتظام.
- قد تشكل لاصقات فنتا، بما في ذلك اللاصقات التي قد تم استخدامها بالفعل، خطرًا على حياة الأطفال. يجب أن تعرف أن اللاصقة (سواء كانت جديدةً أو مستخدمةً) قد تجذب الأطفال وفي حال التصقت لاصقةً ما (جديدة أو مستخدمة) بجلد الطفل أو إذا وضعها الطفل في فمه، فإن النتيجة قد تكون قاتلةً.
- حتى اللاصقة التي قد تم استخدامها بالفعل، من شأنها أن تحتوي على كميةٍ ما من الدواء بحيث يمكنها أن تؤذي الأطفال، بل أن تشكل خطرًا على حياتهم.
- يجب الاحتفاظ بالدواء في مكان آمن ومؤمن لا يستطيع الآخرون الوصول إليه - للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البند 5.

التصاق لاصقة بشخص آخر:

يجب أن تُستخدم اللاصقة فقط على جلد متلقّي العلاج الذي تم وصفها لأجله. قد تمّ الإبلاغ عن لاصقات التصقت بالخطأ بشخص آخر (أحد أفراد العائلة، مثلاً) بسبب التماسّ المباشر، أو بسبب مشاركة السرير مع متلقّي علاج كان يحمل لاصقةً على جسمه. من شأن اللاصقة التي التصقت بشخص آخر بالخطأ (خصوصًا بجسم طفل) أن تؤذي إلى أعراض جانبية خطيرة (من جزاء امتصاص المادة الفعالة في الجسم) مثل صعوبات التنفّس المصحوبة بالتنفّس البطيء والسطحي، الحالة التي قد تكون قاتلةً. وفي حال التصقت لاصقةً بجسم شخص آخر، ينبغي إزالتها ومراجعة جهة طبيّة للحصول على علاج.

قبل العلاج بفنتا (وخلاله) أخبر الطبيب بالحالات التالية إذا كانت تنطبق عليك. قد يتابع الطبيب حالتك في أحيان أكثر تقاربًا:

- كنت تعاني أو قد عانيت سابقًا من مشاكل في الرئتين أو مشاكل التنفّس.
 - كنت تعاني أو قد عانيت سابقًا من مشاكل في القلب، الكبد، الكليتين أو انخفاض ضغط الدم أو نقص حجم الدم.
 - كان لديك سابقًا ورم في الدماغ.
 - عانيت سابقًا من الصداع المتواصل أو تعرّضت للإصابة في الرأس.
 - كنت تعاني من الضغط المتزايد داخل الجمجمة، الغيبوبة أو ضبابية الوعي.
 - كنت مسنًا، نحيفًا أو مرهقًا لأنّ ذلك قد يزيد من حساسيتك لتأثيرات الدواء.
 - كنت تعاني من الوهن العضليّ الوبيل (حالة تصبح العضلات فيها ضعيفةً بحيث تتعب بسهولة).
 - كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك تعانون من إساءة استخدام الكحول أو إدمان الكحول أو الأدوية المصروفة بوصفة طبيب أو المخدرات ("الإدمان").
 - كنت مدخنًا.
 - كنت تعاني أو قد عانيت سابقًا في مشاكل في مزاجك (الاكتئاب، القلق، اضطرابات الشخصية) أو عانيت سابقًا من مشاكل نفسية أخرى استلزمت العلاج من قبل طبيب نفسي.
 - كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل انسداد الأمعاء، الإمساك المزمن).
- في حال كنت غير متأكد مما إذا كانت هذه الحالات تنطبق عليك، استشر الطبيب.

خلال العلاج بلاصقات فنتا، يجب إخبار الطبيب إذا نشأت لديك مشاكل التنفّس خلال النوم. من شأن الأفيونات مثل فنتا أن تسبب مشاكل التنفّس خلال النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم (sleep apnea) ونقص تأكسج الدم (انخفاض مستوى الأكسجين في الدم) المتعلّق بالنوم. يجب إخبار الطبيب في حال لاحظت أنت أو إذا لاحظ شخص ما حولك الأعراض التالية: توقّف التنفّس خلال النوم، والاستيقاظ نتيجة لضيق التنفّس، الصعوبة في البقاء نائمًا أو الميل المتزايد إلى النوم خلال ساعات النهار. في هذه الحالة قد يوصي الطبيب بتغيير الجرعة الدوائية.

خلال العلاج بلاصقات فنتا، يجب إخبار الطبيب إذا طرأ تغيير ما على الألام لديك، على سبيل المثال: عدم تسكين الألام، زيادة الألام، تغيير الشعور بالألم (ألم في جزء آخر من جسمك) أو إذا شعرت بالألم بسبب التماسّ (الذي لا يتوقّع أن يكون مؤلمًا) لا تغيير الجرعة بنفسك. قد يغيّر الطبيب الجرعة أو العلاج.

الأعراض الجانبية لفنتا التي تستلزم الانتباه الخاص

- قد يؤدي استخدام فنتا إلى الميل غير الاعتياديّ إلى النوم ومشاكل التنفّس مثل التنفّس الأكثر بطنًا وسطحيًا. في أحيان نادرة جدًّا، قد تكون مشاكل التنفّس هذه مهددةً للحياة، بل من شأنها أن تؤذي إلى الوفاة، تحديدًا لدى الأشخاص الذين لم يستخدموا مسكّنات الألام الأفيونية القويّة سابقًا (مثلًا، فنتانيل أو مورفين). في حال أصبح متلقّي العلاج بلاصقة فنتا يميل إلى النوم بشكل غير اعتياديّ ويتنفّس بشكل بطيء وسطحي (أو إذا لاحظ ذلك أحد الأشخاص حوله)، يجب القيام بما يلي:
 - يجب إزالة اللاصقة.
 - يجب مراجعة الطبيب أو الحضور إلى المستشفى للحصول على المساعدة الطبيّة الفوريّة.
 - يجب التحقّق من استمرار الشخص في التحرك والتكلم قدر الإمكان.قد تستمرّ هذه الأعراض وقتًا ما بعد إزالة اللاصقة أيضًا.
 - إذا نشأت لديك حمى أثناء استخدامك لفنتا، فأخبر الطبيب بذلك حالًا. قد تؤذي هذه الحالة إلى امتصاص كمّيّات أكبر من المادة الفعالة عبر الجلد في جسمك، الأمر الذي قد يؤدي إلى الجرعة الزائدة المهددة للحياة. قد يلائم الطبيب الجرعة الدوائية إذا دعت الحاجة.
 - من شأن الدواء أن يؤدي إلى الإمساك. يجب استفسار الطبيب أو الصيدليّ عن كميّة الوقاية من الإمساك أو تخفيف الإمساك.
 - قد يؤدي استخدام اللاصقات على مدار فترة طويلة إلى انخفاض مفعول الدواء بالنسبة لك (قد تحدث هذه الحالة إما نتيجة تكيف الجسم مع الدواء أم لنشوء الحساسية المفرطة للألم)، أو قد ينشأ لديك الاعتماد على الدواء. لا تغيّر الجرعة بنفسك. من شأن زيادة الجرعة أن تخفّف الألم لفترة ما، إلا أنّ هذا الأمر قد يكون مؤذيًا. إذا شعرت بأنّ الدواء يصبح أقلّ فعاليّة، فراجع الطبيب. سيقرّر الطبيب ما إذا كان من الأفضل زيادة الجرعة أو الحدّ من استخدام اللاصقات تدريجيًا. علاوةً على ذلك، إذا كانت لديك مخاوف بسبب نشوء الاعتماد لديك على هذا الدواء فراجع الطبيب.
- انظر البند 4 لمعينة قائمة كاملة بالأعراض الجانبية.

تحذيرات إضافية:

- تحتوي لاصقات فنتا على فنتانيل، وهو مركّب أفيوني، فلذا تُحتمل إساءة استخدامها.
- أثناء فترة الاستخدام، لا يجوز تعريض اللاصقة لمصدر الحرارة المباشر مثل وسائد التدفئة الكهربائيّة، بطانيّات التدفئة الكهربائيّة، قربات الماء الساخن، أسرة الماء المسخن، ومصابيح الحرارة أو التسمير. لا يجوز القيام بما يسمّى الحمام الشمسيّ، البقاء في حوض الاستحمام في الماء الساخن لمدة طويلة، أو البقاء في الساونا أو الجاكوزي. قد تؤذي هذه الحالات إلى تحرير كمّيّات أكبر ممّا يجب من المادة الفعالة وامتصاصها في الجسم.
- يجب استفسار الطبيب عن إمكانيّة ممارسة النشاط البدنيّ خلال فترة استخدام اللاصقة.

- لا يجوز وضع ضمادة مرنة أو ضيقة على موضع اللاصقة.

أعراض الانسحاب عند التوقف عن العلاج باللاصقات: لا يجوز التوقف عن استخدام اللاصقات بشكل فجائي لاحتقال نشوء أعراض الانسحاب، على سبيل المثال: التملل، صعوبات النوم، العصبية، عدم الهدوء، الفلق، الشعور بدقات القلب (الخفقان)، زيادة ضغط الدم، الغثيان، التقيؤ، الإسهال، نقص الشهية، الارتعاش، القشعريرة، والتعرق. إذا أردت التوقف عن استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أولاً ليرشدك إلى طريقة القيام بذلك. يوصي الطبيب عادةً بخفض الجرعة تدريجياً لتقليل أعراض الانسحاب قدر الإمكان. انظر أيضاً "إذا توقفت عن استخدام الدواء" في البند 3.

- يجب الحرص على استخدام لاصقات فنتا والتخلص منها بشكل صحيح (انظر البند 5).
- إذا قام طفل أو شخص ما ببلع اللاصقة خطأً، فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.
- يجب فحص موضع اللاصقة من حين إلى آخر (بصرياً أو باللمس) للتحقق من التصاقها جيداً ومن أنها ليست ضعيفة الالتصاق أو أنها لم تسقط. في حالة عدم التصاق اللاصقة بشكل لائق يجب إصاقها بالجلد بواسطة شريط لاصق (من حول اللاصقة). لا يجوز إزالة اللاصقة ومحاولة إصاقها في موضع مختلف!

الاستخدام لدى الأطفال:

- هذا الدواء غير مخصص بالعادة للأطفال الرضع والأطفال إلا إذا أمر الطبيب المتخصص باستخدامه، ولا يجوز استخدامه دون عمر سنتين.
- يجب مراقبة الطفل تحديداً خلال أول 48 ساعة بعد وضع اللاصقة الأولى وكذلك بعد كل زيادة للجرعة.

التفاعلات الدوائية:

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية المصرفة بدون وصفة طبيب والإضافات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. علاوة على ذلك، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي باستخدامك لفنتا عند شراء أي دواء آخر. سيعرف الطبيب ما هي الأدوية الآمنة عند استخدامها بالتزامن مع فنتا. قد تدعو الحاجة إلى متابعة طبيّة عن كثب عند دمج فنتا مع أدوية أخرى أو عند التوقف عن تناولها لأنها قد تؤثر في مفعول اللاصقة التي سيصفها الطبيب لك. ويجب على وجه التحديد إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية (ويجدر الذكر أنّ القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى الموادّ الفعالة في الأدوية. وفي حال كنت غير متأكد مما إذا كنت تستخدم أحد هذه الأدوية فالرجاء استشارة الطبيب أو الصيدلي):

- مسكّنات أخرى للألام، مثل مسكّنات الألام الأفيونية الأخرى (بما فيها بوبرينورفين، نالبوفين أو بنتازوسين) ومسكّنات معيّنة للألام العصبية (غابابنتين وبريجابالين).

- الأدوية المنومة (مثل تيمازيبام، زولبيلون، زولبيديم، بروتيزولام).
- الأدوية المهدئة (مثل ألبرازولام، كلونازيبام، ديازيبام، هيدروكسيزين، لورازيبام) والأدوية لعلاج المشاكل النفسية (مضادات الذهان مثل أريبيريازول، هالوبيريديول، أولانزابين، ريسبيريدون أو الفينوثيازينات).
- مرخيات العضلات (مثل سيكلوبيزابرين، ديازيبام).
- موادّ التخدير وأدوية التخدير العامّ.
- أدوية معيّنة لعلاج الاكتئاب من فصيلة SSRIs أو SNRIs (مثل سيتالوبرام، دولوكسيتين، إيسيتالوبرام، فلوكسيتين، فلوفاكسامين، باروكسيتين، سيرترالين، فينلافكسين)، نيفازودون. انظر أدناه "فنتا ومضادات الاكتئاب".
- الأدوية من فصيلة مثبّطات إنزيم الأوكسிடاز الأحادي الأمين (MAOIs) المستخدمة مثلاً لعلاج الاكتئاب أو مرض باركنسون (مثل إيزوكاربوكسازيد، فينيلزين، سيليجيلين، ترانيلسيبرومين). ممنوع استخدام فنتا إذا كنت تتناول أو قد تناولت الأدوية من فصيلة MAOIs خلال الأسبوعين الأخيرين. انظر أدناه "فنتا ومضادات الاكتئاب".
- بعض مضادات الهيستامين، تحديداً تلك المسببة للميل إلى النوم (مثل كلورفينامين، كليماستين، سيبروهيبتادين، دي فين هيدرامين، هيدروكسيزين).
- بعض المضادات الحيوية لعلاج التلوثات (مثلاً إيريتروميسين، كلاريثروميسين).
- الأدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل إيتراكونازول، كيتوكونازول، فلوكونازول، فوريكونازول).
- الأدوية لعلاج العدوى بـ HIV/إيدز (مثل ريتونافير).
- الأدوية لعلاج عدم انتظام سرعة القلب (مثل أمبودارون، ديلتيازيم، فيراباميل).
- الأدوية لعلاج السلّ (مثل ريفامبيسين).
- بعض الأدوية لعلاج الصرع (مثل كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيتوين).
- بعض الأدوية لعلاج الغثيان أو داء السفر (مثلاً الفينوثيازينات).
- بعض الأدوية لعلاج حرقة الفؤاد أو التقرّحات (مثل سيميدين).
- بعض الأدوية لعلاج الذبحة الصدرية (خناق الصدر) أو ارتفاع ضغط الدم (مثل نيكراديبين).
- بعض الأدوية لعلاج سرطان الدم (مثل إيديلاليسيب).

فنتا ومضادات الاكتئاب:

إنّ خطر نشوء الأعراض الجانبية يزداد إذا كنت تتلقّى بعض مضادات الاكتئاب (من فصيلة SNRIs، أو SSRIs أو MAOIs) أو الأدوية السيروتونية الأخرى. من شأن هذه الأدوية أن تتفاعل مع فنتا وأن تجعلك تشعر بأعراض مثل تغيّر الحالة النفسية مثلاً التملل، رؤية، إحساس، سماع أو شمّ أشياء غير موجودة (الهوس)، الغيبوبة؛ تغيّرات في ضغط الدم، تسارع دقات القلب (دقات القلب السريعة)، الحمى المرتفعة، زيادة المنعكسات، نقص التناسق الحركي، صلابة العضلات؛ أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان، التقيؤ، الإسهال. قد تدلّ هذه الأعراض على نشوء متلازمة السيروتونين، التي قد تكون مهددة للحياة. وفي حالة تناول هذه الأدوية بشكل متزامن رغم ذلك، قد يقوم الطبيب بمتابعة هذه الأعراض الجانبية عن كثب وتحديداً عند بداية العلاج أو عند تغيير الجرعة. إذا شعرت بهذه الأعراض الجانبية فيجب أن تراجع الطبيب.

الاستخدام بالتزامن مع مثبّطات الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الكحول وبعض الأدوية الأفيونية/الناكوتيات

إنّ استخدام فننا بالتزامن مع الأدوية المهدنة (ذات التأثير المرکن، المهدئ أو المنوم)، مثل البيبنزوديازيبينات أو الأدوية المشابهة له، يزيد من خطر نشوء الميل إلى النوم (بما في ذلك الميل إلى النوم العميق)، نقص ضغط الدم، صعوبات التنفس (التثبيط التنفسي) والغيوبية، بل قد يكون مهددًا للحياة وقاتلاً. لذا، يجب التفكير في الاستخدام المتزامن فقط إذا لم تكن هناك خيارات علاجية متاحة أخرى. إذا قرّر طبيبك أن يصف لك فننا بالتزامن مع الأدوية المرکنة، فمن المحتمل أن يحدّ الطبيب من الجرعة ومدة العلاج المدمج. يجب إخبار الطبيب بجميع الأدوية المهدنة التي تتناولها والحرص على الامتثال لتوصياته فيما يتعلّق بالجرعة الدوائية.

ويستحسن طلب الأصدقاء والأقارب بالانتباه إلى الأعراض السابق ذكرها. يجب مراجعة الطبيب إذا شعرت بهذه الأعراض.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول:

يُمنع شرب الكحول خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

العمليات الجراحية:

إذا كان من المخطّط له خضوعك لإجراء جراحيّ منوط بالحصول على موادّ التخدير، فيتوجّب إخبار الطبيب/طبيب الأسنان باستخدامك لفننا سلفًا.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملًا، تظنّين أنّك حامل، تخططين للحمل، أو ترضعين طفلاً، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء.

- ممنوع استخدام اللاصقات خلال فترة الحمل إلا إذا أمر الطبيب بذلك بشكل صريح.
- ممنوع استخدام اللاصقات خلال الولادة. ذلك لأنّ الدواء قد يؤثر في تنفس المولود.
- قد يسبّب استخدام لاصقات فننا على مدار فترة طويلة خلال الحمل أعراض الانسحاب لدى المولود، الحالة التي قد تهدّد حياة الطفل في حال لم يتمّ التعرف عليها وعلاجها مبكرًا. قد تشمل الأعراض الآتي: البكاء الصاخب، التململ، الاختلاجات/التشنجات، صعوبات الإطعام، الإسهال. يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا نشأت هذه الأعراض لدى الطفل الرضيع.
- ممنوع الإرضاع إذا كنت تستخدمين لاصقات فننا، ذلك لأنّ الدواء ينتقل إلى حليب الأمّ ومن شأنه أن يسبّب التركين/النعاس العميق والتثبيط التنفسيّ لدى الطفل الرضيع. ممنوع الإرضاع 3 أيام (72 ساعة) على الأقلّ بعد إزالة اللاصقة.

قيادة السيّارة واستخدام الماكينات:

قد يخلّ هذا الدواء بالقدرة على قيادة السيّارة وتشغيل الماكينات أو الأدوات ذلك لأنك قد تشعر بالميل إلى النوم أو الدوار. وإذا شعرت بهذه الأعراض فلا يجوز قيادة السيّارة أو تشغيل الماكينات أو الأدوات. لا تعدّ السيّارة أو تستخدم الماكينات خلال فترة استخدام الدواء قبل أن تعرف كيف يؤثر الدواء عليك. استشر الطبيب في حال لم تكن متأكدًا ممّا إذا كانت قيادة السيّارة آمنة بالنسبة لك خلال فترة استخدام الدواء.

الفحوص والمتابعة:

خلال العلاج الطويل الأمد، يتوجّب عليك الخضوع لتقييمات دورية لتقييم الحاجة إلى العلاج المتواصل بالدواء.

3. كيف تستخدم هذا الدواء؟

يتوجّب الاستخدام دائمًا وفق إرشادات الطبيب. وعليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج ومدته سيتمّ تحديدها من قبل الطبيب فقط. الجرعة المتبعة عادة هي:

سيتمّ تحديد الجرعة الدوائية من قبل الطبيب فقط استناداً إلى شدة الألم وحالتك العامة وعمرک ومسكّنات الألم التي تتلقاها، بما في ذلك الأدوية الأفيونية الأخرى التي قد استخدمتها. لا يجوز تغيير الجرعة دون استشارة الطبيب.

كلّ لاصقة مخصّصة لـ 3 أيام (72 ساعة) فقط. يجب استبدال كلّ لاصقة كلّ 72 ساعة (في الساعة ذاتها من اليوم) إلا إذا أمر الطبيب بخلاف ذلك. نظرًا لبطء امتصاص الدواء في الجلد، قد لا يتمّ الشعور بتأثيره فور وضع اللاصقة الأولى. وأحيانًا ينشأ التأثير الأقصى للدواء فقط بعد مرور 24 ساعة على وضع اللاصقة الأولى. نظرًا لذلك، قد تحتاج إلى المزيد من مسكّنات الألم في اليوم الأول من العلاج.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

في حال عاودك الألم، راجع الطبيب كي يصف لك المزيد من مسكّنات الألم ويغيّر جرعة اللاصقات. قد يأمرک الطبيب باستخدام عدّة لاصقات في نفس الوقت.

يمكن للطبيب أن يصف لك مزيدًا من مسكّنات الألم لتخفيف الألم التي تنشأ فجأةً.

اتبع تعليمات الطبيب بدقة.

من شأن إيقاف العلاج المتواصل بلاصقات فننا فجأةً أن يسبّب نشوء أعراض الانسحاب (انظر في البند "إذا توقفت عن استخدام الدواء") فلذا لا تتخذ قرار إيقاف العلاج دون أن يأمرک الطبيب بذلك. إذا قرّر طبيبك إيقاف العلاج بلاصقات فننا فاتبع تعليماته بدقة.

قد تنشأ أعراض الانسحاب أيضًا عند الانتقال من لاصقات فننا إلى مسكّنات أخرى للألم والعكس صحيح أيضًا.

انتبه:

ممنوع البلع! هذا الدواء مخصّص للاستخدام الخارجي فقط.

ممنوع إدخال اللاصقة في الفم، وممنوع مضغ و/أو بلع اللاصقة.

ممنوع قطع اللاصقة أو فصل بعض أجزائها عن بعض.

ممنوع استخدام اللاصقة إذا كانت مقطوعة أو متضرّرة أو كانت تبدو متضرّرة.

ممنوع وضع اللاصقة على الجلد المصاب بجروح، احمرار، حروق أو على الجلد الذي قد خضع للعلاجات الإشعاعية.

لا يجوز إيقاف الاستخدام بدون أمر واضح من الطبيب. سيرشدك الطبيب إلى التوقّف عن الاستخدام بالتدرّج.

كلّ لاصقة مخصّصة للاستخدام مرّة واحدة.

طريقة الاستخدام:

يتوجب وضع لاصقة فنتا فور إخراجها من كيس الألومنيوم تبعاً للتعليمات أدناه:

يجب وضع اللاصقة على موضع نظيف على الجلد، خالٍ من الشعر، في الجزء العلويّ من الذراع أو الجزء العلويّ من الجسم (الصدر أو الظهر). يتوجب اختيار موضع خالٍ من الندوب والشقوق أو التهيج. لا يجوز الإصاق بالمرققين (لأنهما يتحركان بشكل مستمر). لدى متلقيّ العلاج ذوي القدرة العقلية/المعرفية المحدودة ولدى الأطفال، من المستحسن الإصاق على الجزء العلويّ من الظهر وذلك للحدّ من قدرتهم على إزالة اللاصقة وبلعها.

أزل الشعر الزائد من الجلد بواسطة مقصّ فقط (لا تقم بالحلاقة كيلا تجرح الجلد).

اغسل الجلد (إذا دعت الحاجة) بالماء البارد فقط (بدون الصابون!). جفّف الجلد جيّداً وبلطف. لا تستخدم الصابون، المستحلبات، الزيوت، المراهم، التلك أو الكحول قبل وضع اللاصقة على الجلد. لا تضع اللاصقة فور الانتهاء من الاستحمام بالدهن أو بحوض الاستحمام بالماء الساخن. انتظر إلى أن يجفّ الجلد ويصبح بارداً تماماً.

قبل وضع لاصقة جديدة، أزل اللاصقة السابقة. يجب فتح كيس الألومنيوم فقط قبل وضع اللاصقة مباشرةً.

يوصى بالاحتفاظ بالكيس الأصليّ كي تستطيع وضع اللاصقة المستخدمة فيه والتخلّص منها.

تحقق من تغطية اللاصقة بالثوب الفضفاض وغير الضيق، ولا تغطها بالضمادة الضيقة أو المرنة.

تعليمات الاستخدام (انظر الرسومات):

1. أمزق بلطف طرف كيس الألومنيوم وأخرج اللاصقة. احرص على عدم إلحاق الضرر باللاصقة وأنت تفتح الكيس.
2. اطو اللاصقة على امتداد علامة الـ S، إلى أن يرتفع الغطاء الواقي. أزل نصف الغطاء الواقي، ضع اللاصقة على الجلد (من دون ملامسة الجزء الملتصق) وأزل النصف الآخر من الغطاء الواقي.
3. ألصق اللاصقة بالجلد بواسطة راحة اليد طيلة 30 ثانية. تحقّق من التصاق اللاصقة الكاملة بالجلد (تحديدًا أطراف اللاصقة).
4. بعد الانتهاء من الإصاق، اغسل يديك بالماء فقط (بدون الصابون).
5. سجّل تاريخ وساعة وضع اللاصقة في المكان المخصّص لذلك على العلبة (سيساعدك ذلك على تحديد موعد مرور أيّام العلاج الثلاثة).
6. اترك اللاصقة ملتصقة بالجلد طيلة 3 أيّام (72 ساعة). يمكن الاستحمام (بالدشّ أو في حوض الاستحمام) وحتى السباحة واللاصقة ملتصقة بالجلد. ممنوع فرك اللاصقة وموضع الإصاق أو غسلها بالصابون.
7. بعد مرور 3 أيّام (72 ساعة) أزل اللاصقة عن طريق تقشيرها من الجلد.
8. اطو اللاصقة المستخدمة إلى جزئين بحيث يكون الجانب الملتصق موجّهاً إلى الداخل وارضها فوراً بشكل آمن. انظر البند 5.
9. ضع اللاصقة الجديدة في موضع مختلف على الجلد. ممنوع وضع اللاصقة الجديدة في نفس الموضع حيث وضعت اللاصقة السابقة. يمكن وضع لاصقة في الموضع ذاته مرّة ثانية فقط بعد مرور عدّة أيّام.

ممنوع الاحتفاظ بلاصقات فنتا المتبقية في المنزل بعد انتهاء العلاج. يجب استشارة الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من اللاصقات. انظر أيضاً البند 5.

إذا سقطت اللاصقة من تلقاء نفسها، فيجب التخلص منها ووضع أخرى جديدة فور ملاحظة الأمر. يجب وضع اللاصقة الجديدة في موضع مختلف آخر على الجلد. سجّل التاريخ والساعة. يجب إخبار الطبيب بسقوط اللاصقة. يجب استبدال اللاصقة الجديدة بعد 3 أيّام (72 ساعة) أو بحسب أوامر الطبيب.

إذا تفاعمت الألام لديك:

- إذا تفاعمت الألام لديك فجأةً فيجب الفحص ما إذا كانت اللاصقة لا تزال ملتصقة جيّداً أو ربما قد سقطت. انظر أيضاً "إذا سقطت إحدى اللاصقات" لاحقاً.
- إذا زادت الألام لديك سوءاً مع مرور الوقت خلال فترة العلاج باللاصقات فقد يصف لك الطبيب جرعة أعلى من اللاصقات و/أو مسكّن آلام آخر.
- إذا لم تكن زيادة الجرعة مفيدة، فقد يقرّر الطبيب التوقّف عن استخدام اللاصقات. انظر أيضاً "إذا توقفت عن استخدام الدواء".

إذا استخدمت جرعة دوائية أكبر بالخطأ: إذا استخدمت عدداً أكبر من اللاصقات ممّا أوصاك به الطبيب أو إذا استخدمت جرعة غير صحيحة، فيجب إزالة اللاصقة ومراجعة الطبيب أو الحضور إلى غرفة الطوارئ في المستشفى فوراً وإحضار علبة الدواء. تشمل أعراض الجرعة المفرطة صعوبات التنفّس، والتنفّس السطحي، والتنشيط التنفّسي (ردّ الفعل الأشدّ)؛ التعب، كثرة النعاس، عدم القدرة على التفكير بوضوح، المشي أو التكلّم بشكل عادي؛ الشعور بالإغماء، الدوار أو الارتباك. وفي حال عانى متلقيّ العلاج من صعوبات التنفّس، يجب إزالة اللاصقة ومراجعة الطبيب أو زيارة المستشفى حالاً. يتوجب التحقّق من استمرار الشخص في التحرك والتكلّم قدر الإمكان. انظر أيضاً في البند 2 "التصاق لاصقة بشخص آخر".

إذا نسيت استبدال لاصقة فنتا:

- استبدل لاصقة فنتا فور تدرك ذلك وسجّل التاريخ والساعة. استبدل اللاصقة مرّة أخرى بعد 3 أيّام (72 ساعة) كالمعتاد.
- إذا فاتك موعد استبدال اللاصقة، فراجع الطبيب لأنك قد تحتاج إلى المزيد من مسكّنات الألام. لا تستخدم عدداً أكبر من اللاصقات ممّا أوصاك الطبيب به.

إذا سقطت إحدى اللاصقات:

- إذا سقطت لاصقة قبل أن يحين موعد استبدالها، فيجب وضع لاصقة جديدة فوراً وتسجيل التاريخ والساعة. يجب وضع اللاصقة في موضع مختلف على الجلد (في الجزء العلويّ من الذراع أو من الجسم) أمّا الأطفال فيجب وضع اللاصقة على الجزء العلويّ من الظهر لديهم.
- يجب ترك اللاصقة الجديدة مكانها لـ 3 أيّام أخرى (72 ساعة). يجب إخبار الطبيب بذلك وعلى أيّ حال يتعيّن اتّباع تعليماته.

- إذا سقطت اللاصقة مرارًا وتكرارًا فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة.
- يجب المواظبة على العلاج بالتماشي مع توصيات الطبيب. وحتى إذا تحسنت حالتك الصحيّة، فلا يجوز التوقّف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استخدام الدواء:

- لا يجوز التوقّف عن استخدام لاصقات فنّتا بشكل فجائيّ. إذا أردت التوقّف عن استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أوّلًا ليرشدك إلى طريقة القيام بذلك. يوصي الطبيب عادةً بخفض الجرعة تدريجيًّا لتقليل أعراض الانسحاب قدر الإمكان. قد تشمل أعراض الانسحاب ما يلي: التملّص، صعوبات النوم، العصبية، عدم الهدوء، القلق، الشعور بدقّات القلب (الخفقان)، زيادة ضغط الدم، الغثيان، التقيؤ، الإسهال، نقص الشهية، الارتعاش، القشعريرة، التعرّق، زيادة نظم القلب و/أو سرعة التنفّس؛ الضعف، التثاؤب، آلام العضلات، الانقباضات في البطن، الدمعان، سيلان الأنف، توسّع حدقة العين، فرط الحركة (من حيث العضلات، أيضًا).
- إذا توقفت عن استخدام لاصقات فنّتا فلا تبدأ باستخدامها مرّة ثانية دون استشارة الطبيب أوّلًا. قد تحتاج إلى لاصقات ذات مفعول أقوى عند البدء بالاستخدام مجددًا.

لا يجوز استخدام أو تناول الأدوية في الظلام! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كلّ مرّة تستخدم فيها دواء. ضع النظارات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

وإذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أيّ دواء، قد يؤدّي استخدام فنّتا إلى نشوء الأعراض الجانبية عند بعض المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. ذلك لأنك قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

إذا لاحظت أنت أو شخص ما من حولك واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية لدى الشخص الذي قد تمّ وضع اللاصقة على جلده فيتوجب إزالة اللاصقة ومراجعة الطبيب أو الحضور إلى المستشفى فورًا لأنّ هذه الحالة قد تستدعي العلاج الطارئ. الأعراض:

- الشعور غير الطبيعيّ بالميل إلى النوم، التنفّس السطحيّ أو الأبطأ من المعتاد (التثبيط التنفّسيّ). يتوجب اتّباع الإرشادات الواردة أعلاه والتحقّق من استمرار الشخص الذي قد تمّ وضع اللاصقة على جلده في التحرك والنكلم قدر الإمكان. في أحيان نادرة جدًّا، قد تكون صعوبات التنفّس هذه مهددة للحياة، بل من شأنها أن تؤدّي إلى الوفاة، تحديدًا لدى الأشخاص الذين لم يستخدموا مسكّنات الآلام الأفيونية القويّة سابقًا (مثلًا، فنّتايل أو مورفين) في الماضي. هذه الأعراض الجانبية غير شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحدّ أقصى من بين 100 شخص).
 - انتفاخ الوجه أو الحلق فجأة؛ التهيج الخطير، الاحمرار أو النطفات في الجلد. قد تدلّ هذه الأعراض على ردّ الفعل التحسّسيّ الخطير (بما في ذلك الصدمة التأقية، وردّ الفعل التأقيّ). إنّ مدى شيوع هذا العرض الجانبيّ غير معروف.
 - الاختلاجات/التشنّجات. هذه الأعراض الجانبية غير شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحدّ أقصى من بين 100 شخص).
 - انخفاض مستوى الوعي أو فقدان الوعي. هذه الأعراض الجانبية غير شائعة (قد تؤثر على شخص 1 كحدّ أقصى من بين 100 شخص).
- انظر أيضًا البند الثانوي "الأعراض الجانبية لفنّتا التي تستلزم الانتباه الخاص" في البند 2.

الأعراض الجانبية الأخرى:

الأعراض الجانبية الشائعة جدًّا (الأعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من أصل 10):

الغثيان، التقيؤ، الإمساك؛ النعاس/الميل إلى النوم؛ الدوار؛ الصداع.

الأعراض الجانبية الشائعة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 100):

ردّ الفعل التحسّسيّ؛ فقدان الشهية؛ صعوبات النوم؛ الاكتئاب؛ الشعور بالقلق أو الارتباك؛ رؤية، سماع، شمّ أو الشعور بأشياء غير موجودة (الهلوسة)؛ القشعريرة أو الانقباضات العضليّة؛ الإحساس غير الطبيعيّ في الجلد، مثلًا التتميل أو الوخز؛ الشعور بالدوار (الدوخة)؛ الشعور بدقّات القلب السريعة أو غير المنتظمة (الخفقان، تسارع دقّات القلب)؛ زيادة ضغط الدم؛ ضيق التنفّس؛ الإسهال؛ جفاف الفم؛ أوجاع البطن (بما في ذلك الجزء العلويّ من البطن) أو صعوبات الهضم؛ فرط التعرّق؛ الحكّة، الطفح الجلديّ أو احمرار الجلد؛ نقص القدرة على التبوّل أو تفرّغ المثانة كاملًا (احتباس البول)؛ الشعور بالتعب الشديد، الضعف أو الشعور العامّ السيء؛ الشعور بالبرد؛ تورّم القدمين/الرجلين أو الكاحلين (الوذمة المحيطية).

الأعراض الجانبية غير الشائعة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 1000 مستخدم):

الشعور بالتملّص أو التوهان؛ الشعور بالفرح الشديد (الشمق)؛ انخفاض الإحساس أو نقص الحساسيّة (تحديدًا في الجلد)؛ فقدان الذاكرة، ضبابيّة الرؤية؛ دقّات القلب البيطية (بطء القلب)، انخفاض ضغط الدم؛ ازرقاق الجلد نتيجةً لانخفاض مستوى الأوكسجين في الدم (الزرقة)؛ عدم انقباض الأمعاء (انسداد الأمعاء)؛ الطفح الجلديّ المثير للحكّة (الإكزيما)؛ التهاب الجلد، ردّ الفعل التحسّسيّ أو مشاكل أخرى في الجلد في موضع اللاصقة؛ الحالة المرضيّة الشبيهة بالإنفلوانزا؛ الإحساس بتغيّر درجة حرارة الجسم؛ الحمّى؛ التشنّجات العضليّة؛ صعوبة الانتصاب أو ضعف الانتصاب (الضعف الجنسيّ) أو مشاكل في إقامة العلاقة الجنسيّة؛ أعراض الانسحاب، صعوبة أو صعوبة خطيرة في التنفّس.

الأعراض الجانبية النادرة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 10000 مستخدم):

تقلّص حدقة العين؛ انقطاع النفس من حين إلى آخر (apnea)؛ انسداد الأمعاء الجزئيّ، نقص التهوية (دخول كمّيّة أقلّ ممّا يجب من الهواء في الرئتين).

الأعراض الجانبية التي مدى شيوعها غير معروف (الأعراض التي لم يتمّ تحديد مدى شيوعها بعد):

نقص الهرمونات الجنسيّة الذكريّة (نقص الأندروجينات)؛ الهذيان (قد تشمل الأعراض مجموعةً من أعراض التملّص، عدم الهدوء، التوهان، الارتباك، الخوف، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالفعل، اضطرابات النوم، الكوابيس)؛ التنفّس البطيء جدًّا.

ملاحظات أخرى:

- قد تلاحظ الطفح الجلدي، الاحمرار أو الحكة الطفيفة في الجلد حيث تم وضع اللاصقة. هذه الأعراض طفيفة عادةً وتنتلشى بعد إزالة اللاصقة. في حال لم يتم إزالتها فمن شأن اللاصقة أن تتسبب في التهيج الخطير في الجلد، مما يستلزم مراجعة الطبيب.
- قد تسبب إعادة استخدام اللاصقات انخفاض مفعول الدواء (نتيجةً لتكيف الجسم مع الدواء/تحمل الدواء أو نشوء الحساسية المفرطة للألم)؛ علاوةً على ذلك، من شأن إعادة استخدام اللاصقات أن تؤدي إلى نشوء الاعتماد على الدواء.
- إذا تم استبدال مسكن آخر للألم بلاصقات فننا أو إذا توقفت فجأة عن استخدام لاصقات فننا فقد تشعر بأعراض الانسحاب، مثلًا: الغثيان، التقيؤ، الإسهال، القلق، الارتعاش، القشعريرة. أخبر الطبيب إذا شعرت بهذه الأعراض. انظر أيضًا "إذا توقفت عن استخدام الدواء" في البند 3.
- قد تم الإخبار أيضًا بحالات اختبر فيها الأطفال حديثو الولادة أعراض الانسحاب بعد أن استخدمت أمهاتهم لاصقات فننا لفترة طويلة خلال الحمل. انظر أيضًا في البند 2 - "الحمل والإرضاع".

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فيجب عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية بالضغط على الرابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية في أعقاب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

الأعراض الجانبية لدى الأطفال:

هذه الأعراض الجانبية مشابهة للأعراض لدى البالغين.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا (تتشأ لدى أكثر من مستخدم واحد من أصل عشرة) التي تم الإبلاغ عنها في التجارب السريرية على الأطفال (حتى عمر 18):
الصداع، الغثيان أو التقيؤ، الإمساك، الإسهال، الحكة.

يجب على الوالدين إخبار الطبيب المعالج بأي عرض جانبي وأي دواء آخر يُعطى للطفل.

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! يجب الاحتفاظ بهذا الدواء على وجه التحديد (اللاصقات المستخدمة و/أو الجديدة) وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن مرأى ومتناول أيدي الأطفال و/أو الأطفال الرضع وهكذا ستمنع التسمم الذي قد يتسبب في الضرر المهدد للحياة.
لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الوارد على العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته. أما اللاصقات التي قد انقضت فترة صلاحيتها ولم تعد بحاجة إليها، فيجب إرجاعها إلى الصيدلية.
- ظروف التخزين: يجب تخزينها بدرجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية في الكيس الأصلي.
- يجب الاحتفاظ باللاصقات فننا في مكان آمن ومؤمن لا يستطيع الأشخاص الآخرون الوصول إليه. قد يتعرض الأشخاص الذين لم يتم وصف هذا الدواء لهم للإصابة الخطيرة وحتى الوفاة إذا استخدموا هذا الدواء بالخطأ أو عمدًا.
- كيفية التخلص من اللاصقات المستخدمة أو اللاصقات التي لم تعد بحاجة إليها: من شأن لاصقة جديدة أو مستخدمة قد التصقت بشخص ما ليس متلقي العلاج بالخطأ وتحديدًا بطفل ما أن تؤدي إلى الوفاة (تحتوي اللاصقة المستخدمة على كمية ما من الدواء، أيضًا). يجب أن تطوي اللاصقة المستخدمة إلى جزئين بحيث يكون الجانب الملتصق موجهًا للداخل ثم أدخل اللاصقة في الكيس الأصلي. احتفظ بالكيس بعيدًا عن مرأى ومتناول أيدي الأشخاص الآخرين، تحديدًا الأطفال، إلى أن تتخلص منه بشكل آمن. يجب استفسار الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها.

6. معلومات إضافية

علاوةً على المادة الفعالة تحتوي اللاصقات أيضًا على المادة غير الفعالة التالية:

Polyacrylate adhesive layer (Polybutyltitanate & Duro-Tak)
Backing layer: Polypropylene foil
Release liner: Polyethylene terephthalate foil siliconized
Blue printing ink

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

تتوفر في كل علبة 5 لاصقات جلدية شفافة. كل لاصقة معبأة في كيس ألومنيوم منفصل.

فنتا 12: اللاصقات المربعة التي تبلغ مساحتها 3.75 سم مكعب. طبع على الجهة الخلفية من اللاصقة بالحبر الأزرق "fentanyl 12µg/h"
فنتا 25: اللاصقات المربعة التي تبلغ مساحتها 7.5 سم مكعب. طبع على الجهة الخلفية من اللاصقة بالحبر الأزرق "fentanyl 25µg/h"
فنتا 50: اللاصقات المربعة التي تبلغ مساحتها 15 سم مكعب. طبع على الجهة الخلفية من اللاصقة بالحبر الأزرق "fentanyl 50µg/h"
فنتا 75: اللاصقات المربعة التي تبلغ مساحتها 22.5 سم مكعب. طبع على الجهة الخلفية من اللاصقة بالحبر الأزرق "fentanyl 75µg/h"
فنتا 100: اللاصقات المربعة التي تبلغ مساحتها 30 سم مكعب. طبع على الجهة الخلفية من اللاصقة بالحبر الأزرق "fentanyl 100µg/h"

المصنع: نيسا لايتيك م.ض.، لانجيفيلد، ألمانيا.

صاحب التسجيل: مختبرات رفا م.ض.، ص.ب. 405، أورشلين القدس 9100301

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

فنتا 12 :1373931638 ، فنتا 25 :1363731287 ، فنتا 50 :1363831288 ، فنتا 75 :1363931289 ، فنتا 100 :1364031290 .

من باب تيسير القراءة وتسهيلها، تم صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر، لكنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.
تمّ تحرير النشرة في ديسمبر/كانون الأول 2022 تبعاً لإرشادات وزارة الصحة.

te-305005