

نشرة طبيَّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُستوفى هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

لوسارتان بولوس

أقراص

يحتوي كل قرص على:

لوسارتان بوتاسيوم 50 ملغ
Losartan Potassium 50 mg
هيدروكلوروثيازيد 12.5 ملغ
Hydrochlorothiazide 12.5 mg

لا تلاحظ على قائمة ألوية غير الفعالة وملبيئات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و البند 6 "أقراص إضافية"

علامة التثورة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء.

- يحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن **لوسارتا بولوس**. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، فاسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجتك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بد لك أن حالتهم الطِبِّيَّة مشابهة لحالتك.
- لوسارتا بولوس** غير مخصص للأولاد والمراهقين الذين سنهم دون الـ 18.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لوسارتا بولوس مخصص لعلاج فرط ضغط الدم، وكذلك للمساهمة في تقليل خطر الإصابة بمتكدة دماغية لدى المرضى المصابين بفرط ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر (الحجرة الزبينية) في القلب.
الغرضة العلاجية: لوسارتا بولوس عبارة عن دمج بين حاصر مستقبل الأنجيوتنسين II (لوسارتان) ومُدرّ البول من نوع الثيازيد (هيدروكلوروثيازيد).

تُجيبتنسين II عبارة عن مادة يتم إنتاجها في الجسم، ترتبط بمستقبلاتي في الأوعية الدموية وتؤدي إلى تضيقها. ينجم عن ذلك ارتفاع في ضغط الدم. يمنع لوسارتان ارتباط أنجيوتنسين II بهذه المستقبلات ويؤدي إلى ارتخاء الأوعية الدموية، وإلى خفض ضغط الدم نتيجة لذلك. يعمل هيدروكلوروثيازيد عن طريق جعل الكليتين تمرران المزيد من الماء والملح عبرهما. يساعد هذا الشيء أيضاً على خفض ضغط الدم.

2. قبل استعمال الدواء:

❗ **يجوز استعمال الدواء إذا:**

- كنت حاسناً (أرجيًّا) للوسارتان، لهيدروكلوروثيازيد أو لأي واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء (انظر معلومات إضافية في البند 6).
- كنت حاسناً (أرجيًّا) لعضة أخرى من مشتقات السولفوناميدات (مثلاً: ثيازيدات أخرى، بعض الأدوية المضادة للجراثيم مثل كوتريمكسازول، أسأل الطبيب إذ لم تكن متأكدًا).
- كان لديك خلل شديد في وظيفة الكبد.
- كانت لديك مستويات منخفضة للبوليتاسيوم، مستويات منخفضة لمغصوديوم أو مستويات مرتفعة للكالسيوم، والتي لا يمكن تعديلها عن طريق العلاج.
- كنت تعاني من الفقرس (جائوت).
- كنت حاملًا لأكثر من 3 أشهر (يفضّل أيضًا الامتناع عن استعمال **لوسارتا بولوس** في بداية الحمل، انظري الفصل "الحمل، الإرضاع والحوصوة").
- كان لديك تضمر شديد في وظيفة الكليتين أو أن كليتيك لا تنتجان البول بتأنا.
- كان لديك سكري أو خلل في الوظيفة الكليوية وكنك تستعمل دواءً لخفض ضغط الدم يحتوي على الأيسكيرين.

❗ **تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:**

حدثت مع طبيبك، مع الصيدلي أو مع المرمرضة قبل أن تستعمل

الدواء
إذا نشأ لديك انخفاض في الريوية أو ألم في العين، فقد يكونان عرضين لتركب السوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو لارتفاع الضغط في العين، ومن

الممكن أن يظهرأ في غضون ساعات إلى أسابيع من لحظة تناول **لوسارتا بولوس**. إذا لم تتم معالجة هذه الحالة، فقد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر. إذا كانت لديك في الماضي أرجية للبيبتيلين أو سولفوناميد، فقد تكون أكثر عرضةً لحظر تطوير هذه الأعراض.
يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تطفيين أنك حامل (أو قد تحمطين).

لا يوصى باستعمال **لوسارتا بولوس** في بداية الحمل، ويُمنع استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضررًا شديدًا لطفلك إذا استُعمل في هذه المرحلة (انظري الفصل "الحمل، الإرضاع والحوصوة").

❗ **قبل العلاج بالدواء، أخبر الطبيب إذا:**

- كانت لديك مشاكل في التنفس أو مشاكل في الرئتين (بما في ذلك التهاب أو وجود سائل في الرئتين) بعد تناول هيدروكلوروثيازيد في الماضي. إذا نشأ لديك ضيق التنفس الحظري أو صعوبات في التنفس بعد تناول **لوسارتا بولوس**، فتوجه فورًا لتلقي العلاج الطبي.
- عانيت في الماضي من تقوّات أو حالات إسهال شديدة.
- كان لديك خلل في وظيفة الكبد (انظر البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
- كنت تتبع حماية غذائيّة قليلة الملح.
- كنت تعاني أو عانيت من تقوّات وآو حالات إسهال شديدة.
- كان لديك قصور القلب.
- كان لديك خلل في وظيفة الكبد (انظر البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
- كنت تتبع حماية غذائيّة قليلة الملح.
- كنت تعاني أو عانيت من تقوّات وآو حالات إسهال شديدة.
- كانت لديك مشكلات في المعدة (تضيق أو آلام في البطن).
- كانت لديك مشكلات في الكليتين (تضيق شرياني الكلية) أو إذا كانت لديك كلية واحدة نشطة فقط، أو إذا خضعت مؤخرًا لزراعة الكلية.
- كان لديك تضيق في الشرايين (تصلب الشرايين)، ندحة صدرية (الأم في الصدر نتيجة لتدني وظيفة القلب).
- كان لديك تضيق في الصمام الأبهريّ أو الميتراليّ (تضيق صمامات القلب) أو اعتلال عضلة القلب الضخامي (مرض

يسبب تضخم عضلة القلب).

كنت تعاني من السكري.

كان لديك فقرس (جائوت).

كانت لديك الأن أو كانت لديك في الماضي حالة أرجية، ربو أو حالة تصلب الألام في المفاصل، الطفح الجلديّ والحميّ (إربوس) (التهبة الحميامة المجمعية).

كانت لديك مستويات مرتفعة للكالسيوم أو مستويات منخفضة للبوليتاسيوم أو كنت تتبع حماية غذائيّة قليلة للبوليتاسيوم.
كان عليك الحضور على الطبيب عادةً لمتبني الأسنان) أو كنت قبيل عمليّة جراحية، أو كنت على وشك الخضوع لفحوص ووظيفة الغدة المحارورة للدرقيّة. فيتوجب عليك إخبار طبيبك أو المقام الطبّي بأنك تستعمل أقراص **لوسارتا بولوس**.

كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأرتليّ (متلازمة نتنج عن خلل في الغدة الكظريّة وترتبط بارتفاع إفراز هورمون الألدوستيرون من قبل الغدة).

كنت تستعمل أي واحد من الأدوية التالية المستعملة لعلاج ضغط الدم المرتفع:

- مئيظ ACE (مثلاً، اينالابريل، ليزينوپريل، رامبيريّل)، خاصةً إذا كانت لديك مشاكل في الكليتين متعلق بالسكريّ.
- أيسكيرين.

قد يفحص طبيبك وظيفة الكليتين لديك، وضغط الدم وكميّة الكهارل (مثلاً، البوليتاسيوم) في دمك بفواصل زمنيّة ثابتة. انظر أيضًا المعلومات المدرجة تحت العنوان "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

- كنت تستعمل أدوية أخرى من شأنها أن ترفع مستويات البوليتاسيوم في مصل الدم (انظر البند 2 "التفاعلات بين الأدوية"). أصبت في الماضي بسرطان الجلد، أو إذا تطوّرت لديك أفة جلديّة غير متوقّعة خلال فترة استعمال الدواء.
- قد يزيد استعمال هيدروكلوروثيازيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد والشفتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما)، تحديدًا عند الاستعمال الطويل الأمد بجرعات دوائيّة عالية.
- يجب حماية الجلد من التعرّض لأشعّة الشمس والأشعّة فوق البنفسجيّة (UV) خلال فترة استعمال **لوسارتا بولوس**.

❗ **التفاعلات بين الأدوية:**

إذا كنت تستعمل الآن أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدليّ بذلك.

أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل إضافات البوليتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البوليتاسيوم، الأدوية الحافظة للبوليتاسيوم أو أدوية أخرى من شأنها أن ترفع مستويات البوليتاسيوم في مصل الدم (مثلاً، أدوية تحتوي على تريميثوپريم)، ولا يوصى بدمجها مع **لوسارتا بولوس**.
قد يحدث تفاعل بين الأدوية المدرّة للبول، مثلًا بين هيدروكلوروثيازيد الموجود في **لوسارتا بولوس**، وأدوية أخرى. لا يجوز استعمال **لوسارتا بولوس** بدمج مع أدوية تحتوي على الليثيوم دون مراقبة طبيبك عن كثب.

قد تكون وسائل الحذر الخاصة (مثل: فحوص الدم) ملائمة إذا كنت تستعمل مدرّات البول الأخرى، بعض الأدوية المسببة، أدوية لعلاج القرحس (جائوت)، أدوية للسيطرة على نظم القلب أو أدوية للسكريّ (الأدوية المعطاة عن طريق الفم أو الأينسولين).
من المهمّ أيضًا أن يعلم طبيبك إذا كنت تستعمل:

- أدوية أخرى لخفض ضغط الدم.
- الستيرويدات.
- أدوية لعلاج السرطان.
- مسكّبات الألام.
- أدوية لعلاج التلوّثات الفطريّة.
- أدوية لعلاج التهاب المفاصل (الآرثرئيتيس).
- المستحضرات التي تحتوي على الصمغيّات (الارتينجات) لعلاج الكوليسترول المرتفع، مثل كلوريسيرامين.
- أدوية لإرخاء العضلات.
- الحبوب الموميّة.
- أدوية أفيونيّة مثل المورفين.
- "pressor amines" مثل الأدرينالين أو أدوية أخرى من نفس الفصيلة.
- الأدوية المعطاة عن طريق الفم للسكريّ، أو الأينسولين.
- قد يضطرّ طبيبك إلى تغيير الجرعة وآو إلى اتّخاذ وسائل أخرى للحذر.

إذا كنت تستعمل متبظ ACE أو الأيسكيرين (انظر أيضًا المعلومات المدرجة تحت العنوانين "لا يجوز استعمال الدواء إذا" و"تحذيرات ومشكلات متعلّقة باستعمال الدواء").

رجاءً اعلم طبيبك أيضًا بأنك تستعمل **لوسارتا بولوس** إذا كنت ستخضع لتصوير قريبًا وستتلقّى مادة تبايّن تحتوي على اليود.

❗ **استعمال الدواء مع الطعام والشراب:** لا تجوز استعمال **لوسارتا بولوس** مع أو بدون الطعام.

يجب الامتناع عن شرب عصير الجريبفروت عند استعمال **لوسارتا بولوس**.

❗ **استعمال الدواء واستهلاك الكحول:**

يوصى بعدم شرب الكحول خلال فترة استعمال هذه الأقراص: قد يزيد كل من الكحول وأقراص **لوسارتا بولوس** من تأثيرات الآخر.

❗ **الحمل، الإرضاع والحوصوة:**

الحمل
يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تطفيين أنك حامل (أو قد تحمطين).
سيوصيك طبيبك عادةً بالتوقّف عن استعمال **لوسارتا بولوس** قبل أن تحملي أو فور عليك بأنك حامل وسيوصيك باستماتل دواء آخر بدلا من **لوسارتا بولوس**. لا يوصى باستعمال **لوسارتا بولوس** في بداية الحمل، ويُمنع استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضررًا شديدًا لطفلك إذا استُعمل بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع
أخبري طبيبك إذا كنت مرضعًا أو على وشك البدء بالإرضاع. لا يوصى باستعمال **لوسارتا بولوس** لدى الإمهات المرضعات، وقد يختار طبيبك لك علاجًا آخر إذا كنت معنيّة بالإرضاع.

❗ **الاستعمال لدى الأولاد والمراهقين:** لا تتوفّر معلومات بخصوص استعمال **لوسارتا بولوس** لدى الأولاد، لذلك، لا يجوز استعمال **لوسارتا بولوس** للأطفال.

الاستعمال لدى البالغين:

يعمل **لوسارتا بولوس** ويحتمل بشكل جيد بنفس المقدار لدى معظم المرضى البالغين، المتقدّمين في السن والأصغر سنًا. الجرعة المطلوبة لمعظم المرضى المتقدّمين في السنّ هي نفس الجرعة المطلوبة للمرضى الأصغر سنًا.

❗ **المياقة واستعمال المكاتب:**

عندما تبدأ العلاج بهذا الدواء، لا يجوز إجراء مهمّة تتطلب الانتباه الحامن (مثلاً: قيادة السيّارة أو تشغيل المكاتب الخطرة) حتى تتعلم كيف يكون ردّ فعلك على الدواء.

لا يحملون هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي كل قرص من **لوسارتا بولوس** على ما يقارب 66 ملغ من الكلوروز. إذا أخبرت الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريّات معينة، فراجع طبيبك قبل استعمال هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال **لوسارتا بولوس** دائمًا بحسب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية أو من كيفية العلاج بالمستحضر.
ضع نصيحة الآتية على الواجهة من المهمّة الإستمتر باستعمال **لوسارتا بولوس** ما دام طبيبك يصفه لك من أجل الحفاظ على السيطرة على ضغط دمك. يمكن تناول **لوسارتا بولوس** مع أو بدون الطعام. يجب ابتلاع القرص مع كأس ماء.

الجرعة الدوائيّة وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائيّة المتبّعة عادةً هي:

فقط ضغط الدم:

جرعة **لوسارتا بولوس** العادية لدى معظم مرضى ضغط الدم المرتفع هي قرص واحد من **لوسارتا بولوس** في اليوم، من أجل السيطرة على ضغط الدم لمدة 24 ساعة. الجرعة الدوائيّة اليومية القصوى هي قرصان في اليوم من **لوسارتا بولوس**، مرّة واحدة في اليوم.

المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع وتضخم الشّيطان

الإيسر:

سيتمّ تحديد الجرعة الدوائيّة من قبل الطبيب فقط.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

التيروض الشطر المصنّع:

لا يجوز المصنع. القرص مخصص للبلع.

لا يجوز الشطر، لأنّ الجرعة الدوائيّة في كلّ نصف قرص غير متساوية.
خطّ التماسيح غير مخصص للشطر القرص.
لا تتوفّر معلومات بخصوص سحق/ حرس القرص.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائيّة أكبر

قد يسبّب فرط الجرعة حدوث هبوط في ضغط الدم، خفقانًا، نضابًا بطيئًا، تغيرات في تركيب الدم وتخفّفًا.
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيبت تناول الدواء

حاول أن تتناول **لوسارتا بولوس** كلّ يوم مثلما وُصف لك. لكن، إذا نسيبت تناول هذا الدواء في الوقت المحدّد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتياديّ واستشر طبيبك.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

من المهمّة الإستمرار باستعمال **لوسارتا بولوس** ما دام طبيبك يصفه لك من أجل الحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.
لا يجوز تناول **لوسارتا بولوس** مع أو فور عليك بأنك حامل وسيوصيك باستماتل دواء آخر بدلا من **لوسارتا بولوس**.
يجب مراجعة المنصق والتأكد
الجرعة
إذا كنت تطفيين أنّ **يجب وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها**
إذا تفرّقت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية:

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال **لوسارتا بولوس** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين.
لا تلتقّ ق قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

يجب إبلاغ طبيبك **الدواء والتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة إذا ظهر:**

ردّ فعل تحسّسي خطير (طفح جلديّ، حكّة، انتفاخ الوجه، الشفتين، ألم أو الحلق ممّا قد يسبب صعوبة في البلع أو في التنفّس).
إذا قام عرضٌ جانبيّ خطير كحكّة نادر، ويظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10.000.
قد تحتاج إلى علاج طبّيّ مستعجل أو إلى الرقود في المستشفى.

أعراض جانبية نادرة جدًا (Very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000:

ضخانة تنفسية حادة (تشنج العضلات على ضيق التنفس الخطير، الحمى، الضعف والارتباك).

أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية شائعة (Common) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:

- سعال، التهاب المسالك التنفسية العلوية، احتقان الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، مشاكل في الجيوب الأنفية.
- إسهال، ألم في البطن، غثيان، مشاكل في الهضم.
- الآلام في العضلات أو تقلصات، ألم في الرجل، ألم في الظهر.
- آرق، صداع، دوام.
- ضعف، تعب، ألم في الصدر.
- ارتفاع مستويات البوليتاسيوم في الدم (والتي قد تسبّب اختلالًا في نظم القلب)، انخفاض مستوى الهيموجلوبين.
- تغيرات في وظيفة الكليتين، مشاكل في وظائف الكليتين.
- سكّر منخفض أكثر من اللازم في الدم (نقص سكّر الدم).

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1.000:

فقر الدم، نفاخ حمراء أو بُنيّة على الجلد (أحيانًا بالتدريج على القدمين، الرجلين، والزرعين والموخرة، مع أو في المفاصل، انتفاخ اليدين والقدمين والم في البطن)، كدمات، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، مشاكل في تحنّر الدم، انخفاض عدد الصفائح.

فقدان الشهية، ارتفاع مستويات حمض اليوريك أو القرحس (جائوت)، ارتفاع مستويات السكر في الدم، مستويات شاذة للكهارل في الدم.

قلق، عصبية، اضطراب الهلع (نوبات هلع متكرّرة)، ارتباك، اكتئاب، أحلام شاذة، اضطرابات في النوم، ميل إلى النوم، تضمرّ الذاكرة.

الإحساس ب"دبابيس وإبر" أو إحاسين مشابهة، ألم في الأطراف، ارتخاف، صداع نصفيّ (ميجرينا)، إغماء.
تشنّوش الرؤية، شعور بالحرقة أو الوخز في العينين، التهاب المتحمّسة، تدهور الرؤية، رؤية الأشياء باللون الأصفر.
ظنين، حكّة، نذيب، ضنّخ أو طرق في اللذنين، فيرنچيو (دوار).
ضغط دم منخفض، قد يكون مرتبطًا بالتغيرات في الوضعية (الشعور بالدوار أو بالضعف عند الوقوف)، ندحة صدرية (الم في الصدر)، تقلّب نظم غير سوّي، حدث دماغيّ (TIA - نوبة إقفارية عابرة، "سكّته مصغّر").
نوبة قلبيّة، خفقان.

التهاب الأوعية الدموية المصحوب في أحيان متقاربة بالطفح الجلديّ أو بالكدمات.

ألم في الحلق، ضيق التنفس، التهاب الشعب الهوائيّة، التهاب الرئتين، ماء في الرئتين (يسبّب صعوبة في التنفّس)، رعاغ، سيلان الأنف، احتقان.

إسهال، إسهال شديد، غازات، انزعاج في البطن، تشنّجات في البطن، تقوّات، جفاف الفم، التهاب غدة اللعاب، ألم في الأسنان.
يرقان (اصفرار العينين والجلد)، التهاب البنكرياس.
حكّة، حكّة التهاب الجلد، طفح جلديّ، احمرار الجلد، حساسية للمدوء، جفاف الجلد، احمرار الوجه، تعرّوش، تسلّط الشعر.

ألم في الذراعين، الكنتين، الغفضين، الكنتين أو المفاصل الأخرى، انتفاخ المفاصل، تصلب، ضعف العضلات.
تبول كثير بما في ذلك في الليل، وظيفية غير سوّيّة للكليتين بما في ذلك التهاب الكليتين، تلوّث المسالك البوليّة، سكر في البول.
انخفاض في الشهوة الجنسية، الضعف الجنسي.
انتفاخ الوجه، انتفاخ مصعّعي (وذمة)، حمّى.

أعراض جانبية نادرة (Rare) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10.000:

- التهاب الكبد، نتائج شاذة لفحوص وظائف الكبد.
- أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتمّ تحديد مدى شيوعها بعد)**
- أعراض شبيهة بالإنفلونزا.
- الآلام غير مفسّرة في العضلات مع بول غامق (بلون الشاي) (احتلال الريبونات).
- مستويات منخفضة للصوديوم في الدم (نقص الصوديوم في الدم).
- شعور عامّ سئى.
- اضطراب في حسنة الذوق.

- سرطان الجلد والشفتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما).
- انخفاض في الريوية أو الأم في العينين نتيجة لضغط مرتفع (علامات متخلة على تراكب السوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو الجلوكوما الضيقة الزاوية الحادة).

إذا ظهر عرض جانبيّ، أو إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المُصمّلة

للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّر! يجب حفظ هذا الدواء وآي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد وآو الأطفال الرضّع ومجال رؤيتهم وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال **لوسارتا بولوس** بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

خزّنه في درجة حرارة أقلّ من 25 درجة مئوية.
لا يجوزلقاء الأدوية في المراض أو في النفايات البيئيّة. استشر الصيدلي بالنسبة لكيفية التخلص من الأدوية التي لم تُعدّ هناك حاجة لها. يساهم اتّخاذ هذه الوسائل في الحفاظ على جودة البيئة.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Pregelatinised Starch, Opadry OY-L-32965
Yellow (contains: Lactose Monohydrate, Hypromellose, Titanium Dioxide, Macrogol, Quinoline Yellow Aluminium Lake, Yellow Iron Oxide, Red Iron Oxide), Magnesium Stearate, Macrogl 6000.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مستدير باللون الأصفر، محدّب من كلا الجانبين، مطليّ بالبوليم، مع خطّ إشارة.

تتوفّر عبوات من 7، 10، 30، 60، 100 قرص.

قد لا تُستوفّى جميع أحجام العبوات.

صاحب الامتياز/ المصنع وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيميائية م.رض.
كرويات ملاحى.
تم تحرير هذه النشرة في 02/2023 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 00-31703-24-141.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكل الجنسين.



LFL 570 02/23