

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

גביסקון נוזל מנטה

הרכב החומרים הפעילים וכמותם ביחידות מינון:

סודיום אלגינאט 50 מ"ג/מ"ל
סודיום ביקרבונאט 26.7 מ"ג/מ"ל
קלציום קרבונאט 16 מ"ג/מ"ל
Sodium Alginate 50mg/ml
Sodium Bicarbonate 26.7mg/ml
Calcium Carbonate 16mg/ml

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתרופה, ראה סעיף 6 "מידע נוסף", וסעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים, מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות לרופא במידה ותסימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בסימפטומים של רפלוקס (העלאת מזון) קיבתי, צרבת, בגזים הקשורים לרפלוקס (העלאת מזון) קיבתי, צרבת של הריון, בכל המקרים של מצוקה רום ביטנית או של אחורי עצם החזה, כשהסיבה הבסיסית היא רפלוקס (העלאת מזון) קיבתי.

קבוצה תרפויטית: מדכא ריפלוקס (העלאת מזון), סותר חומצה.,

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 בעלון) כולל מתילפרהידרוקסיבנזואט (E218) ופרופילפרהידרוקסיבנזואט (E216)

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקח לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.

יש לחכות פרק זמן של שעותיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות דרך הפה היות והתרופה יכולה לסתור את פעולת התרופות האחרות ובמיוחד אם אתה נוטל את התרופות הבאות:

- אנטיהיסטמינים
- אנטיביוטיקה (טטרהציקלינים וקווינולונים, כגון נורפלוקסצין)
- תכשירי ברזל
- תרופות נגד פטריות כגון קטוקונזול

- דיגוקסין וחוסמי בטא (לטיפול בבעיות לב)
- פניצילאמין (לטיפול בדלקת מפרקים שיגרנית)
- גלוקורטיקואידים (לטיפול במחלות דלקתיות ואוטואימוניות)
- תרופות נירולפטיות (לטיפול במחלות נפשיות)
- הורמוני תירואיד
- כלורקווין (לטיפול במלריה)
- אסטרמוסטין (לטיפול בסרטן הערמונית)
- ביספוספונאטים (לטיפול באוסטאופורוזיס)

הריון והנקה:

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

כל 5 מ"ל מכילים כ- 71.3 מ"ג נטרן. אם עליך להגביל את כמות הנתרן בתזונתך, התייעץ עם רופא לפני השימוש בתרופה.
מינון יומי מקסימאלי מומלץ של התרופה מכיל 1140.8 מ"ג נטרן (הנמצא במלח שולחן). מינון זה שווה ל- 57% ממינון המקסימלי יומי של נטרן המומלץ במבוגרים. יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח שלך במידה והנך נוטל תכשיר זה על בסיס יומי למשך תקופה ממושכת ובמיוחד אם הומלץ לך להקפיד על תזונה דלת מלח. התכשיר מכיל מתילפרהדירוקסיבנזואט (E218) ופרופילפרהדירוקסיבנזואט (E216) אשר עלולים לגרום לתגובה אלרגית (תיתכן תגובה אלרגית מאוחרת).

התרופה אינה מכילה סוכר או גלוטן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. יש לוודא כי המכסה האוטם אינו שבור לפני שימוש ראשוני בתכשיר.

צורת הנטילה

התרופה מיועדת לנטילה דרך הפה בלבד. יש לנער היטב לפני השימוש.

המינון המקובל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 10-20 מ"ל אחרי האוכל ולפני השינה, עד 4 פעמים ביום.

ילדים בגיל 6-12 שנים: 5-10 מ"ל אחרי האוכל ולפני השינה, עד 4 פעמים ביום. תרופה זו אינה מיועדת בד"כ לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6.

עליך להשתמש בכלי המדידה המיועד למדידת הכמות הנכונה של התרופה. באם לא צורף כלי מדידה היועץ ברוקח. אין להשתמש בכפית ביתית לצורך מדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה. אם לא חל שיפור במצבך לאחר 7 ימים יש לפנות לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה תמיד לרופא או לבית החולים הקרוב ביותר על מנת לקבל חוות דעת לגבי הסיכון ולהתייעץ בנוגע לפעולה שיש לנקוט.

אם השתמשת או נתת לילדך מינון גבוה יותר עלולה להופיע תחושת נפיחות ואי-נוחות בטנית. לא סביר כי זה יגרום לך לנזק, אך יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש או לתת את התרופה השתמש או תן את המנה הבאה בהתאם לצורך. אין להשתמש/לתת מנה כפולה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגביסקון נוזל מנטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרה של:
תופעות לוואי נדירות מאוד - תגובה אלרגית לרכיבים. תסמינים אפשריים פריחה עורית, קשיי נשימה, סחרחורת או נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון וגרון.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה או המטופל סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי אריזת הבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי איחסון: אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C. אין לאחסן במקרר או להקפיא. אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם –

Carbomer, Methyl parahydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Saccharin sodium, Peppermint oil, Sodium hydroxide, Water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: תרחיף בטעם ובניחוח מנטה בצבע חלבי שאינו שקוף. משווק בבקבוק של 300 מ"ל.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 141-67-31756-00

שם היצרן וכתובתו: רקיט בנקיזר הלת'קר (אנגליה) בע"מ, דנסום ליון, הל, אנגליה.
שם בעל הרישום וכתובתו: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, הנגר 6, הוד השרון.

נערך בפברואר 2023

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.