

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוקה **S.C.P. 47 Veterinary** **א.ס.י. פי. 47 וטרינרי**

2. חומר פעיל

כל 1 גרם מכיל:
סולפאכלורופירזין סודיום מונוהידרט 470 מ"ג
Each 1 gram contains:
Sulfachloropyrazine sodium monohydrate 470 mg
לפירוט החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13.

3. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת למניעה ולטיפול בקוקסידיוזיס, ובמחלות הנגרמות על ידי חיידקי סלמונלה ופסטרה בתרנגולות.
קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הסולפונאמידים.

4. התוויות נגד

אין להגיש ללהקות רביה או למטילות.
אין להגיש לבעלי חיים עם רגישות לסולפונאמידים או לכל אחד ממרכיבי התרופה.

5. תופעות לוואי

לעיתים עלולות להופיע תופעות של רגישות יתר.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה

תרנגולות

7. צורת המתן והמינון

64 גרם לכל 100 ליטר מי שתייה במשך 3 ימים רצופים. במקרים קשים אפשר להמשיך בטיפול בהתייעצות עם הרופא הווטרינר, במשך 3 ימים נוספים במחצית המינון. במידה והוחלט לחזור על הטיפול ניתן לעשות זאת לאחר הפסקה של יומיים.

8. אופן השימוש בתכשיר

יש להכין מי שתייה טריים בכל יום.
יש להגיש ללהקה כמקור בלעדי למי שתייה.

9. זמן המתנה

יש להפסיק את הטיפול 4 ימים לפני השחיטה.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחית המטרה
יש להשתמש בתרופה על סמך בדיקת רגישות מיקרוביולוגית של חיידקים שבודדו מהחיה. במידה וזה לא אפשרי, הטיפול צריך להתבסס על מידע אפידמיולוגי איזורי.
הימנע ממינון יתר: כמות המים הנצרכת גבוהה בימים חמים.
הימנע מתת מינון: כמות המים הנצרכת נמוכה אצל חיות חולות.
אם אין שיפור קליני תוך 3 ימים, יש לשקול טיפול אנטיביוטי חלופי על בסיס מבחן רגישות.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים
בתום הטיפול יש לנקות היטב את מערכות מי השתייה על מנת שלא יותרו שאריות של התרופה במערכת.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
אנשים בעלי רגישות יתר ידועה לסולפונאמידים או לאחד ממרכיבי התרופה צריכים להימנע ממגע עם התכשיר.
יש להימנע ממגע עם העור ורקמות ריריות. יש להשתמש בבגדי מגן, משקפי מגן, כפפות ומסיכה. אין לעשן, לאכול או לשתות בזמן הטיפול בתכשיר.
- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות לא ידוע
- חוסר התאמה (incompatibility)
בהיעדר מחקרים לגבי התאמה, אין לערבב תכשיר זה עם תכשירים וטרינריים אחרים.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה. אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם Dextrose.
- התרופה ארוחה בשקים ומכילה אבקה בצבע קרם-לבנבן.
- כל אריזה מכילה 320 גרם או 1 ק"ג. יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
- **בעל הרישום:** אביק תוצרים וטרינריים בע"מ. ת.ד. 489 בית שמש.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: 12/2021.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 072-14-91672