

پریچبالین اینوقامد 25 ملغ پریچبالین اینوقامد 50 ملغ پریچبالین اینوقامد 75 ملغ پریچبالین اینوقامد 150 ملغ پریچبالین اینوقامد 300 ملغ كبسولات

المادة الفعالة:

Pregabalin 25, 50, 75, 150, 300 mg

پریچبالین 25، 50، 75، 150، 300 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك، لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للعلاج لدى أطفال ومرافقين دون عمر 18 سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لمعالجة ألم عصبي المنشأ (إعتلال عصبي) لدى الكبار، لمعالجة الألم العضلي الليفي (ألم عضلي ليفي - Fibromyalgia) ولعلاج اضطراب القلق المعمم لدى الكبار.

الفصيلة العلاجية:

قرين للحمض جاما أمينوبوتيريك (gamma-aminobutyric acid)

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

توجه لطبيبك قبل تناول الدواء:

- لقد بلغ بعض المرضى الذين يتناولون پریچبالین اینوقامد عن حدوث أعراض تحسسية. هذه الأعراض تشمل حدوث إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان وفي البلعوم وكذلك طفح جلدي منتشر. إذا قاسيت من واحد أو أكثر من تلك الأعراض، عليك التوجه فوراً للطبيب.
- بلغ عن طفح جلدي خطير، مثل متلازمة ستيفنس - جونسون وإنحلال البشرة النخري السمي، بخصوص استعمال پریچبالین اینوقامد. يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا قاسيت من واحد أو أكثر من الأعراض المتعلقة بالأعراض الجلدية الخطيرة الموصوفة في الفقرة 4.
- قد يسبب الدواء دوارة ونعاساً، بحيث يكون المرضى الكبار الذين يتناولون المستحضر معرضين لخطورة أكبر لحدوث سقوطات وإصابات. يجب توخي الحذر إلى أن تعود على تأثير الدواء عليك.
- قد يسبب الدواء تشوش أو فقدان الرؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية، التي يزول أغلبها - يجب إبلاغ الطبيب على الفور عن أي تغيير يطرأ على الرؤية.
- لدى بعض مرضى السكري، الذين يزداد وزنهم نتيجة العلاج بالمستحضر، من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة الجرعة الدوائية للأدوية الخافضة لنسبة السكر بالدم.
- أعراض جانبية معينة، مثل النعاس، يمكن أن تكون أكثر شيوعاً، لأن المرضى الذين يعانون من إصابة بالعمود الفقري من شأنهم أن يتناولوا أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبية مشابهة لتلك الخاصة بـ پریچبالین اینوقامد ويمكن أن تزداد خطورتها عند تناولها سوياً.
- لقد بلغ لدى بعض المرضى الذين تناولوا پریچبالین اینوقامد عن حدوث فشل قلبي، خاصة لدى الكبار الذين يعانون من أمراض في القلب والأوعية الدموية.
- قبل بدء استعمال الدواء، يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض في القلب.
- هناك عدة تقارير عن حدوث فشل كلوي على خلفية العلاج بـ پریچبالین اینوقامد. إذا كنت تلاحظ أثناء العلاج بالدواء بقلة التبول، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك، لأن من شأن التوقف عن العلاج بالدواء أن يؤدي لتحسن.
- لدى بعض المتعالجين، الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع مثل پریچبالین اینوقامد، بُلغ عن أفكار لإيذاء الذات أو أفكار إنتحارية أو أبدو سلوكاً إنتحارياً. في حال ظهور أفكار أو سلوك من هذا النوع في أي مرحلة، يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.
- إن مشاركة پریچبالین اینوقامد مع أدوية أخرى (مثل أنواع معينة من مسكنات الألم) التي من شأنها أن تسبب الإمساك، قد يؤدي لحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل: إمساك، إندساد أو شلل الأمعاء). يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني من إمساك، خاصة إذا وُجد ميل لحدوث إمساك.
- قبل بدء استعمال الدواء، يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من التعلق أو الإدمان على المشروبات الروحية، المخدرات أو على أدوية أيا كانت. في مثل هذه الحالة فمن الجائز أنك معرض لإحتمال أكبر بأن يتطور لدى تعلق بـ پریچبالین اینوقامد.
- قد تظهر تشنجات خلال استعمال الدواء أو حالاً بعد إيقافه - يجب إبلاغ الطبيب في الحال إذا كنت تعاني من تشنجات.
- بُلغ لدى عدد من المرضى الذين لديهم أمراض خلفية إضافية عن حدوث إنخفاض في الأداء الوظيفي الدماغي (encephalopathy). يجب إبلاغ الطبيب فيما إذا كنت تعلم بوجود حالة طبية لها أبعاد ملحوظة، بما في ذلك أمراض الكبد أو الكلى.
- هناك تقارير عن صعوبات في التنفس. إذا وُجدت لديك اضطرابات في الجهاز العصبي، اضطرابات في التنفس، خلل كلوي أو إذا تجاوزت عمر 65 سنة، من الجائز أن يصف لك الطبيب نظاماً آخرًا للجرعة الدوائية. إستشر الطبيب إذا وُجدت لديك صعوبة في التنفس أو تنفس سطحي.

تعلق

يتطور لدى بعض الأشخاص تعلق بـ پریچبالین اینوقامد (الحاجة لمواصلة تناول الدواء). قد تتطور لديهم أعراض فطام عند التوقف عن استعمال پریچبالین اینوقامد (أنظر الفقرة 3 "كيفية استعمال الدواء؟" و- "إذا توقفت عن تناول الدواء"). إذا وُجد تخوف بأنه قد يتطور لديك تعلق بـ پریچبالین اینوقامد، فمن المهم أن تستشير الطبيب.

إذا لاحظت إحدى العلامات التالية أثناء تناوكل بـ پریچبالین اینوقامد، فقد تكون تلك علامة بأنه تطور لديك تعلق:

- تحتاج إلى تناول الدواء لفترة زمنية أطول من تلك التي وُصفت لك
 - تشعر أنك بحاجة إلى تناول جرعة دوائية أكبر مما وُصف من أجلك
 - كنت تستعمل الدواء لدواعي تختلف عن تلك التي من أجلها وُصف لك
 - كانت لديك محاولات متكررة وغير ناجحة للتوقف أو السيطرة على استعمال الدواء
 - عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بسوء، وتشعر بتحسن بعد معاودة تناول الدواء
- إذا لاحظت أية علامة من تلك العلامات، توجه إلى الطبيب وإستشره بخصوص العلاج الأمثل من أجلك، بما في ذلك متى يجب التوقف عن تناول الدواء وكيف تفعل ذلك بشكل آمن.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

قد يكون لـ پریچبالین اینوقامد ولأدوية معينة أخرى تأثيرات متبادلة على الفعالية. إذا تم تناول پریچبالین اینوقامد بالتزامن مع أدوية معينة ذات تأثير مهدئ (بما في ذلك الأفيونات)، فإن پریچبالین اینوقامد قد يزيد من هذه التأثيرات ويؤدي إلى فشل تنفسي، سبات (coma) وإلى الوفاة. إن حدة الدوار، الميل للنعاس وتدني التركيز قد تزداد إذا تم تناول پریچبالین اینوقامد بالتزامن مع:

أوكسيكودون - دواء لتسكين الألم

لورازيبام - دواء لعلاج القلق

الكحول

بالإمكان تناول پریچبالین اینوقامد مع أقراص منع الحمل.

استعمال پریچبالین اینوقامد والطعام

بالإمكان تناول الدواء بدون علاقة لوجبات الطعام.

استعمال پریچبالین اینوقامد وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول خلال فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يجوز استعمال پریچبالین اینوقامد خلال فترة الحمل أو فترة الرضاعة، إلا بتعليمات من الطبيب وبعد إستشارته. إن إستعمال پریچبالین خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل قد يؤدي إلى عيوب خلقية لدى الجنين والتي تتطلب علاجاً طبياً. في بحث الذي إستعرض معطيات لدى نساء من البلدان النوردية اللواتي تناولن پریچبالین خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، فإن 6 رضع من بين 100 عانوا من مثل هذه العيوب الخلقية. وذلك مقارنة بـ 4 رضع من بين 100 الذين ولدوا لنساء لم يتعالجن بـ پریچبالین في البحث. بلغ عن عيوب في الوجه (إنتشاقات في الوجه والفم)، في العينين، في الجهاز العصبي (بما في ذلك الدماغ)، في الكلى وفي الأعضاء التناسلية. يتوجب على النساء اللواتي من شأنهن الحمل أثناء العلاج بإستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل. إذا كنت حامل أو مرضعة، إذا كان هناك شك بأنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات الخطرة إلى أن تعرف كيفية تأثير الدواء عليك، لأن إستعمال هذا الدواء قد يؤدي إلى دوار، نعاس أو تناقص التركيز.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في الكبسولة وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها!

يجب بلع الكبسولة بشكلها الكامل. يمنع فتح وبعثرة محتوى الكبسولة، لأن هذه الأشكال من الإعطاء لم تفحص. يجب بلع الدواء مع الماء. إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. قد تشعر بميل إلى النوم، مرتبك، قلق أو قليل الراحة نتيجة تناول جرعة دوائية مفرطة من پریچبالین اینوقامد. كذلك بلغ عن نوبات تشنج (إختلاجات) وفقدان الوعي (سبات).

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب

من المهم تناول الدواء كل يوم في ساعة محددة. إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إذا تم التقرير بإيقاف العلاج، فسوف يشرح لك الطبيب كيفية فعل ذلك. إن التوقف عن العلاج بالدواء يجب أن يكون تدريجياً، خلال فترة أسبوع على الأقل.

بعد التوقف عن العلاج بالدواء (سواء كان علاجاً طويلاً أو قصيراً الأمد) فمن الجائز أن تقاسي من أعراض معينة تسمى أعراض الفطام. هذه الأعراض تشمل: أرق، صداع، غثيان، قلق، أعراض تشبه الإنفلونزا، تشنجات، عصبية، إكتئاب، آلام، دوار، تعرق وإسهال. من شأن تلك الأعراض أن تكون أكثر شيوعاً وخطورة، كلما تم تناول الدواء خلال فترة أطول. يجب التوجه إلى الطبيب، إذا قاسيت من أعراض الفطام.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية **في كل مرة** تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال بريجبالين إينوقامد قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا عانيت من إنتفاخ في الوجه أو في اللسان أو من رد فعل جلدي خطير (إحمرار الجلد واكتسائه بحويصلات أو حدوث تقشر).

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) – تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة وهي:

- دوار، الشعور بنعاس، صداع.
- شعور بزيادة للطعام.
- شعور بمعنويات عالية، إرتباك، توهان، تناقص الرغبة الجنسية، عصبية.
- إضطراب في التركيز أو في الذاكرة، فقدان الذاكرة، بلاهة، رجفان، إضطراب في النطق، شعور بوخز، خدر/فتور في الإحساس، تهدئة (sedation)، نوام، أرق، إرهاق، شعور غريب.
- تشوش الرؤية، رؤية مزدوجة.
- دوار (فيرتيغو)، إضطرابات في التوازن، سقوطات.
- جفاف في الفم، إمساك، تقيؤات، غازات، إسهال، غثيان، إنتفاخ البطن.
- مشاكل في إنتصاب القضيب الذكري.
- إنتفاخ الجسم، يشمل الأطراف.
- الشعور بثقل، أسلوب مشي شاذ.
- زيادة في الوزن.
- تقلصات عضلية، ألم في المفاصل، آلام في الظهر والأطراف.
- ألم في الحنجرة.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100:

- فقدان الشهية للطعام، تناقص الوزن، إنخفاض نسبة السكر في الدم، إرتفاع نسبة السكر في الدم.
- تغير النظرة إلى الذات، قلة هدوء، إكتئاب، قلق، تغيرات في المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، هلوسة، أحلام غريبة، نوبات من الهلع، لا مبالة، عدوانية، مزاج مرهف، إضطراب نفسي، صعوبة في التفكير، زيادة الرغبة الجنسية، مشاكل في الأداء الوظيفي الجنسي، بما في ذلك عدم القدرة على بلوغ الذروة الجنسية، تأخر القذف.
- تغيرات في الرؤية بما في ذلك فقدان الرؤية المحيطية، ترقص العينين، ومضات من الضوء، حركات قفزية، تناقص الإستجابة للمنعكسات، نشاط، دوار عند الوقوف، حساسية جلدية، فقدان المذاق، الشعور بحرق، رجفان أثناء الحركة، تدني مستوى الوعي، فقدان الوعي، إغماء، زيادة الحساسية للضحيج، الشعور بوعة.
- جفاف العينين، إنتفاخ أو ألم في العين، ضعف العينين، تدمع العينين، تهيج العين.
- إضطرابات في نظم القلب، زيادة نظم القلب، إنخفاض أو إرتفاع ضغط الدم، تغيرات في النبض، فشل قلبي.
- تورد، هبات من الحر.
- صعوبة في التنفس، جفاف في الأنف، إنسداد الأنف.
- زيادة إنتاج اللعاب، حرقان، خدر من حول الفم.
- تعرق، طفح، قشعريرة، سخونة.
- تشنجات عضلية، إنتفاخ المفاصل، تصلب العضلات، ألم يشمل ألم عضلي، ألم في العنق.
- ألم في الثديين.
- صعوبة أو ألم أثناء التبول، سلس بولي.
- ضعف، عطش، ضغط في الصدر.
- تغيرات في فحوص الدم ووظائف الكبد (إرتفاع الكرياتين فوسفوكيناز في الدم، إرتفاع إنزيمات الكبد، إنخفاض الصفائح الدموية، قلة العدلات، إرتفاع الكرياتينين في الدم، إنخفاض البوتاسيوم في الدم).
- حساسية زائدة، إنتفاخ الوجه، حكة، شرى، رشح، رعاف، سعال، شخير.
- آلام بالدورة الشهرية.
- برودة اليدين والرجلين.

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000:

- شذوذ بحاسة الشم، إهتزاز في الرؤية، تغير في إدراك العمق، سطوع بصري، فقدان الرؤية.
- توسع الحدقتين، حَوْل.
- تعرق بارد، تهيج في الحنجرة، إنتفاخ اللسان.
- إلتهاب البنكرياس.
- صعوبة في البلع.
- تباطؤ أو تناقص حركات الجسم.
- صعوبة في الكتابة.
- وذمات في منطقة البطن.
- سوائل في الرئتين.
- تشنجات.
- تغيرات في التخطيط الكهربائي للقلب تطابق إضطرابات نظم القلب.
- تضمر العضل.
- إفراز من الثديين، تضخم شان للثديين، تضخم الثديين لدى الرجال.
- إضطرابات في الدورة الشهرية.
- فشل كلوي، تناقص حجم البول، إحتباس البول.
- تناقص تعداد خلايا الدم البيضاء في فحوص الدم.
- سلوك شاذ، سلوك إنتحاري، أفكار إنتحارية.
- ردود فعل تحسسية (يمكن أن تتجلى بـ: صعوبات في التنفس، إلتهاب العينين [إلتهاب القرنية]، وردود فعل جلدية خطيرة التي تتميز ببقع دائرية، مائلة للون الأحمر، غير بارزة في منطقة جذع الجسم، التي تترافق أحياناً بحويصلات في وسطها، تقشر الجلد، تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية والعينين. يمكن أن تكون لهذه الأعراض الجلدية الخطيرة أعراض مسبقة، مثل سخونة وأعراض شبيهة بالإنفلونزا [متلازمة ستيفنس – جونسون، إتحلال البشرة النخري السمي]).
- يرقان (إصفرار الجلد وبياض العينين).
- الباراكينسونية، أي أعراض تشبه مرض الباراكينسون مثل: إرتجاف، بطء الحركة (إنخفاض في القدرة على الحركة) وتصلب (تصلب العضلات).

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10,000:

- فشل كلبي.
- إلتهاب كبد (Hepatitis).

أعراض جانبية شيوها غير معروف (أعراض شيوها لم يحدد بعد):

- تطور تعلق بـ بريجبالين إينوقامد
- بعد التوقف عن العلاج بـ بريجبالين إينوقامد (سواء كان علاجاً طويلاً أو قصيراً الأمد) فمن الجائز أن تقاسي من أعراض معينة تسمى أعراض الفطام. (أنظر "إذا توقفت عن تناول الدواء").

أعراض جانبية معينة، مثل النعاس، يمكن أن تكون أكثر شيوعاً، لأن المرضى الذين يعانون من إصابة بالعمود الفقري من شأنهم أن يتناولوا أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبية مشابهة لتلك الخاصة بـ بريجبالين إينوقامد ويمكن أن تزداد خطورتها عند تناولها سوية.

الأعراض الجانبية التالية بُلغ عنها بعد تسويق الدواء: صعوبة في التنفس وتنفس سطحي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Starch pregelatinized (maize), Talc, Gelatin, Purified water, Titanium dioxide (E 171), Sodium lauryl sulfate.

Iron oxide red (E 172)

تحتوي كبسولات بريجبالين إينوقامد 75 ملغ و- 300 ملغ أيضاً على:

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

- بريجبالين إينوقامد 25 ملغ – كبسولة بلون أبيض قاتم، مطبوع على الغطاء 'PG' ومطبوع على جسم الكبسولة '25'.
- بريجبالين إينوقامد 50 ملغ – كبسولة بلون أبيض قاتم، مطبوع على الغطاء 'PG' ومطبوع على جسم الكبسولة '50'.
- بريجبالين إينوقامد 75 ملغ – كبسولة بلون أحمر/أبيض قاتم، مطبوع على الغطاء 'PG' ومطبوع على جسم الكبسولة '75'.
- بريجبالين إينوقامد 150 ملغ – كبسولة بلون أبيض قاتم، مطبوع على الغطاء 'PG' ومطبوع على جسم الكبسولة '150'.
- بريجبالين إينوقامد 300 ملغ – كبسولة بلون أحمر/أبيض قاتم، مطبوع على الغطاء 'PG' ومطبوع على جسم الكبسولة '300'.

حجم العبوة: يتوفر الدواء ضمن عبوة كما هو مفصل:

علب كرتون تحتوي 4 لويحات/بليسترات ذات 14 كبسولة، بالإجمال 56 كبسولة ضمن عبوة الكرتون. يظهر على عبوة الكرتون عدد

الكبسولات.

صاحب الإمتياز وعنوانه: إينوقامد م.ض، شارع بئير جنيم 55، ص.ب. 62، إيفن يهودا 40500.

إسم المنتج وعنوانه: إينتاس فارماسيوتيكالس م.ض، أحمد آباد، غوجارات، الهند.

تم إعدادها في تشرين الثاني 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

بريجبالين إينوقامد 25 ملغ – 156-14-34772

بريجبالين إينوقامد 50 ملغ – 156-15-34726

بريجبالين إينوقامد 75 ملغ – 156-16-34773

بريجبالين إينوقامد 150 ملغ – 156-17-34774

بريجبالين إينوقامد 300 ملغ – 156-18-34738

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.