


كامزيوس® (مافاكامتن)

دليل المتعالج

 Bristol Myers Squibb™

تمت المصادقة على هذا الدليل ومحتواه من قبل وزارة الصحة في شباط 2023
3500-IL-2300005 01/23

مقدمة

لقد تُلقيت **الدليل للمتعالج** هذا لأن الطبيب وصف لك كامزيوس®. كامزيوس® هو دواء للقلب بوصفة طبية فقط، يستعمل لعلاج البالغين المصابين باعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM) الانسدادي المصحوب بأعراض (مرض عضلة القلب).

يحتوي **الدليل للمتعالج** على بطاقة معلومات للمتعالج. **احمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات.** أخبر أي فرد من أفراد الطاقم الطبي تقابله أنك تتعالج بـ كامزيوس®. تحتوي **بطاقة المعلومات للمتعالج** على معلومات حول المخاطر الرئيسية لـ كامزيوس® وكذلك، على تفاصيل للاتصال بالطبيب الذي وصف الوصفة الطبية.

CAMZYOS® (mavacamten)
بطاقة معلومات للمتعالج

يرجى الحرص على قراءة صفحة المعلومات للمتعالج لهذا الدواء، والتي توفر مزيداً من المعلومات حول كامزيوس®. إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، يرجى التوجه إلى الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية، الطبيب المعالج أو الصيدلي.

ما هو اعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM) الانسدادي العرضي؟

يسبب اعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM) سماكة وتصلب جدار عضلة القلب. هذا الأمر يجعل من الصعب على القلب أن يمتلئ بالدم. لدى بعض المرضى الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب الضخامي، تصبح عضلة القلب سميكة لدرجة أن قدرة الدم على التدفق من القلب إلى بقية الجسم تقل أو يتم إعاقتها تماماً.

❓ كيف يعمل كامزيوس®؟

يعمل كامزيوس® عن طريق تقليل الانقباض المفرط للقلب وتقليل انسداد تدفق الدم إلى الجسم.

نتيجة لذلك، من شأن كامزيوس® أن يحسن أعراضك وقدرتك على أن تكون نشطا.

ما هي فحوصات مخططات صدى القلب (إيكو القلب) ولماذا هي مهمة؟
ستساعد فحوصات مخطط صدى القلب (إيكو القلب) المنتظمة الطبيب المعالج على تقييم كيفية تأثير كامزيوس® على قلبك.

مخطط صدى القلب هو فحص يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور للقلب. تساعد هذه الفحوصات الطبيب المعالج على فهم كيفية استجابة قلبك للعلاج والتأكد من أنك تتناول الجرعة المثلى. بناء على نتائج مخطط صدى القلب، من شأن الطبيب المعالج أن يزيد، يخفض أو لا يغير على الإطلاق من جرعة كامزيوس® التي تتناولها. من شأن الطبيب المعالج أيضا أن يؤجل أو يوقف العلاج تماما. سيتم إجراء أول مخطط صدى للقلب قبل بدء العلاج بـ كامزيوس®. سيتم إجراء تخطيط صدى القلب للمتابعة بعد 4، 8، و- 12 أسبوعا من تناول الجرعة الأولى من كامزيوس® ومن ثم كل 12 أسبوعا.

سيكون عليك إجراء فحوصات تخطيط صدى القلب، وفقا لتعليمات الطبيب المعالج، وأيضا إذا طرأ تغيير في جرعة كامزيوس® التي تتناولها أو إذا طرأ تغيير في جرعة دواء آخر تتناوله.

⚠ معلومات السلامة الهامة

هناك 3 مخاطر رئيسية متعلقة بالعلاج بـ كامزيوس®:

- قصور القلب بسبب ضعف الوظيفة الانقباضية، حالة يكون فيها القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم إلى بقية أجزاء الجسم
- قصور القلب نتيجة لتفاعل مع بعض الأدوية أو المكملات النباتية
- سمية الجنين

يرد ذكر الأعراض الجانبية الإضافية المحتملة المتعلقة بالعلاج بـ كامزيوس® في صفحة المعلومات للمعالج.

كامزيوس® وقصور القلب

قصور القلب بسبب ضعف الوظيفة الانقباضية هو حالة طبية خطيرة وأحيانا تهدد الحياة. قم فورا بإبلاغ الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية أو الطبيب المعالج أو توجه على الفور لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تطور أعراضا جديدة لقصور قلبي أو إذا طرأ تفاقم على الأعراض الموجودة، بما في ذلك ضيق التنفس، آلام في الصدر، الإنهاك، الشعور بضربات القلب (الخفقان)، تورم الرجل أو زيادة سريعة في الوزن.

قبل وأثناء العلاج بـ كامزيوس®، أخبر الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية أو الطبيب المعالج عن أي حالة طبية جديدة أو موجودة لديك. يمكن أن تؤثر بعض الحالات الطبية، مثل حالات العدوى أو الرجفان الأذيني (وتيرة قلب سريعة وغير منتظمة) على العلاج بـ كامزيوس®.

من المهم تنسيق موعد مسبق والحرص على القدوم إلى فحوصات مخطط صدى القلب بموجب ما أملى به عليك الطبيب من تعليمات. استعن بتذكيرات على الهاتف أو بالمفكرة اليومية لتتذكر التاريخ والساعة لفحوصات مخطط صدى القلب الخاص بك.



معلومات السلامة الهامة (متابعة)

الجدول 1: أمثلة على الأدوية والمستحضرات التي قد تؤثر في كامزيوس®

دواء / مستحضر	للاستعمال في الحالة الطبية التالية:
أوميبرازول، إزوميبرازول سيميتيدين	قرحة المعدة والحرقة (الارتجاع)
كلاريثروميسين، ريفامبيسين	حالات عدوى بكتيرية
فيرپاميل، ديلتيازام	حالات قلبية
فلوكونازول، إيتراكونازول، كيٲوكونازول، فوساكونازول، فريكونازول	حالات عدوى فطرية
فلوكسيتين، فلوقسامين	اكتئاب
ريتونافير، كوبيسيستات	فيروس الإيدز (HIV)
تيلرڤير	التهاب الكبد من نوع C
عصير جريب فروت	

كامزيوس® وردود الفعل بين الأدوية يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية وبعض المكملات النباتية، في مستويات كامزيوس® في الجسم وقد تزيد من خطر الإصابة بقصور قلبي بسبب ضعف الوظيفة الانقباضية. أبلغ الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية، الطبيب المعالج أو الصيدلي عن جميع الأدوية بوصفة طبية التي تتناولها، كما أيضا عن الأدوية بدون وصفة طبية، الفيتامينات والمكملات النباتية، حتى لو كنت لا تتناولها يوميا. لا تبدأ علاجاً بدواء أو بمكمل نباتي ولا تتوقف عن علاج أو تقوم بتغيير جرعة دواء أو مكمل نباتي خاص بك تتناوله في الوقت الحالي دون استشارة الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية، الطبيب المعالج أو الصيدلي.

يمكن العثور على أمثلة لأدوية ومستحضرات قد تؤثر في مستويات كامزيوس® في جسمك في الجدول 1. يرجى الملاحظة، أن الأمثلة تستخدم للشرح ولا تشكل قائمة شاملة بجميع الأدوية المحتملة التي قد تتناسب مع هذه الفئة.

معلومات السلامة الهامة (متابعة) ⚠️

كامزيوس® وسمية الجنين

يُمنع تناول كامزيوس® إذا كنت حاملا أو إذا كنت تستطعين الحمل ولا تستعملين وسيلة ناجعة لمنع الحمل (وسيلة منع)، لأن كامزيوس® يمكن أن يسبب ضررا للجنين.

إذا كنت امرأة قادرة على الحمل، فسيطلب منك تقديم اختبار حمل سلبي قبل بدء العلاج بـ كامزيوس®. يجب عليك استخدام وسيلة منع ناجعة أثناء العلاج ولمدة 4 أشهر بعد تناول آخر جرعة من كامزيوس®.

قد يقلل كامزيوس® من نجاعة وسائل المنع الهرمونية. عليك استشارة الطبيب المعالج حول أنسب وسائل لمنع الحمل لك.

أخبري الطبيب المعالج إذا كنت تفكرين في الحمل. كذلك، أخبري الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية أو الطبيب المعالج على الفور إذا حملت أو كنت تعتقدين أنه من المحتمل أنك أصبحت حاملا أثناء العلاج بـ كامزيوس®. سيتحدث الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية أو الطبيب المعالج معك حول خيارات العلاج.

متى يجب أن أتوجه لطلب مساعدة طبية؟ 🧑🏻

أخبر أي فرد من أفراد الطاقم الطبي تأتي إليه إذا كنت تطور عارضا جانبيا أيا كان أثناء تناول كامزيوس®، وكذلك عن أعراض جانبية لم يتم ذكرها في الدليل للمتعالج هذا.

يمكن العثور على معلومات عن الأعراض الجانبية المحتملة وكيفية الإبلاغ عنها في صفحة المعلومات للمتعالج.

يساعد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة في جمع معلومات سلامة إضافية حول المستحضر.

يمكن الإبلاغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة:

[www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il) أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

قم فورا بإبلاغ الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية أو الطبيب المعالج أو توجه على الفور لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تطور أعراضا جديدة لقصور قلبي أو إذا طرأ تفاقم على الأعراض الموجودة، بما في ذلك ضيق التنفس، آلام في الصدر، الإنهاك، الشعور بضربات القلب (الخفقان)، تورم الرجل أو زيادة سريعة في الوزن.

معلومات إضافية 📞

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن كامزيوس®، فيرجى التوجه الى الطبيب الذي وصف الوصفة الطبية، الطبيب المعالج، الصيدلي أو أي فرد آخر من أفراد الطاقم الطبي الذي يعالجك.

لمزيد من المعلومات أو للإبلاغ عن أعراض جانبية، يرجى الاتصال بشركة BMS:

الهاتف: 1809-388054 (مكالمة مجانية)

البريد الإلكتروني: medinfo.israel@bms.com

للحصول على نسخ إضافية من هذا الكتيب (وعلى بطاقة المعلومات المرفقة به) يرجى

الاتصال مع شركة بريستول مايرز سكويب إسرائيل

عبر الهاتف 03-5231021 أو الفاكس: 03-9226896

تمت المصادقة على هذا الدليل ومحتواه من قبل وزارة الصحة في شباط 2023

تمت المصادقة على هذا الدليل ومحتواه من قبل وزارة الصحة في شباط 2023
3500-IL-2300005 01/23