

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הוטרינרית, צורתה וחוזקה

**מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי**

גרנולות להגשה במזון בעלי החיים

2. חומרים פעילים:

נרסין Narasin 80g/Kg  
ניקרביזין Nicarbazine 80g/Kg

3. למה מיועדת התרופה

תוספת לתערובת מזון למניעת מחלת הקוקסידיוזיס הנגרמת ע"י אימיריות (Eimerias) הרגישות לתרופה, בתרנגולות פיתום.

קבוצה תרפויטית:

קוקסידיוסטטים

4. התוויות נגד:

אין להשתמש במקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי בתערובת להאכלת תרנגולי הודו, בזני עופות אחרים, ובארנבות. התכשיר מסוכן לתרנגולי הודו וארנבות.

- התכשיר אסור לשימוש בסוסים, שכן השימוש בו עשוי להיות קטלני!
- יש למנוע בהחלט גישה של סוסים, פרדות, חמורים ובעלי חיים אחרים ממשפחת הסוסיים לתערובת מזון המכילה מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי.
- אין להשתמש בתכשיר בתרנגולות מטילות.

5. תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" ( המפנה [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ) לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן, או כל השפעה שאינה מוזכרת בעלון, או שאתה חושב שהתרופה לא פעלה, אנא יידע את הווטרינר.

6. חייט מטרה

תרנגולי פטם.

## 7. אופן המתן והמינון

מתן במזון לתרנגולי פטם:

תערובת מזון בק"ג	מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי משקל בק"ג	ריכוז רצוי בתערובת להגשה Narasin: Nicarbazin
999.500 kg	0.500 kg	40 ppm: 40 ppm
999.375 kg	0.625 kg	50 ppm: 50 ppm

## 8. אופן השימוש בתכשיר

יש להקפיד לערבב את מקסיבן G160 עם תוסף מינרלי או עם רכיב אחר מתערובת המזון לפני הכנת התערובת, כדי להבטיח פיזור אחיד בתערובת הסופית.

## 9. זמן המתנה.

ניתן להמשיך בטיפול עד השחיטה. לא נדרשת תקופת המתנה לפני השחיטה.

## 10. אזהרות

אזהרות מיוחדות הנוגעות לטיפול בתרנגולי פטם:

בעת הטיפול עלולות תרנגולות לפיטום לפתח רגישות לחום. יש לדאוג לאוורור נאות ולמי שתייה, ולהימנע מחמום ומלחות יתר.

## תגובות בין תרופתיות:

- אין להשתמש בתכשירים המכילים תיאמולין (Tiamulin) וטרולאנדומיצין (Troleandomycin), אלא מתום 7 ימים מסוף הטיפול ב **מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי**. יש להמתין 7 ימים לפני השימוש ב**מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי** ולא להשתמש בתיאמולין וטרולאנדומיצין בתקופה זו מחשש לעיכובי גדילה חמורים ואף תמותה.
  - קיימת המלצה שלא להשתמש בקבוצות החומרים: יונפורים, סולפונאמידים, ארתירומיצין ופורלטדון ביחד עם **מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי** עקב תגובות לא רצויות.
  - אין להשתמש ב**מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי** בו זמנית עם קוקסידיוסטט אחר.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר.

- בעת ערבוב **מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי**, יש להקפיד ללבוש בגדי-מגן, כפפות ומסכת אבק.
- לאחר גמר ההכנה, יש לרחוץ היטב במים ובסבון.
- אם במקרה חדר החומר לעיניים, יש לשטוף העיניים **מייד** במים זורמים.

## 11. הוראות אחסון

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו.או תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעלה  
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן בטמפרטורת החדר מתחת ל-25°C.

## 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר / שאריות התכשיר בתום השימוש.

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב".

### **13. מידע נוסף**

התכשיר ארוז בשק נייר ופולי אתילן רב שכבתי המכיל גרנולות של חלקיקים בצבע צהוב וחום – אפור.

בנוסף לחומרים הפעילים התכשיר מכיל גם: Anti-dusting oil, Microtracer f-red, Rice hulls

**משקל נטו: 25 ק"ג**

**מספר רישום התרופה: 079-98-92087-00**

**היצרן:**

Elanco Clinton Laboratories, POB 99, 10500 South State Road 63,  
Clinton, Indiana 47842-0099, USA.

**בעל הרישום:**

יורומר בע"מ, ת.ד. 1064, רמת השרון 47110.  
נערך בפברואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.