

تاقانين أقراص 500 ملغ أقراص مطالية

بما في ذلك ليقوفلوكاساسين، إذا قايسية في الماضي من أي عرض جانبي خظير عند تناول كوبينولون أو فلوروكونيولون. في هذه الحالة، عليك إبلاغ الطبيب باسرع ما يمكن.

عندما تتناول الدواء:

- إذا كنت تشعر بآلام مفاجئة وشديدة في البطن، في الصدر أو في الظهر لديك، التي يمكن أن تكون أعراض لأم الدم الأبهري وتسلخ الأبهر (ترمز)، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ. قد تزداد الخطورة لديك إذا كنت تعالج بكورتيكوسستيرويدات جهازية (systemic).
- إذا بدأت قسايسى من إنذارات سريعة في التنفس، خاصة عندما تضطجع بشكل كامل على سريرك، أو إذا كنت تلاحظ انتفاخ في الكاحلين، في الرجلين أو في البطن أو ظهور جديد لضربات القلب (الشعور بنبض سريع أو غير منظم) - عليك إبلاغ الطبيب فوراً.

إذا شعرت بغثيان، شعور عام سيء، إنزعاج شديد أو ألم مستمر أو ينقاوم في منطقة المعدة أو تقيي - توجه فوراً إلى طبيب حالاً لأن ذلك قد يكون علامة لالتهاب في المفاصل (التهاب حاد في الينكرياس).

ألم وإنفاس في المفاصل والتهاب أو تمزق في الأوتار قد تظهر في أوقات نادرة.

تزياد الخطورة لديك إذا كنت مسناً (تجاوزت عمر 60 سنة). اجترت رعاية أعضاء، تعانى من مشاكل في الكلى أو إذا كنت مسناً بكورتيكوسستيرويدات. قد يحدث التهاب وتمزق في الأوتار خلال 48 ساعة الأولى من العلاج لأن حتى عدة أشهر بعد التوقف عن العلاج - تاقانين، عند العلاوة الأولى للأم أو الالتهاب في الورت (مثلًا في كاحل)، في رسغك، في المرفق، الكتف أو الركبة، توفر عن تناول تاقانين، إصابة بطيء وآخر منخفضة العدة، تجنب أي شاطئ بدني غير ضروري لأن هذا الأمر قد يزيد من خطورة حدوث تمزق في الورت.

قد تقاسى في أوقات متعددة من أعراض ضرر عصبي (اعتلال عصبي مثل ألم، حرق، وخز، خدر / أو ضعف، خاصة في راحتي القدمين والرجلين أو في اليدين والذراعين. إذا حدث هذا الأمر، توفر عن تناول تاقانين وبلغ الطبيب بشكل فوري، من أجل منع تطور حالة التي قد تكون غير قابلة للعكس.

أعراض جانبية خطيرة مطلوبة، تسبب العجز والتي قد تكون غير قابلة للعكس

أدوية مضادة للجراثيم من نوع فلوروكونيولون / كوبينولون، بما في ذلك تاقانين، ترتبط بأعراض جانبية نادرة جداً لكنها خطيرة، بعضها طول الأبد (التي تستمر أشهر أو سنوات)، حيث يسبب العجز أو قد يكون غير قابل للعكس. يشمل الأمر الأم في الأوتار، العضلات ومفاصل الأطراف العلوية والسفلية، صافية في المشي وأحساس شدة التي توصف كخذ الدبابيس والبر، وخز، دغدغة، فقر، أو حرق (paraesthesia)، إضطرابات حسية بما في ذلك حلل في الوربة، في حاسة التفرق والشن، والسعين، اكتئاب، خلل في الذاكرة، إرهاق شديد وإضطرابات شديدة في النوم.

إذا قايسية من إحدى تلك الأعراض الجانبية بعد تناول تاقانين، توجه لطبيب قبل مواعيد العلاج. تقدر أنت وطبيبك حول مواصلة العلاج مع الأخذ بين الإعتبار أيضًا إمكانية تناول مضادات حيوية من مجموعة أخرى.

أدوية من فصيلة الـ "فلوروكونيولونات"، بما في ذلك تاقانين، قد تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الوهن العضلي الوبييل مثل تفاقم ضعف العضلات أو مشاكل في التنفس - إذا شعرت بهذه الأعراض توفر للطبيب فوراً.

إذا لم تكن تائثًا فيما إذا كانت إحدى هذه الحالات المذكورة أعلاه تتفطب عليك، توجه للطبيب أو الصيدلي قبل تناول تاقانين.

الأطفال والمرأهقون

الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهقين.

التضالعات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مثواً آخر، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب، بعضها طول الأبد من تاقانين قد يؤثر على عمل أدوية أخرى أو الصيدلي عن ذلك، ذلك لأن يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخضر إذا كنت تتناول الأدوية التالية، نظرًا لأن المشارة تناول تاقانين يمكن أن تزيد احتمال حدوث أعراض جانبية:

• كورتيكوسستيرويدات، تسمى أحياناً ستيرويدات، - تستخدم لعلاج الالتهابات، قد تكون معرض لخطورة أكبر حدوث التهابات، قد تكون أفالج، أو تمزق في الأوتار.

• وارفارين - يستعمل لتبييع الدم، قد تكون معرض لخطورة أكبر لظهور نزف. من الجائز أن يتحسن طبيبك إلى توجيهك لإجراء فحوص دم منتظمة، لفحص قابلية تحترم الدم لديك.

• ثيو فيليلين - يستعمل لمشاكل في التنفس. قد تكون أكثر عرضة للمعاناة من اختلاج بالإضافة إلى مرض في الأوتار.

• أدوية مضادة للالتهاب لاستيرويدية - المستعملة لحالات الألم والإلتهاب مثل أسيبيرين، أيبوبروفين، فينيبوفين، كيتوبوفين وإندوبيتاسيدين، أنت معرض لاحتقان أكبر، مما يعني من إخراج ديدن التناول سوية مع تاقانين.

• سيكوكسيبوريدين - للإمساك بعد زراعة أمراض، قد تكون معرض لخطورة أكبر للمعاناة من الأعراض الجانبية لـ سيكوكسيبوريدين.

• أدوية التي تؤثر على شكل نضجات القلب، هذه تشمل أدوية لعلاج عدم سلامه نظم القلب (ضاربات الدائمة مثل كوبينولين، هيدروكونيندين، ديسوبوياميد، سوتالول، فوتيناتيل، أيبوتيناتيل وأموبروزون)، أدوية لعلاج الإلتهاب (مضادات الإنكبات مثلية الحلاوة مثل أميريتيلين، أميريتيلين، أميريتيلين)، أدوية لعلاج الإضطرابات النفسية (مضادات الذهان)، أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مضادات حيوية من مجموعة الـ "ماكرولييدات" مثل إيريتريوميسين، أزتيتروبيسين و كلارتيتروبيسين).

• بروبيسبيد - لعلاج القصر، من الجائز أن يعطيك طبيبك مقدارًا دوائيًا أكثر إيقافياً، إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى.

• سيميدترين - لعلاج القرحات في الجهاز الهضمي والحرقان. من الجائز أن يعطيك طبيبك مقدار دوائي أكثر إيقافياً، إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى.

إحكام للطبيب على إدخال العلاج. هذه تشمل أدوية لعلاج المعاña من

أدوية التي تؤثر على عصب الوجه، مثل كوبينولون، جونسون (Z) (إخلال البشرة النخري السمي (TEN)، ومتلازمة دود العقل المفتوحة وأعراض جهازية (DRESS)، وذلك خلال تناول ليقوفلوكاساسين.

فحوص البول للمستحضرات الأفيونية

أثناء استعمال تاقانين، هناك إمكانية لتنقية البول لمستحضرات الأفيونية. إذا تم توجيهك من قبل طبيبك إجراء فحص بول، إحكام للطبيب بأنك تتناول تاقانين.

فحوصات السلل

أثناء إستعمال تاقانين، هناك إمكانية لتلقى نتائج سلبية خطأة في فحوص مخبرية معينة لتقسيي الجراثيم المسيبة للسل.

فحوص السكر

لدى مرضى السكري المعالجين يستحضرات فموية مضادة للسكري أو إنسولين يجب مراقبة نسب السكر في الدم.

استعمال الدواء والطعام

بالماء إستعمال الدواء مع وجية الطعام أو بآبي وقت بين الوجبات.

الحمل والرضاع

لا يجوز إستعمال تاقانين إذا: كنت في فترة الحمل، من شأنك أن تصبحي حامل أو تظنين بذلك حامل.

كنت مرضعة أو تحظين للرضاع.

السيادة واستعمال الماكولات

قد تتعانى من أعراض جانبية بعد تناول هذا الدواء والتي تشمل الشعور بدوران، ميل للنوم، الشعور بدوران (غيرتيفون) أو تغيرات في الوربة. قد تؤثر بعض من هذه الأعراض الجانبية على قدرتك على التركيز وعلى سرعة إستجابتك. إذا حدث هذا الأمر، فلا يجوز السيادة أو القيام بأى نشاطات تتطلب مستوى كبير من الانتباه.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوى هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملخ) في كل قرص، أي أنه يعتبر "خال من الصوديوم".

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
مستحضرات - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

المادة الفعالة: ليقوفلوكاساسين (كـ هيميفيدرات) 500 ملغ Levofloxacin (as hemihydrate) 500 mg

المواد غير الفعالة في المستحضر، أنظر الفقرة 6.

إنقرأ النشرة بتعمق حتى تهاياها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة

إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

قد يختلف هذا الدواء لعلاج، لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء غير مخصص للأطفال أو المرأهقين.

1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

الدواء مخصوص للثاقن، في التلوثات التالية:

• إنثاب حاد في الكلبة وفي حوض الكلبة وتلوثات معدقة في المسالك البولية

• إنثاب جرثومي في غدة الغدد الوريدية، عندما يتمتع التلوث بجهة العلاج بـ "ليقوفلوكاساسين" يجب استعمال تاقانين فعال تمامًا لا يكون من المناسب استعمال مواد أخرى مضادة للجراثيم الموصى بها عادة، لعلاج التلوثات التالية:

• إنثاب حاد في المرض الرونوي الإنترادي المزمن، بما في ذلك إنثاب القصبات الهوائية

• إنثاب الرئتين (من عدو في المجتمع)

• تلوثات معدقة في الجلد والأنسجة الرخوة.

بالإمكان استعمال تاقانين أيضًا لإتمام العلاج لدى مرضى أظهروا تحسن خلال

العلاج الأولي لـ "ليقوفلوكاساسين" بالإعطاء الوريدي.

الفصيلة العلاجية: مضاد حيوي ينتمي إلى فصيلة الـ "فلوروكونيولونات".

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الـ "أليرجي") لـ "ليقوفلوكاساسين" مثل موكسيفلوكاساسين، سيفوفلوكاساسين أو فلوكوكاساسين أو لإحدى المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6).

• علامات فعقة تشمل: طفح، مشاكل في البالع أو في التنفس، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

• كنت تعانى أو تأبى في الماضي من مشاكل في الأوتار مثل التهابات، الورتر يربط بين المضل والعظم.

• كنت طفلًا أو قاصرًا في الماضي من الصرع.

• كنت تعانى أو تأبى في الماضي من علاج بمضاد حيوي من فصيلة الـ "كينولونات".

• كنت حامل، من شأنك أن تصبحي حامل أو تظنين بذلك حامل.

• كنت مرضعة.

لا تتناول الدواء إذا إنطبقت عليه إحدى الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن واثقًا، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول تاقانين.

3. تذبذبات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ تاقانين، إحكام للطبيب إذا:

• كنت بعدر 60 سنة أو أكثر.

• كنت تتناول أدوية من فصيلة الـ "كورتيكوسستيرويدات" التي تسمى أحياناً ستيرويدات (أنظر فقرة "التضالعات بين التفاعلات").

• إنترت زراعة أعضاء

• عانيت ذات مرة من إختلاج من ضرر دماغي جراء سكتة أو إصابة دماغية أخرى.

• لديك مشاكل في الكلى.

كنت تعانى من نقص في الإنزيم glucose-6-phosphate (G6PD) dehydrogenase deficiency

هناك احتمال أكبر بأن تعانى من مشاكل خطيرة في الدم عند تناولك لهذا الدواء.

كنت تعانى أو عانيت في الماضي من مشاكل في الصحة النفسية.

كنت تعانى أو عانيت في الماضي من مشاكل في القلب.

عند تناول هذا الدواء وذلك إذا كنت مع أو ولدت مع أو لديك سبقة عائلية لإطالة QT (الذي يمكن ملاحظتها في فحص التخطيط الكهربائي للقلب).

إذا كنت تعانى من عدم توافق زراعة مخالب في الدم (الخاصة نسبة منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الدم)، إذا كان نظم قلبك يبطي جهاً (سمي "bradycardia"). إذا جد لديك قصور قلبي، إذا قايسية في الماضي من إنتشار في القلب (نوبة قلبية)، إذا كنت إمراة أو مسنة أو إذا كنت تتناول أدوية أخرى تؤدي إلى تغيرات غير سليمة في التخطيط الكهربائي للقلب (أنظر الفقرة "التضالعات بين التفاعلات").

• لديك سكري.

• كنت تعانى أو عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد.

• لديك مشاكل في الجهاز الهضمي (myasthenia gravis).

• شخص لديك توسع أو بروز لوعاء دموي كبيـر (أم الدم الأبهري أو أم الدم المحيطية أو وعاء دموي).

• كان لديك في الماضي سلس في صمامات القلب (heart valve regurgitation).

• شخص لديك توسع في صمامات القلب (atrioventricular valve prolapse).

• لديك سبقة عائلية لأم الدم الأبهري أو عوامل خلودة أخرى تزيد من قابلية حدوثها.

إلاهابي أو إضطرابات وعائية مثل التهاب الشرابين على اسم تاكايساو، إلتهاب الشرابين المصح مع برجت، ارتفاع ضغط الدم، أو تصلب معروف ببطانة القلب (endocarditis).

• تطور لديك ذات مرة مفعح تطير في الأوتار (مزق في جدار الأبهر).

• تظاهر في البداية على شكل بقع مائل للأحمر شبيهة بـ "باينفلازنا". قد تتطور الطفح إلى تقرحات.

قد تم تناول ليقوفلوكاساسين.

بالهدف على شكل بقع دائري في الفم، المخجنة، الأنف، الأعضاء التناسلية والألعاب سخونة و/أعراض شبيهة بـ "باينفلازنا".

والعينين (احمرار وإنفاس شبيه بالإنفلونزا). يسبق هذا الطفح الجلد الحديط على تتشدد

واسع للجلد وإلى اختلاطات تشكل خطايا على الحياة أو تكون مميتة.

• تظاهر متلازمة DRESS في البداية على شكل أعراض شبيهة بالإنفلونزا.

وتطبع على الوجه ومن فم فم وفتح الايام على قدر اتساعه مع ارتفاع درجة حرارة

الجسم، ارتفاع في نسب اذربيقات الكبد الذي يتم ملاحظته في فحوص الدم

وارتفاع في نوع من خلايا الدم البيضاء (كثرة الحمضيات) وتضخم الغدد الليمفاوية.

إذا ظهر لديك طفح خطير أو عرض آخر من هذه الأعراض الجلدية، توفر

عن تناول ليقوفلوكاساسين ونوجه إلى طبيبك أو توجه حالاً لتقديم علاج طبقي.

لا يجوز تناول أدوية مضادة للجراثيم من نوع فلوروكونيولون / كوبينولون.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

عليه دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يتعلق المقدار

الدوائي بنوع التلوث لديك وبمكانه في الجسم. يتم تحديد فترة العلاج حسب

شدة التلوث.

إذا شعرت بأن تأثير الدواء أضعف مما يتبين أو أقوى مما يتبين، فلا تغير

المقدار الدوائي من تلقاء نفسك، بل واستوضح عن ذلك من طبيب.

كبار ومسنون لديهم مشاكل في الكلى

من الجائز أن يعطي الطبيب مقداراً دوائياً أقل.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفال أو للمرأهقين.

لا يجوز المضخ لـ جرعة السحق. يجب بلع الدواء مع كأس من الماء.

بالمكان شطر القرص في خط الشرط الذي على وجه القرص من أجل تناول

نصف مقدار دوائي عند الحاجة.

إذا كنت تتناول حالياً أدوياً صحيحاً، إضافات التوتين، مضادات الحموضة،

بيداكتين أو سوكرافات

فلا يجوز تناول هذه الأدوية سوية مع تأديبك. يجب ترك فاصل زمني قدره ساعتين على الأقل قبل أو بعد تناول تأديبك.

احم جلد من الشمس

يجب الامتناع عن العرض المباشر للشمس خلال العلاج بهذا الدواء ولدمة يومين

إضافةً إلى ذلك، يجب تغطية المقدار الدوائي أخف.

يؤدي إلى حرق، وخز أو حروق بحسب حشرة إذا لم تختبر اجراءات الحذر التالية:

تأكد من استعمال لكريم ذو عامل وقاية مرتفع

أرتدي دائمًا قبعة وبناب قطبي ذي ايزيل ورجلي

امتنع عن إستعمال أسرة التسخيف

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا طلبت بالخطأ من الدواء، توجه

حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر معك علبة الدواء.

لكي يعلم الطبيب ماذا تناولت.

قد تغادر من الأعراض التالية: نوبات إختلاج، الشعور بارتباك، دوران، إنفاس ضيق

الوعي، رجفان، ومشاكل في القلب - التي تؤدي لعدم إنتظام النبض، كذلك

غثيان أو الشعور بحرقان في المعدة.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول الدواء حال تذكرك، إلا

إذا افترق وقت تناول الجرعة المأدة تقريباً. لا يجوز تناول جرعة دوائية

مضاعفة على التسخيف عن الجرعة الدوائية المناسبة.

يجرب الوظيفة على العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى

ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء فقط لأنك تشعر بتحسن كبير.

من المهم أن ت Kelvin العلاج كما وصف من قبل الطبيب. إذا توقفت عن العلاج

أيضاً مثلاً بـ ميغافين أو إيمافين، فإن الثلوث قد يعود، حالي قد تتفاقم أو أن الجرعة قد

تطور مقاومة للدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد

من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات

الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب

أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تأديبك قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تذهبن من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز أن تتعاني أي منها.

هذه الأعراض الجانبية هي عادة طفيفة أو متقطعة وفي أحياناً متقاربة

ختفي بعد وقت قصير.

يجرب التوقف عن إستعمال تأديبك والتوجه حالاً للطبيب أو للمستشفى

إذا كنت تعاني من الأعراض الجانبية التالية:

نادرة جداً (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 10.000)

- رد فعل حساسية، العلامات يمكن أن تشمل: طفح، مشاكل في التنفس أو

في البطن، إنفاس الشفرين، الوجه، الحنجرة أو اللسان لديك.

يجرب التوقف عن إستعمال تأديبك والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت

للحاظ إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة التالية - من الجائز أن تحتاج

لعلاج طبي طارئ:

نادرة (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 1.000)

- إسهال مائي الذي لا يذكرون بهم موى أيضاً، حيث من الجائز أن يترافق بتقلصات

في البطن وسوخنة مرتفعة. هذه قد تكون علامات لمشكلة خطيرة في الأمعاء.

- ألم وانتفاخ في المعاشرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تزهاها. وتر

العرقوب هو الذي يتاثر على الأغلب.

- إختلالات.

- رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هزيان، پارانويا).

- الشعور بإكتئاب، مشاكل نفسية، الشعور بعدم هدوء، أحلام غريبة أو كوابيس.

- إنفاس شيبس السكري في الدم (hypoglycemia) أو إنفاس شيبس السكري في الدم.

هذه المعلومات هامة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السكري.

نادرة جداً (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 10.000)

- الشعور بحرق، وخز، ألم أو خدر. هذه يمكن أن تكون علامات لـ "اعتلال

عصبي".

أعراض جانبية شيعوها غير معروف (أعراض شيعوها لم يحدد بعد)

- حالات طفح جلدي خطيرة تشمل متلازمة سفينس - جونسون وإنفالن.

بعض شبهة المرض مثلة الون الأحمر أو بقع دائري تراقب أحياناً بحسب انتقال

في مرتكها، تتشير الجلد، تقرح في المخ، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية والعنين ومن الجائز أن تسببها سخونة وأعراض شيبة بالإنفالوانزا.

أنظر الفقرة 2.

- فقدان الشهية للطعام، إصرار الجلد والعينين، بول بلون داكن، حكة أو

حساسية في البطن. هذه قد تكون علامات لمشاكل في الكبد التي قد تشمل

فشل كبد مميت.

- تغير رأيك وأفكراك (ردود فعل ذهانية) مع خطورة لافتة أو أعمال إحتمارية.

- غثيان، شعور عام سيء، إنزعاج، ألم في منطقة المعدة أو تقيّف. هذه من

أشهر الفقرة 2 قبل إستعمال الدواء.

إذا تضررت الرؤية لديك أو إذا كنت تعاني من اضطرابات أياً كانت في العينين

خلال فترة العلاج بـ تأديبك، يجب استشارة طبيب العينين بشكل فوري.

في الحالات نادرة جداً لأعراض جانبية التي تستلزم فترة زمنية (حتى شهر أو

سنتوات) أو أعراض جانبية دائمة، مثل الإهاب في الأوتار، تماقز في الأوتار، الام

في المفاصل، الالم في الأطراف، وخز، دعفنة، حرقة، خدر أو ألم (اعتلال عصبي)، إكتئاب،

إرهاق، إضطرابات في النوم، خلل في الذاكرة، كذلك خلل في السمع، الرؤية،

التقويد و الشم يتعلق بـ اعطاء مضاد حموضة من نوع كونتيونون وفلوروكونويتون.

في حالات معينة تكون علاوة لعوامل المرض التي كانت موجودة قبل العلاج.

بلغ عن حالات تضخم وتصدع وقد تكون مميتة. وعن تسرُب في صمامات القلب

لدى مرضى تلقوا فلوروكونويتون. أنظر أيضاً الفقرة 2.

استشر الطبيب إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية التالية أو إذا استمرت

لأكثر من عدة أيام:

شائكة (أعراض يمكن أن تظهر لدى حتى متعالج 1 من بين 10)

- مشاكل في النوم.