

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر الفصل 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لعلاج التلوثات الجلدية السطحية التي تسببها كائنات حية دقيقة حساسة لكلورامفينيكول.

الفصلية العلاجية

مضاد للجراثيم للاستعمال الموضعي.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لكلورامفينيكول أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر لاحقاً في الفصل "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية").
- كان لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك ماضٍ من فقر الدم، النزيف الدموي أو المشاكل الأخرى في الجهاز الدموي.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بالدواء، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة النخاع العظمي.

يحتوي المستحضر على كلورامفينيكول الذي قد يسبب تغيرات في الصورة الدموية عند الاستعمال المتواصل. بموجب ذلك، يجب الامتناع عن الاستعمال المتواصل للمستحضر.

المستحضر غير مخصص للاستعمال في العينين، لا يجوز إتاحة ملامسة المستحضر لهما. في حالة ملامسته للعينين، يجب الشطف فوراً بالماء.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل أدوية كابطة لوظيفة النخاع العظمي (أدوية قد تسبب انخفاضاً في كريات الدم الحمراء، البياض أو في الصفائح).

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فلا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على المركب لانولين (Lanolin) الذي قد يسبب تهيجاً جلدياً (مثلاً التهاب الجلد التماسي).

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحدددهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتباعدة عند غياب أمر آخر من الطبيب:

ادهن كمية صغيرة من المرهم على المنطقة المصابة، 3-4 مرات في اليوم.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا لم يطرأ تحسنٌ على حالتك خلال بضعة أيام، فيجب مراجعة الطبيب ثانية.

اتقنه

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

إذا بلعت الدواء بالخطأ

إذا بلعت أو إذا بلع ولد المرهم، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت دهن المرهم في الوقت المحدد، فادهنه عند تذكرك، وواصل العلاج كما خُدد من قبل الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسنٌ على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سينتوميسين 3% إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية، فيجب مراجعة الطبيب فوراً: ردود فعل تحسسية تشمل: الحُمى، الطفح الجلدي، الانتفاخ في الوجه، في الشفتين، الجروح في الفم أو الألم في الحلق مما يسبب صعوبات في البلع أو التنفس، الانتفاخ في اليدين، الرجلين أو الكاحلين.

إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية، فأوقف العلاج وراجع الطبيب: انخفاض في العد الدموي، يتمثل بحُمى، ألم في الحلق، تعب، نزيف دموي، ضعف أو رد فعل الحساسية المفرطة الذي يتمثل باحمرار، تهيج، طفح جلدي، حكة، انتفاخ أو التهاب بشكل موضعي (والتي لم تكن موجودة قبل استعمال المستحضر)، نشوء نزيف دموي أو كدمة بسهولة.

إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية لأول مرة بعد انتهاء العلاج، فراجع الطبيب فوراً:

حُمى، ألم في الحلق. إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأول الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقوي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

يمكن استعمال الدواء حتى 12 شهراً بعد فتحه لأول مرة، وليس بعد انقضاء تاريخ انتهاء الصلاحية.

لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Petrolatum yellow (paraffin, yellow soft), Lanolin (wool fat), Mineral oil (paraffin liquid), Silica, colloidal anhydrous

كيف يبدو الدواء وما هو محتو العبوة:

في كل عبوة توجد أنبوبة تحتوي على 10 غرامات من المرهم الأصفر اللون.

اسم صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ض.،

شارع دقوره هانيفينه 124، تل أبيب 6944020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

025.11.20849

تم تحرير هذه النشرة في كانون الأول/ديسمبر 2022 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.