

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התש"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### סינטומיצין 3%

משחת עור

הרכב

כלורמפניקול 3% Chloramphenicol

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה פרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 – "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### 1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בזיהומי עור שטחיים הנגרמים על ידי מיקרואורגניזמים רגישים לכלורמפניקול.

**קבוצה תרופתית**

אנטיביוטיקה לשימוש מקומי.

#### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה זו אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לכלורמפניקול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה בהמשך הפרק "מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה" ובפרק 6 "מידע נוסף").
- לך או למישהו מבני משפחתך יש עבר של אנמיה, דימום או בעיות אחרות במערכת הדם.

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם הינך סובל או סבלת בעבר מלקיני בתפקוד מח העצם.

התכשיר מכיל כלורמפניקול העלול לגרום לשינויים בתמונת הדם בשימוש ממושך. לפיכך, יש להימנע משימוש ממושך בתכשיר.

התכשיר אינו מיועד לשימוש בעיניים, אין לתת לתכשיר לבוא במגע עמו. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד עם מים.

#### תגובות בין-תרופתיות

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח תרופות המדכאות את תפקודו של מח העצם (תרופות העלולות לגרום לירידה בכדוריות הדם האדומות, הלבנות או בטסיות).

#### היריון והנקה

אם הינך בהיריון או מניקה, אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול.

#### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה את המרכיב לנולין (Lanolin) אשר עלול לגרום לגירוי בעור (למשל דלקת עור מגע).

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

מרח כמות קטנה של המשחה על האזור הנגוע, 3-4 פעמים ביום.

#### אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים, יש לפנות לרופא שנית.

#### שים לב

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

#### אם בלעת בטעות מהתרופה

אם בלעת או אם ילד בלע מן המשחה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

#### אם שכחת להשתמש בתרופה

אם שכחת למרוח את המשחה בזמן המיועד, מרח את המשחה כשזכרתה, והמשך בטיפול כפי שנקבע על ידי הרופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שיהיך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסינטומיצין 3% עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות, יש לפנות לרופא מיד:**

תגובות אלרגיות כולל: חום, פריחה, נפיחות בפנים, בשפתיים, פצעים בפה או כאב גרון הגורמים לקשיי בליעה או נשימה, נפיחות בידיים, ברגליים או בקרסוליים.

**אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות, הפסק את הטיפול ופנה לרופא:**

ירידה בספירת הדם המתבטאת בחום, כאב גרון, עייפות, דימום, חולשה או תגובה של רגישות יתר המתבטאת באדמומיות, גירוי, פריחה, גירוד, נפיחות או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר), דימום או חבלה בלחות.

**אם לאחר תום הטיפול מופיעות תופעות הלוואי הבאות לראשונה, פנה לרופא מיד:** חום, כאב גרון.

**אם המופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**יש לאחסן מתחת ל-25°C.**

**ניתן להשתמש בתרופה עד 12 חודשים לאחר הפתיחה הראשונה, ולא יאוחר מתאריך התפוגה.**

אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

#### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:**

Petrolatum yellow (paraffin, yellow soft), Lanolin (wool fat), Mineral oil (paraffin liquid), Silica, colloidal anhydrous

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

בכל אריזה שפופרת המכילה 10 גרם משחה בצבע צהוב.

**שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו:**

טבע ישראל בע"מ,

רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

025.11.20849

**עלון זה נערך בדצמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.