

וואקיין 4.5 מ"ג, וואקיין 18 מ"ג**טבליות מצופות**

החוור הפעיל וכמותו:

ואקינס 4.5 מ"ג

כל טבלייה מכילה פיטוליסנט הידרכולורי, שהוא שווה ערך ל-4.45 מ"ג פיטוליסנט

(Pitolisant).

ואקינס 18 מ"ג

כל טבלייה מכילה פיטוליסנט הידרכולורי, שהוא שווה ערך ל-17.8 מ"ג פיטוליסנט (Pitolisant).

חומרם בלחי פעילים ואלרגניים בתכשיש: ראה סעיף 6 "מידע נוספים".

קרא בעזון את העלוון עד סופו בטרם תשמש בתורופה. עלון זה מכיל מידע תמצתי על

תורופה זו ונשמה עברו. אף על פי שהיא אורה לאחרם. היא עלולה להזיק להם אפילו אם

גואה לר' כי מבחן הרופאי דומה.

1. למה מיועדת התורופה?

ואקינס 4.5 מ"ג:

• לטיפול במוגברים עם נרקלופסיה עם או בלי קטפלקסיה.

• לשיפור חורנות והפחתת ישוניות יתר בשעות היום ובוום נשמה (excessive daytime sleepiness) במוגברים עם דום נשמה חסימתית בשינה (obstructive sleep apnoea) שעוברים ישוניות היית בשעות היום אל טופלה נספה, פונה אל הרופא או אל הרופא זו ונשמה עברו. אף על פי שהיא אורה לאחרם. היא עלולה להזיק להם אפילו אם גואה לר' כי מבחן הרופאי דומה.

טבליות מצופות: רהורות אחרות למכירת העצם.

• נרקלופסיה היא מצב הגורם ישניות יתר בשעות היום ונטיה להידם בפתאומיות במוגברים בלתי מתאימים (התפרק שינה).

• קטפלקסיה היא חלשות שירויים או שירוק מתמשך ללא איבוד הכרה, כתגובה לריגוש פתאומי, כגון פחד, שמחה, חוויה או הפתעה.

• דום נשמה חסימתית בשינה הוא מצב הגורם לשירות נשימה ל-10 דקות בפתאומיות במהלך השינה. זה יכול להשוויל לשינויים יתיר בשעות היום ולונטייה להידם בפתאומיות בלתי מתאימים (התפרק שינה).

2. לפני השימוש בתורופה:

אין להשתמש בתורופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל, פיטוליסנט, או כל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל הדרופה (ראה רשימת חומרה בתקף כבד, פיטוליסנט, מכיר שפיטוליסנט עובר פירוק בכבד ורמות גבוהות מדי עלולות להזבב במטופלים עם הפרעה חמורה בתפקוד הגוף). (6)

- אתה סובל מחרות נספה כבדה, מכיר שפיטוליסנט עובר פירוק בכבד ורמות גבוהות מדי עלולות להזבב במטופלים עם הפרעה חמורה בתפקוד הגוף.

- אתה מנקה.

לאחרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתורופה

לפני הטיפול בוואקיין, ספר לרופא אם מוחשtab או אבדונית.

- אתה סובל מהפרעות בתפקוד כבד, היהת שיתיכון ותידרש התאמת מנה.

- אתה סובל מחלת כבדה או נטול תרומות של הקיבה, כגון ליגיון דלקת, מכיר שתగות של הקיבה דוחה בוגן לוואקיין.

- אתה סובל מבעיות לבביות. הרופא יצטרך לתרטף לבבי באופן סדרי כל עוד אתה גועל וואקיין.

- אתה סובל מחלת כיפין (אפילפסיה) קשה.

לטוטופלים שמקבלים את הדרופה לנטול נרקלופסיה עם או בלי קטפלקסיה בלבד.

- אתה סובל מהפרעות בתפקוד הכלילי, היהת שיתיכון ותידרש התאמת מנה.

- אתה סובל מהשנת יתר קיזוניות או מאנווקסיה, כיון שמקבל שירוי לשונות (עלולות או לדקה) במלחים הטבליות או באקינס.

- חלק מהמטופלים הדרופים, הסובלים מההיסטוריה של הפרעות פסיכיאטריות, דיווחו על קיום מחשבות אובדן זיכר או איבוד זיכר חסרי שירויים או שינויים אחרים בהתקנות נירה דלקת, מכיר שתגות של הקיבה דוחה בוגן לוואקיין.

- ברור קרוב לעוזר לך לארת סמנטי דיאוון או שינויים אחרים בהתקנות.

לטוטופלים שמקבלים את הדרופה לדום נשמה חסימתית בשינה בלבד

- אתה סובל מעדף משקל עז שירויים או מתח משקל מושפעים, כיון שמקבל עשו לעולות או לדחת במהלך הטיפול בוואקיין.

ילדים ומתבגרים

ואקינס אינה מיועדת לילדים או מתבגרים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע לגבי בטיחות ועולות השימוש בתורופה זאת בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

תగובות בתקופות שונות

אם אתה לוקח, או קח לתקופת לאחרונה, תרופה אחרת כולל תרופה ללא מרשם ותוספי

תזונה, סור על קלומופירמין (אהר שיתיכון), פולאקטין, פולאקטין, פרוקטין וונלקטין.

• בופרפיון, תרופה וגונת דיאוון או סטיוח מגילה מעשן

• דיפנהידראמין, אנטיביטוקה המשמש לטיפול בשחפת ומספר זיהומים נוספים

• רופאות לטיפול בכיפין (אפילפסיה; למונעת פירוכיסם) כגן קרבמוףין, פובאראביטל ופניטאן

• סנט ג'ון וורט (פרע מחרור; אפילפסיה)

• סינקלפטין, לטיפול בפרעות בבלתי יתורה הדרופים

• טריבאנטי, לטיפול בziegdon (תרופה למניעת הרומונינים) ראי גם סעיף "הירון, הנקה ופורה"

• הרופאות לטיפול בסרכן כגון דיסטנסיל, אירונטיקן

• ציסאפריד, לטיפול בחזרה (יפילוקס) קיבתי

• פירמיד, לטיפול במלליה נפשיות מסימות

• הלופנטרין, תרופה אטיראלית לטיפול באירועים

• אטיראלית, לטיפול בכאים וחוקים

• פראצטמול, לטיפול באכאים וחוקים

• הרופאות וגונת קרשיס, אלטיאו-אילטיאו קרשיס; למונעת קרשיים;

• פרובאנטי, לטיפול בשיכר וטיריה-

• הרופאות לטיפול בסרכן כגון דיסטנסיל, אירונטיקן

• דיקלופנק, איבופרפון, מלוקסיקם ונפרוקסן

ןרקלופסיה עם או בלי קטפלקסיה

• ניון להשתמש בפיטוליסנט ייחד עם מודפיניל או עם סודיום אוקסיבט.

הירון, הנקה ופורה

אם את ביריןון או מינקה, חושבת שאתה ביריןון או מתכוון להרhot, היונץ ביריןון או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

ואקינס עוברת לחלב בעבלי חיים. מטופלות הנונטולות ואקינס חייבות להפסיק להניך.

נשימה ושימוש במכוון

אתה עשוי להוות יישון או שיכלול הרוכח שלך עשויה לרופם.

עליך לנוקוט משנה זיהורות בביצוע פעילות הדורשת ריכוך, כגון נגינה והפעלת מכונות.

אם אין לך בטוח עם מכך מפשע לרעה על כישורך להניך, שוחח עם הרופא.

הנקה

ואקינס עוברת לחלב בעבלי חיים. מטופלות הנונטולות ואקינס חייבות להפסיק להניך.

נשימה ושימוש במכוון

אתה עשוי להוות יישון או שיכלול הרוכח שלך עשויה לרופם.

עליך לנוקוט משנה זיהורות בביצוע פעילות הדורשת ריכוך, כגון נגינה והפעלת מכונות.

אם אין לך בטוח עם מכך מפשע לרעה על כישורך להניך, שוחח עם הרופא.

3. כיצד תשתמש בתורופה?

יש להשתמש בתקופת הזמן בהאטם לזרעאות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרופא או אופן הטיפול בתקופת הזמן בהאטם לזרעאות הרופא בלבד. המינון המקבול בדרך כלל הוא:

ןרקלופסיה עם או בלי קטפלקסיה

הטיפול המרכזי בדרך כלל במבנה השן של מ"ג פעם ביום, הרופא יכול להפחית או להגדיל את המינון בהתאם להשפעה

להרופה עליך ומידת הסביבות שלך אליה.

יכילם על ברור מסקפם עד לאחר הרופא יכול להפחית את התוועלת שתורופה מעניקה, והתוועלת המרובה מוגשת בדרך כלל לאחר מסך שבעות.

אך לשונת את המינון של ואקינס על דעת עצמן. כל שינוי במינון מחייב הוראה ומעקב של הרופא.

עבור מנה של מ"ג, רק טבלייה אחת של 4.5 מ"ג.

עבור מנה של 9 מ"ג, רק שתי טבליות של 4.5 מ"ג.

עבור מנה של 18 מ"ג, רק טבלייה אחת של 18 מ"ג.

עבור מנה של 36 מ"ג, רק שתי טבליות של 18 מ"ג.

dom נשמה חסימתית בשינה

הטיפול המרכזי בדרך כלל במבנה השן של מ"ג פעם ביום, הרופא יכול להפחית או להגדיל את המינון בהתאם להשפעה

להרופה עליך ומידת הסביבות שלך אליה.

המינון המומלץ מונע מהעניקה, והתוועלת המרובה מוגשת בדרך כלל לאחר מסך שבעות.

אך לשונת את המינון של ואקינס על דעת עצמן. כל שינוי במינון מחייב הוראה ומעקב של הרופא.

עבור מנה של מ"ג, רק טבלייה אחת של 4.5 מ"ג.

עבור מנה של 9 מ"ג, רק שתי טבליות של 4.5 מ"ג.

עבור מנה של 18 מ"ג, רק טבלייה אחת של 18 מ"ג.

טבליות מצופת בשינה

בקורה נרקלופסיה כימייה מוגדרת כטבליות ואקינס

במיוחדם גודלה גדולה מידי של טבליות ואקינס יש להתקשר לחדר המיןון של

בית החולים או קרכוב ביריןון או שעבון ביריןון או קשיי נשינה. שוחח עם הרופא או הרופא או אופן הטיפול בתקופת הזמן בהאטם לזרעאות הרופא בלבד. המינון המקבול בדרך כלל הוא:

כל טבלייה מכילה פיטוליסנט הידרכולורי, שהוא שווה ערך ל-4.45 מ"ג פיטוליסנט (Pitolisant).

ואקינס 18 מ"ג

כל טבלייה מכילה פיטוליסנט הידרכולורי, שהוא שווה ערך ל-17.8 מ"ג פיטוליסנט (Pitolisant).

חומרם בלחי פעילים ואלרגניים בתכשיש: ראה סעיף 6 "מידע נוספים".

ומיקרס בעזון את העלוון עד סופו בטרם תשמש בתורופה. עלון זה מכיל מידע תמצתי על

תורופה. אם יש לך שאלות נוספת פונה אל הרופא או אל הרופא או גואה לר' כי מבחן הרופאי דומה.

4. תופעות לוואי

אם שכחת ליטול ואקינס

אם שכחת ליטול ואקינס