



אם הופיעה תופעת לוווי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוווי שלא ציינה בעلون, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוווי למשרד הבריאות באמצעות חיבור על הקישור "דיווח על תופעות לוווי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אחר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המוקון לדוח על תופעות לוווי, או ע"י כנסת לקשרר: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופة?

מנע הרעלת הרופה זו וכיל הרופה אחרית יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוחן ראיותם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כר תמן הרעלת. אל תגרום להקה לאלה רואיה מפורשת מהרופא. אין לשימוש בתרופת תאריך התגופה (exp. date) המופיע על גבי האריהה. תאריך התגופה מתייחס ליום האחורי של אותו חדש.

אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C. יש להגן מפני גיבויו. אין להשאיר תרופות לבובות ולאשפפה הביתה. שאל את הרוקח כיצד להשאיר תרופות שאינן עד בשימוש. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוספת:

נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:  
Wheat starch, povidone K30, magnesium stearate, hypromellose, macrogol 20000.

כיצד נראה התרופת ומה תוכן האריהה:  
טבליה מצופת עגולה בעובי לבן/קרם. אריזות של 20, 50 או 100 טבליות. כל גודלי האריהה משווים.  
עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלת כלשיה או אין לך בוטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.  
בעל הרישום והיבואן וכותבותו: סאנופי-אונונטיס ישראל בע"מ,  
ת.ד. 8090, נתניה.

נערך באוקטובר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  
מספר רשות התרופת בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
106 97 21742  
שם הפצתו ולהקללה על הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופת מיועדת לבני שני המינים.

-ocab ראש,-  
- סחרחות (ఈושה ש"הרואה מסתובב"),  
- פרטוסים,-  
- בלבול,

- הפרעות נוירולוגיות, הנקראות אנטפלופתיה או תסמונת צרבלית, שగרמות למצב של בלבול, הפרעות בהכרה, הפרעות בתנוחות, קשיים בתיאום תנועות, הפרעות בביטוי, הפרעות בdfsת ההליכה, תנועות עזיניות לא-רציניות, רעד. תסמיים אלה הם בדרך כלל הפיקים כאשר הטיפול מופסק ומשווית להיות קשורות לשינויים בהדמיות רפואיות (MRI). דוחות מקרים נדירים שהסתימנו במוות (ראה סעיף 2 "ازירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופת").

- דלקת קרום המוח לא-חידקית.  
**הפרעות פסיקיאטריות:**

- היזות,  
- הפרעות באישיות (פרנויה, דליורים) אשר עשויות להיות מלוחות במחשבות או פעולות אובדן (ראה סעיף 2 "ازירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופת"),  
- נתיה לדיאכטן.

**הפרעות בראייה:**

- הפרעות זמינות בראייה כגון ראייה מטרוששת, ראייה כפולה, קוצר ראייה, ריזדה בראייה, שינוי בראייה צבעים,  
- מוק או דלקת בעקב הראייה.

**הפרעות בدم:**

- ספירת טסיות נומוכה באופן חריג, מספר נמוך באופן חריג או ריזדה גודלה במספר תאי דם לבנים מסוימים (נויטרופילים).

**הפרעות לבבויה:**

שכחוות לא-דודה (א- ניתן להעריך מהנתונים הקיימים): הפרעות בקצב הלב (נקרא גם הארכט מקטע QT, התופעה שניתן לראות באלקטרוקרדיוגרפיה [אק"ג], במיוחד כאשר משתמשים בפלגייל 250 מ"ג בטבליות עם תרופות אחרות שעשוות לגרום להפרעות בקצב הלב).

**השפעות על הגוף:**

- עליה בגיןמי בכבד (טראנסאמינזות,ALKLINE פוספטאז),  
- מקרים נדירים מאוד של מזק רציני לכבד (לפעמים מלווה בצתבת), ובמיוחד מקרים של כשל בכדי הדורש השתלה.

**אחר:**

- שתן בעובי אדמדם-חום הנגרם על די התרופת.