

עלון לצרcn לפi תknות הרוקחim (תקchnים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על pi מרשם רופא בלבד

טוקייסה 150 מ"ג **טוקייסה 50 מ"ג**

טבליות מצופות

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

Tucatinib 150 mg	Tucatinib 50 mg
טוקטיניב 150 מ"ג	טוקטיניב 50 מ"ג

לרשימה של המרכיבים הבלתי פעילים ראה סעיף 6. " מידע נוסף". ראה גם סעיף 2.9 " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נסופות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה בעבר בלבד. אל תעבור אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי סימני המחללה שלהם דומה.

טוקייסה עלולה לגרום לדלקת שטרם נולד כאשר נלקחת על ידי אישה בהריון. שוחחי עם הרופא שלך לפני נטילת טוקייסה אם את חשובה שעת בהריון או מתכוננת הרוין.

1. למה מיועדת טוקייסה?

טוקייסה מיועדת, בשילוב עם טראסטוזומאב ו-קפאציטביין, לטיפול במטופלים מבוגרים עם סרטן שד מסוג HER2 חובי מתקדם מקומית או גורוטי שקיבלו לפחות שני משטרים טיפול קודמים כנגד HER2.

טוקייסה נלקחת עם שתי תרופות אחרות לסרטן, טראסטוזומאב ו-קפאציטביין. עלונים לצרcn נפרדים זמינים עבור תרופות אלו. **בקש מהרופא שלך לספר לך עליהם.**

קבוצה רפואייתית: חומרים אנטי-נאופלסטיים, מעכבי חלבון קינאז.

טוקייסה פועלת על ידי חסימת קולטני HER2 על תאים סרטניים. HER2 מייצר אותן שיכולים לעזור לסרטן גדול, וחסימותיו עשויו להאט או לעצור את גידילת התאים הסרטניים או להרוג אותם לחלוטין.

2. לפני השימוש בטוקייסה

2.1 אין להשתמש בטוקייסה אם:

– אתה רגיש (אלרגי) לטוקטיניב או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה. ראה סעיף 6 " מידע נוסף".

2.2 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בטוקייסה

- **לפני תחילת הטיפול בטוקייסה, ספר לרופא אם יש לך בעיות בכבד. במהלך הטיפול, הרופא שלך יבצע בדיקות כדי לבדוק שהכבד שלך פועל כראוי.**

- טוקייסה עלולה לגרום לששלול חמור. שוחח עם הרופא שלך מיד עם הסימן הראשון לששלול (צואה רכה) ואם הששלול שלך נמשך עם בחילות ו/או הקאות.
- טוקייסה עלולה לגרום נזק לתינוק שטרם נולד כאשר נלקחת על ידי אישה בהריון. שוחח עם הרופא שלך לפני נטילת טוקייסה אם את חשבות שתאת בהריון או מתכונת הריון. ראי סעיף 2.7 "הריון, הנקה ופוריות" להלן.

2.3 ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זאתילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

2.4 בדיקות ומעקב

בהתקף לתופעות הלואין שיש לך, הרופא שלך עשוי להמליץ על הפחתת המינון שלך או להפסיק זמנית את הטיפול.

במשך תקופת הטיפול בטוקייסה, הרופא שלך יבדוק גם את תפקודו הכללי שלך.

2.5 אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקה, או אם לך נזק לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיעוד אם אתה לוקה:

- היפריקום (St. John's Wort) - תכשיר צמחי המשמש לטיפול בדיכאון
- איטריקונazel, קטוקונazel, ווריוקונazel, פוסאקוונazel - משמשות לטיפול בziehoomים פטריאטיים
- רימפיצין - משמשת לטיפול בziehoomים חידק"ם
- דרונביר, סקוויינאביר, טיפרנאנביר - משמשות לטיפול בנגיף VII
- פנטואין, קרבמ赞ין - משמשות לטיפול באפילפסיה או במצב כאב פנימי הנקרה נוירalgia של העצב המשולש או כדי לשלוות בהפרעת מצב רוח חמורה כאשר תרופות אחרות אין פועלות
- בוספירן - משמשת לטיפול בעיות נפשיות מסוימות
- סיורולימוס, טקרולימוס - משמשות לשילוט בתגובה החיסונית של הגוף שלך לאחר השתלה דיגוקסין - משמשת לטיפול בעיות לב
- לומיטאפיד, לובסטטין - משמשות לטיפול ברמות כולסטרול חרגיות
- אלפנטניל - משמשת לשיכוך כאבים
- אונופיל, ארדניפיל - משמשות לטיפול בהפרעות זיקפה
- דרייפנצין - משמשת לטיפול בבריחת שתן
- מיאוזולם, טרייאזולם - משמשות לטיפול בהתקפים אפילפטים, הפרעות חרדה, בהלה, סערת נשף ונודדי שינה
- רפאלינייד - משמשת לטיפול בסוכרת מסוג 2
- אבסטין - אנטהיסטמין המשמש לטיפול בנזלת אלרגית עונתית ורבת שנתיות ובדלקת אלרגית של לחמית העין
- אברולימוס, איברוטיניב - משמשות לטיפול בסוגי סרטן מסוימים
- נלוקסגול - משמשת לטיפול בעיצירות

2.6 שימוש בטוקייסה ומהזן

ניתן ליטול טוקייסה עם אוכל או בין הארוחות.

2.7 הריון, הנקה ופוריות

טוקייסה עלולה לגרום להשפעות מזיקות לתינוק שטרם נולד כאשר היא נלקחת על ידי אישה בהריון. הרופא שלך יבצע לך בדיקת הריון לפני שתתחל ליטול טוקייסה.

- אם את בהריון, חשבות שתאת בהריון או מתכונת הריון, התיעצי עם הרופא שלך לפני נטילת תרופה זו. הרופא ישකול את התועלות הפוטנציאלית עבורך מול הסיכון לתינוק שטרם נולד.
- **השתמשי באמצעות מניעה אמני** כדי להימנע מכניסה להריון בזמן שתلت טוקייסה ולפחות שבוע אחד לאחר המנה האחורה.

- אם אתה גבר ובת דוגר יכולה להיכנס להריון, השתמש באמצעות טוקיניסה כדי להימנע מהריון בזמן שאתה נוטל טוקיניסה ולפחות שבוע אחד לאחר המנה האחרון.
- אם **נכנסת להריון** במהלך הטיפול בטוקיניסה, **ספרי לרופא שלך**. הרופא יעריך את התעלת הפטנציאלית עבורך מהמשך נטילת תרופה זו ואת הסיכון לתינוק שטרם נולד.

- לא ידוע אם טוקיניסה עוברת לחלב אם.
- אם **את מניקת או מתכוננת להריון**, **התיעצי עם הרופא שלך** לפני נטילת התרופה. אין להניך במהלך הטיפול בטוקיניסה ולפחות שבוע אחד לאחר המנה האחרון. שוחחי עם הרופא שלך על הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך במהלך הטיפול.

לא בוצעו מחקרים פוריות לגברים או בנים. בהתבסס על ממצאים מחקרים בבעלי חיים, טוקטיניב עלולה לגרום לפוריות בעקבות בעלות פוטנציאלי רביה.

התיעצי עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת טוקיניסה אם יש לך שאלות כלשהן.

8. נהייה ושימוש במכונות טוקיניסה לא צפוייה להשפיע על יכולתך לנוהג או להפעיל מכונות. עם זאת, אתה אחראי להחליט אם אתה יכול לנוהג ברכב רכב ממונע או לבצע משימות אחרות הדורשות ריכוז מוגבר.

9. מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה תרופה זו מכילה 55.3 מ"ג נתרן (המרכיב העיקרי של מליח בשולחן/שולחן) בכל מנה של 300 מ"ג. זה שווה ל-2.75% מהצריכה היומית הממוצעת המומלצת של נתרן למוגבר.

תרופה זו מכילה 60.6 מ"ג אשלגן לכל מנה של 300 מ"ג. יש לקחת זאת בחשבון במטופלים עם תפקוד קלויות ירוד או במטופלים בדיאט אשלגן מבוקרת.

3. כיצד השתמש בטוקיניסה?

יש להשתמש בטוקיניסה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מינון

המינון המקביל בדרך כלל הוא 300 מ"ג (שתי טבליות של 150 מ"ג) במתן דרך הפה פעמיים ביום.

הרופא שלך עשוי לשנות את המינון של טוקיניסה אם אתה חווית תופעות לוואי מסוימות. כדי לאפשר מינון נמוך יותר, הרופא שלך עשוי לרשום טבליות של 50 מ"ג.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- ניתן ליטול טוקיניסה עם אוכל או בין הארוחות.
- יש לבלווע את הטבליות בשלמותן, אחת אחרי השניה.
- קח כל מנה בהפרש של כ-12 דקות באופן שווה בכל יום.
- אל תיטול מנה נוספת אם אתה מקיא לאחר נטילת טוקיניסה אלא המשך במנה המתוכננת הבאה.
- אין מידע לגבי כתישה, ח齐יה או לעיסה של הטבליות.

אם נטلت בטיעות מינון גבוה יותר שוחח מיד עם רופא או רוקח. אם אפשר, הראה להם את אריזת התרופה.

אם שכחת ליטול טוקיניסה

אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל שנקבע.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם תפסיק ליטול טוקייסה
טוקייסה מיועדת לטיפול ארוך טוח ועליר ליטול אותה ברציפות. **אל תפסיק ליטול טוקייסה מבל' לשוחח עם הרופא שלך.**

בזמן שאתה נוטל טוקייסה

- בהתאם לתופעות הלואאי שיש לך, הרופא שלך עשוי להמליץ על הפחתת המינון שלך או להפסיק זמינות את הטיפול.
- הרופא שלך יבדוק גם את תפקודו הכביד שלך במהלך הטיפול בטוקייסה.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטוקייסה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימה של תופעות הלואאי. יתרן ולא תסבול מכך אחות מהן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שימושיות ביותר משתמש אחד מעשרה):

- שלשול;
- בחילה;
- הקאה;
- פצעים בפה, דלקת בפה, כיבים בפה;
- בעיות כבד, שלולות לגרום לגירוד, הצהבה של העיניים והעור, שタン כהה וכאב או אי נוחות באזור הימני העליון של הבطن;
- פריחה;
- כאב פרקיים;
- ירידת משקל;
- דימום מהף.

ספר לרופא שלך או לרוקח אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחות מתופעות הלואאי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופוף המקoon לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את טוקייסה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, על מנת למנוע הרעלת. אין לגרום להקאה אלא אם כן הוראה מפורשת לעשות זאת על ידי רופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**
יש לאחסן מתחת ל- 30°C .
- אין להשליך תרופות לביב או לפחות אשפה ביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, טוק'יסה מכילה גם:

- טבליה - copovidone, microcrystalline cellulose, crospovidone, sodium chloride, potassium chloride, sodium hydrogen carbonate, silica, colloidal anhydrous, magnesium stearate, (ראה סעיף 2.9 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").
- ציפוי - polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000, talc, yellow iron oxide.

כיצד נראה תוק'יסה ומה תוכן האזינה
 טוק'יסה 50 מ"ג טבליות מצופות בעגולות, צהובות ומוטבעות עם "TUC" בצד אחד ו"50" בצד השני.
 טוק'יסה 150 מ"ג טבליות מצופות הן בצורה אליפסה, צהובות ומוטבעות עם "TUC" בצד אחד ו"150" בצד השני.

טוק'יסה מגיעה באזינות בליסטר אלומיניום. כל אזינה מכילה:

- טוק'יסה 50 מ"ג טבליות מצופות 88 טבליות (11 בליסטרים של 8 טבליות כל אחד).

- טוק'יסה 150 מ"ג טבליות מצופות 84 טבליות (21 בליסטרים של 4 טבליות כל אחד).

יתכן ולא כל גודלי האזינות משווים.

בעל הרישום:

חברת מרק שארפ ודוחם (ישראל - 1996) בע"מ, החרש 34 הוד-השרון

ישראל:
 סיג'ן V.B., סכיפהול, הולנד

נערך במרץ 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

טוק'יסה 50 מ"ג טבליות מצופות: 170 32 36950 99

טוק'יסה 150 מ"ג טבליות מצופות: 170 33 36951 99

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.